

AVES
do ACRE
Edson Guilherme



AVES do ACRE

Edson Guilherme

avesgráficas
editora



2016

Edufac 2016

Direitos exclusivos para esta edição:

Editora da Universidade Federal do Acre (Edufac)

Campus Rio Branco, BR 364, km 4

Distrito Industrial – Rio Branco-AC, CEP 69920-900

fone: (68) 3901 2568 – e-mail: edufac.ufac@gmail.com

Editora Afiliada: Feito Depósito Legal



Aos que lutaram (*in memoriam*) e aos que lutam pela conservação do Bioma Amazônia; aos que admiram as aves e, em particular, aos que contribuem para mantê-las livres, dedico!

Aves do Acre
ISBN 978-85-98499-24-6
Copyright © Edufac 2016, Edson Guilherme
Editora da Universidade Federal do Acre - Edufac
Rod. BR364, KM 04 • Distrito Industrial
69920-900 • Rio Branco • Acre

Diretor
José Ivan da Silva Ramos

Conselho Editorial

Adailton de Sousa Galvão, Antonio Gilson Gomes Mesquita, Bruno Pereira da Silva, Carla Bento Nelem Colturato, Damián Keller, Eustáquio José Machado, Fabio Morales Forero, Jacó César Piccoli, José Ivan da Silva Ramos, José Mauro Souza Uchôa, José Porfiro da Silva, Lucas Araújo Carvalho, Manoel Domingos Filho, Maria Aldecy Rodrigues de Lima, Raimunda da Costa Araruna, Simone de Souza Lima, Tiago Lucena da Silva, Yuri Karaccas de Carvalho

Coordenadora Comercial: Ormifran Pessoa Cavalcante
Editora de Publicações: Jocília Oliveira da Silva

Projeto gráfico e capa: Tancredo Maia Filho
Editoração gráfica: avesgráficas editora
Ave da capa: Pica-pau-lindo (*Celex spectabilis*) – Foto: Bertrando Campos
Aves da guarda: maitaca-da-cabeça-azul (*Pionus menstruus*) – Foto: Tancredo Maia Filho
Fotos das paisagens: Edson Guilherme

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Central da Ufac

G956a Guilherme, Edson, 1970-


Aves do Acre / Edson Guilherme . – Rio Branco: Edufac, 2016.
897 p. : il.

ISBN: 978-85-98499-24-6
Inclui Referências bibliográficas e índices remissivos.

1. Aves – Espécies – Acre. 2. Acre – História.

CDD 22.ed. 598.2098112

Bibliotecária: Vivyanne Ribeiro das Mercês Neves CRB – 11º/600



SUMÁRIO

Prefácio	13
Apresentação	15
Introdução	17
Estado do Acre: aspectos gerais	19
Áreas e limites geográficos.....	21
Geologia e Geomorfologia	21
Solos	22
Bacias hidrográficas.....	22
Bacia do Rio Purus.....	22
Bacia do Rio Juruá.....	22
Clima.....	23
Vegetação	24
Floresta Ombrófila Densa (FOD)	24
Floresta Ombrófila Aberta (FOA)	27
Campinas e campinaranas	27
Ocupação humana.....	28
Áreas Protegidas	32
História da exploração ornitológica no estado do Acre.....	37
As primeiras pesquisas no sudoeste amazônico brasileiro (rios Juruá e Purus) entre 1900 e 1950.....	39
Início da exploração ornitológica no estado do Acre	40
O meu começo na Ornitologia (1992 – 2001).....	45
Os anos 2002 – 2004.....	46
As expedições realizadas dentro do Projeto Avifauna do estado do Acre	47
Expedição à Estação Ecológica Rio Acre	47
Expedição ao Ramal Jarinal	47
Expedição à campinarana no Alto Juruá	48
Expedição ao Alto Purus	49
O período 2008 – 2010.....	50
Os anos 2010 – 2015.....	51
A observação de aves (<i>birdwatchers</i>)	51
A descoberta do Acre pelos <i>wikiaveanos</i>	52

A criação do Ornitolab e as primeiras dissertações de mestrado	53
Localidades ornitológicas	54
Aves do Acre em números	57
Riqueza de espécies	59
Aves migratórias	61
Espécies migratórias que passam pelo Acre	61
Espécies endêmicas	65
Espécies ameaçadas	67
Ambientes de ocorrência	68
Aves associadas às florestas dominadas por bambus: os tabocais	68
Espécies associadas às campinas e campinaranas	69
Espécies de ambientes abertos e urbanos	69
Distribuição geográfica	70
Padrão de distribuição das espécies no estado do Acre	70
Aves do Acre	77
Por que reunir a lista de todas as espécies que ocorrem no estado do Acre?	79
Critérios para composição do catálogo	80
Registros	80
<i>Habitat</i>	80
Distribuição	81
Taxonomia	81
Status das espécies	81
Comentários	82
Critérios para citação de registros publicados no site www.wikiaves.com.br	82
Catálogo das aves	84
Não-Passeriformes	85
Passeriformes	431
Referências bibliográficas	853
Agradecimentos	869
Índices	873

Prefácio

Dr. Alexandre Aleixo

Pesquisador Titular e Curador da Coleção Ornitológica do Museu Paraense Emílio Goeldi

Na perspectiva de uma sociedade brasileira majoritariamente atada ao litoral do país, onde ainda se concentram os seus maiores centros urbanos, o estado do Acre é sinônimo de localidade remota. De fato, geograficamente a capital estadual Rio Branco é a terceira no país mais distante de Brasília, ficando atrás apenas de Manaus e Boa Vista. Além de longínqua em relação aos grandes centros econômico e político do Brasil, a integração do Acre ao território nacional foi relativamente recente, tendo pertencido anteriormente à Bolívia e sido formalmente transferido ao Brasil apenas em 1903, mediante um acordo diplomático. Todos esses fatores combinados explicam bem a condição do Acre como um estado fronteiriço e de história recente num país gigantesco e de grandes contrastes regionais.

Dadas essas condições, não é de se estranhar que o conhecimento sobre a Biodiversidade do Acre seja ainda bastante reduzido. Mesmo quando se considera a região Amazônica, onde se insere o Estado, o nível de conhecimento sobre a sua Biodiversidade é bem menor do que aquele existente, por exemplo, para os estados do Pará e Amazonas, mais intensamente amostrados em função de seus históricos mais antigos de ocupação, além dos seus maiores contingentes populacionais e número e tamanho de centros urbanos.

Por todos esses fatores combinados, o estado do Acre teria tudo para poder ser considerado um dos menos conhecidos quanto à sua avifauna, tanto no contexto Amazônico quanto nacional. Felizmente, esse verdadeiro axioma é superado completamente pela presente obra, *Aves do Acre*, de autoria do meu querido amigo Edson Guilherme.

Falsear um axioma não é algo fácil, mas esse é tipicamente o resultado do trabalho persistente de pessoas corajosas, focadas e inconformadas com uma realidade negativa, que necessita de mudança. Esse é um ímpeto nada incomum dentre aquelas pessoas que nasceram no Acre ou adotaram esse Estado como seu lar. A história do Acre é cheia de figuras que quebraram paradigmas vigentes com vontade de ferro e acabaram entrando para a história não apenas do Estado, mas de todo o Brasil, como por exemplo Plácido de Castro, Chico Mendes e, mais recentemente, Marina Silva.

O axioma que destinava a avifauna do Acre a ser tão mal conhecida quanto o restante da sua Biodiversidade começou a ser quebrado,

Apresentação

Prof. Dr. Minoru Martins Kinpara

Reitor da Universidade Federal do Acre

de modo irreversível, no começo da década de 1990, quando foram criadas de modo pioneiro no Estado as primeiras reservas extrativistas do Brasil. Nesse novo modelo de ocupação territorial que substituiu a semiescravidão pela gestão comunitária do uso da terra e seus recursos naturais, a caracterização local da Biodiversidade foi um requisito legal para a gestão das unidades recém-criadas. Um novo ciclo de expedições biológicas no estado do Acre teve então início, levado à cabo majoritariamente por instituições de fora do Estado, como antes, mas desta vez já com o envolvimento de biólogos residentes no Acre, como era o caso do então graduando em ciências biológicas Edson Guilherme.

Data, portanto, desse período, a origem deste livro. Cidadão acreano por opção, Edson Guilherme passou a documentar de modo diligente a avifauna do Estado desde então, eventualmente desenvolvendo um Doutorado sobre o assunto, o que fundamentou em grande parte esta publicação. Apesar do livro incluir resultados de “apenas” 10 anos de compilações, muitos dos trabalhos que o embasam são anteriores a esse período, incluindo vários de autoria do próprio Edson Guilherme.

O resultado final é um catálogo completo sobre a avifauna do Estado, onde constam informações detalhadas sobre a distribuição, preferências ecológicas, hábitos gerais e até taxonomia das espécies e subespécies de ocorrência no Acre. Em seu grande detalhamento e quantidade de informações, *Aves do Acre* só encontra paralelo em outras duas compilações existentes sobre avifaunas estaduais no Brasil, uma para o estado do Rio Grande do Sul e a outra para o estado de São Paulo, duas das unidades federativas que mais concentram ornitólogos, ornitófilos e estudos ornitológicos no país. Portanto, pode-se afirmar, sem exagero, que *Aves do Acre* alça a avifauna deste Estado à categoria da mais bem conhecida do Bioma Amazônia, principalmente devido à expansão relativamente recente do número de localidades amostradas em todo o Estado, fruto em grande parte do esforço pessoal de Edson Guilherme.

O trabalho é tão completo que aborda inclusive o que ainda é desconhecido sobre a avifauna do Estado, servindo portanto como uma base de dados sem paralelo para estudos futuros sobre a avifauna do Acre, cujo número de espécies (que já passa de 700) continuará crescendo por muitos anos ainda.

Desse modo, Edson Guilherme faz uma contribuição ímpar para a avifauna brasileira e reverte uma lógica perversa que condena a Região Norte em geral, e o estado do Acre em particular, a serem pouco conhecidos quanto à sua Biodiversidade.

Publicações como *Aves do Acre* constituem a base para uma perspectiva otimista sobre o futuro da ciência e do meio ambiente na Amazônia. Por isso tudo, parabéns Guilherme. Nós, leitores e usuários, o agradecemos por cada página deste livro, repletas do seu esforço, entusiasmo e paixão pelas aves do nosso querido estado do Acre.

Sinto-me honrado com o convite para apresentar o *Aves do Acre*. Embora minha área específica não seja Ornitologia, não foi difícil perceber que esta obra ocupará um espaço relevante neste campo de estudo. Leitores não especializados também poderão explorar os aspectos históricos, geográficos e estéticos do trabalho.

Os pássaros são encantadores e cheios de mistérios. O astrônomo Kepler, há mais de quatro séculos, em *O mistério cosmográfico*, escreveu que ninguém pergunta sobre a utilidade do canto dos pássaros, pois o canto é o seu prazer.

Aqui, na nossa região, não há nada mais fascinante que o canto do irapuro (ou uirapuru, numa grafia menos popular). Para nós, quando este pássaro canta, a floresta silencia. O grande privilégio é alguém ter a oportunidade de ouvi-lo, dada sua raridade.

Não é sem sentido, que, nesse livro, a gravação e divulgação do canto do irapuro, em 1962, aqui no estado do Acre, ganha destaque especial. Por ser uma espécie endêmica, aumentam os mistérios em torno do canto dessa belíssima ave, visto não ser possível encontrá-la com facilidade.

As dimensões histórica e geográfica do Acre, contidas no livro, tanto auxiliam os leitores quanto ampliam o leque de interessados. À medida que se faz uma descrição geográfica do Estado, entremeada com informações históricas, os leitores não acrianos¹ poderão ter uma boa noção do território objeto dessa obra, principalmente no capítulo sobre a história da exploração ornitológica do espaço estudado.

Como já mencionado, esse livro não atende apenas às necessidades dos especialistas. Além disso, ele pode ser muito útil nas ações públicas de preservação das aves acrianas, em seu conjunto, visto que indica a distribuição geográfica das espécies existentes em nosso Estado, inclusive daquelas com maiores probabilidades de extinção.

Não podemos também deixar de mencionar, como o próprio autor escreveu, que o *Aves do Acre* se tornará uma obra referência na área da Ornitologia acriana.

¹ A grafia “acrianos” está conforme as regras propostas pelo *Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990*. Contudo, nas demais partes desta obra, o autor preferiu utilizar o termo “acreano”, consagrado popularmente.

Introdução

Este livro é o resultado de 10 anos de compilação de dados sobre a Ornitologia do estado do Acre (2005 – 2015). O início desta compilação se dá a partir de 5 de julho de 2005. Foi nesta data que ingressei no Curso de Doutorado da Universidade Federal do Pará/ Museu Paraense Emílio Goeldi em Belém, estado do Pará. Desde então, tudo que se refere às aves do Acre passou a ser reunido em uma base de dados que já ultrapassou a marca dos 10.000 registros.

O primeiro capítulo foi todo dedicado ao estado do Acre, sua localização geográfica e características físicas. O intuito é deixar o leitor minimamente informado sobre a área de estudo e o contexto socioambiental onde as aves do Acre vivem. A partir do Capítulo 2, me dedico propriamente à Ornitologia do Estado. Este capítulo traz um relato das expedições ornitológicas ao sudoeste da Amazônia brasileira e, em especial, do estado do Acre: dos primórdios à atualidade. São 65 anos de exploração ornitológica no Estado (1950 – 2015). No capítulo seguinte, os resultados destas pesquisas são apresentados em números. Neste capítulo, algumas perguntas relacionadas à riqueza, *status*, preferência por *habitat* e distribuição geográfica das aves do Acre são respondidas e discutidas à luz do conhecimento atual.

O Capítulo 4 é o mais extenso e também o mais detalhado. Este capítulo é uma espécie de catálogo que agrupa de forma individualizada as informações sobre cada espécie de ave registrada em território acreano nos últimos 65 anos. A composição deste catálogo foi árdua. A princípio, reunimos toda a literatura disponível e, só então, começamos a digitalizar o seu conteúdo em uma planilha do Excel. Para a sua composição, fui além dos artigos publicados (mais simples de encontrar). Reuni diversos relatórios de expedições que nunca foram publicados formalmente e que se encontravam esquecidos em gavetas e estantes. Procurei, nas coleções de Museus do Brasil e de outras partes do mundo, por espécimes de aves coligidos nos limites territoriais do Acre. Foram inúmeros *e-mails* enviados a curadores de coleções científicas e também aos pesquisadores que aqui estiveram em algum momento das últimas seis décadas. Com um deles, José Hidasí, correspondemo-nos via carta de papel, por ele não estar habituado

com a modernidade do correio eletrônico. Todo este esforço foi feito no sentido de obter o maior e mais acurado número de registros possível sobre as nossas aves. Após a organização das informações, confeccionei os mais de 700 mapas de distribuição para que o leitor possa ter uma ideia da localização geográfica de cada registro. Os mapas são importantes porque nos mostra a concentração de registro das espécies em uma determinada região, bem como as áreas pouco (ou não) amostradas. Com tudo isso feito, faltava um último desafio: conseguir as imagens para ilustrar cada uma das espécies do catálogo. Eu tinha algumas fotos pessoais, mas não chegava a 1/3 do que precisava. Para tanto, recorremos aos usuários do site Wikiaves que prontamente nos atenderam. Agora, temos um catálogo ilustrado e com uma grande quantidade de fotos tiradas dentro do estado do Acre.

Esta obra não é um guia de campo para identificação de aves. Não me ative a descrever a morfologia das espécies. A proposta é agrupar, em um único volume, todas as informações que fomos capazes de obter sobre as aves do Acre. Com a publicação deste volume, o Acre passa a ter uma obra de referência para a consulta sobre dados ornitológicos em seu território. Tenho certeza de que este livro poderá ser útil, não só para a Academia (desde o nível primário ao superior), mas também poderá ser utilizado pela comunidade em geral. Gestores de Unidades de Conservação, órgãos públicos de todos os níveis também poderão se utilizar das informações para compor relatórios técnicos, documentos temáticos, bem como saber o grau de conhecimento existente sobre as aves em uma determinada área de interesse dentro do Estado.

Espero que o *Aves do Acre* seja útil aos leitores e que estes se inspirem na beleza e no canto das aves para promover a conservação das nossas florestas.

Viva as aves do nosso Brasil!

E.G.



Estado do Acre: aspectos gerais

Áreas e limites geográficos

O estado do Acre está localizado na região sul-ocidental da Amazônia Legal e faz fronteira internacional com o Peru e a Bolívia e nacional com os estados do Amazonas e Rondônia (Figura 1). A superfície territorial do Estado é de 164.221,36 Km², correspondente a 4,26% da Região Norte e a 1,92% do território nacional (Governo do Acre, 2015).



Figura 1 – Localização geográfica do estado do Acre.

Geologia e Geomorfologia

O relevo é composto, predominantemente, por rochas sedimentares de origem terciária e quaternária (Cavalcante, 2006; Latrubesse *et al.*, 1997). Exceção se faz apenas no oeste do Estado, no Complexo Fisiográfico da Serra do Divisor, onde há presença de rochas mais antigas de idade cretácica (Latrubesse *et al.*, 1994). As unidades geomorfológicas presentes no Acre são: Depressão

Amazônica, Planalto Rebaixado e Planície Amazônica. A Depressão Amazônica é caracterizada pela dissecação e pelo posicionamento intermediário logo acima da Planície Amazônica e abaixo dos relevos mais conservados da área; a feição de relevo mais comum desta unidade é a colinosa.

O Planalto Rebaixado é representado no Acre por baixos platôs, localizados nos interflúvios dos principais rios. Já a Planície Amazônica localiza-se às margens dos grandes rios do Estado. Esta unidade morfoestrutural comporta extensas áreas alagadas e de inundação, onde ocorrem os ambientes conhecidos como paranás, igapós e várzeas, além de uma grande quantidade de lagos (Acre, 2000). As altitudes nas depressões variam entre 130 a 440 m acima do nível do mar. No entanto, é no planalto residual da Serra do Divisor, que inclui as serras da Jaquirana, do Moa, do Juruá-Mirim e do Rio Branco, que estão presentes as maiores altitudes do Acre e também da Amazônia Ocidental (entre 270 e 750 m) (Cavalcante, 2006).

Solos

Os principais tipos de solos encontrados no Acre são: Argissolos, Alissolos, Luvisolos, Latossolos, Cambissolos, Vertissolos, Neossolos e Gleissolos. Em termos percentuais, os Argissolos predominam, ocupando cerca de 64% do território (Acre 2000). Segundo dados divulgados pelo Zoneamento Ecológico Econômico do Acre, apenas 2% das terras do Estado têm aptidão boa para a produção intensiva de grãos. A totalidade das terras com esta característica está no leste do Estado. Por isso, é nesta região que está concentrada quase toda a sua produção agropecuária. Os demais tipos de solos do Estado (cerca de 85%) são aptos, tão somente, para exploração de culturas perenes e de espécies florestais e frutíferas em sistemas agroflorestais (Acre, 2000).

Bacias hidrográficas

O estado do Acre é formado basicamente por duas grandes bacias hidrográficas: a do Rio Purus, localizada na região central e leste; e a do Rio Juruá, localizada no oeste do Estado (Figura 2). Todos os rios e igarapés das duas bacias pertencem à rede hidrográfica do Rio Amazonas. A rede de drenagem no Estado é bem distribuída, sendo que os rios possuem forma meândrica com pequenos trechos retilíneos que correm sobre rochas sedimentares na direção sudoeste-nordeste.

Os rios do Acre são o principal meio de transporte para as populações que vivem no interior do Estado. Inclusive, o surgimento dos povoados que deram origem a quase todas as cidades do Acre, como Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Brasília, Tarauacá entre outras, está ligado à rede de drenagem da região.

Bacia do Rio Purus

O Purus é um rio sinuoso e meândrico que nasce no Peru e entra em território brasileiro através do estado do Acre. Trata-se do segundo maior representante da drenagem do Estado. Este rio corta o Acre na sua porção central, no sentido sudoeste-nordeste, em direção ao estado do Amazonas. É a principal ligação entre o município de Santa Rosa do Purus com a cidade de Manoel Urbano. Possui como principais afluentes, em sua margem direita, o Rio Chandless, no município de Santa Rosa do Purus; o Rio Iaco, na fronteira do Acre com o Amazonas e o Rio Acre, que corta a cidade de Rio Branco e deságua em suas águas na cidade de Boca do Acre, dentro do estado do Amazonas.

Bacia do Rio Juruá

O Rio Juruá nasce no Peru e adentra o território brasileiro pelo município de Marechal Thaumaturgo

no Acre. É o maior rio do Estado em drenagem com uma bacia hidrográfica total de 25.000 Km² dentro dos limites do Acre. Possui um curso totalmente navegável por pequenas embarcações, entre Marechal Thaumaturgo e Cruzeiro do Sul, durante todo o ano e, por grandes embarcações, na época chuvosa, de novembro a abril. Isto faz do Juruá o principal meio de comunicação entre os cinco municípios do extremo-oeste do Estado. Seus principais afluentes da margem esquerda são: o Amônia, o Aparição, o São Luiz, o Paratari, o Rio das Minas, o Ouro Preto, o Juruá Mirim, o Paraná dos Mouras e o Rio Moa. Já em sua margem direita, os principais afluentes são: o Breu, o Caipora, o São João, o Acuriá, o Tejo, o Grajaú, o Natal, o Humaitá e o Valparaíso (Acre, 2000).




Figura 2 – Localização das duas principais bacias hidrográficas do estado do Acre.

Clima

O clima do estado do Acre é quente, com umidade relativa do ar variando em torno de 80 a 90%. Como nas demais regiões da Amazônia, no Acre há duas estações distintas: uma seca, caracterizada pela diminuição da precipitação, que se estende de maio a outubro; e outra chuvosa, caracterizada por chuvas constantes, que vai de novembro a abril (Duarte & Marcarenhas, 2007). Durante a estação seca é comum acontecer uma queda brusca da temperatura na região. Este fenômeno é conhecido localmente como “friagem” e é o resultado do avanço da Frente Polar que, impulsionada pela Massa de Ar Polar Atlântica, avança sobre a planície do Chaco chegando até a Amazônia ocidental (Acre 2000). A pluviosidade do Estado varia em torno de 1600 mm e 2750 mm. No Acre, os maiores índices pluviométricos são registrados na sua porção oeste, mais próxima do Equador e mais preservada, enquanto os menores índices estão na região leste, mais desmatada (Cunha & Duarte, 2005).

Três subtipos climáticos, segundo a classificação de Köpen, foram identificados para o Estado: *Af3* (no vale do Juruá) com média das chuvas, no mês mais seco, superior a 60 mm e total anual de chuvas entre 2000 e 2500 mm; *Am3* (no vale do Purus) com média das chuvas, no mês mais seco, superior a 30 mm e inferior a 60 mm, e total anual de chuvas entre 2000 e 2500 mm; e *Am4* (no Vale do Acre) com média das chuvas, no mês mais seco, em torno de 30 mm e total anual das chuvas entre 1500 e 2000 mm (Cunha & Duarte, 2005; Duarte, 2007, 2008; Figura 3). A temperatura média anual do Estado está em torno de 24,5°C, sendo que a máxima varia em torno de 32°C (Acre, 2000).




Figura 3 – Distribuição das regiões climáticas no estado do Acre. Fonte: Duarte (2008).

Vegetação

O Zoneamento Ecológico Econômico do Acre – ZEE (Acre 2000), reconheceu três regiões fitoecológicas para o Estado. São elas: região de domínio da Floresta Ombrófila Densa; região de domínio da Floresta Ombrófila Aberta e a região das campinas e campinaranas (Figura 4). Esta classificação foi adotada no Capítulo 4 para a identificação dos principais *habitats* das aves do Acre.

Floresta Ombrófila Densa (FOD)

É constituída basicamente por árvores de grande porte (entre 20 e 50 m), além de lianas e epífitas. A sua distribuição dentro do estado do Acre está relacionada às condições geológicas (sedimentos terciários e quaternários) em áreas com precipitação anual acima de 2300 mm e temperatura média girando em torno de 22° e 23°C (IBGE, 2005). É no oeste do Estado que tais características geomorfológicas e climáticas são mais evidentes. Nesta região, o clima é chamado de ombrotérmico, ou seja, o período de estiagem é muito curto ou quase inexistente. A característica tipológica deste tipo de floresta é a presença de um dossel emergente ou uniforme e sub-bosque ralo ou ausente (Acre, 2000). De acordo com as características edáficas e altimétricas as FODs foram subdivididas em três formações: aluvial, das terras baixas e submontana (IBGE, 2005; Figuras 4 e 5).




Figura 4 – Principais tipos de vegetação encontrados no estado do Acre.



Figura 5 – Vista panorâmica da Serra do Divisor recoberta por Floresta Ombrófila Densa submontana. Fonte: Governo do Acre (Imac).



Figura 6 – Floresta Ombrófila Aberta com palmeiras.



Figura 7 – Floresta Ombrófila Aberta com bambus.



Figura 8 – Floresta Ombrófila Aberta aluvial.

Floresta Ombrófila Aberta (FOA)

É constituída por meso e macrofanerófitos, como na Floresta Densa, porém, apresenta uma dominância de formas biológicas de fanerófitas rosuladas e lianas lenhosas (IBGE, 2005). As FOAs estão associadas às rochas sedimentares de idade Plio-Pleistocênica da sub-região dos baixos platôs da Amazônia, dissecada na forma de interflúvios colinosos ou em relevo ondulado (Formação Solimões) (Acre, 2000). As FOAs ocorrem na maior parte do estado do Acre e ocupam distintas unidades geomorfológicas. De acordo com critérios edáficos e altimétricos, as FOAs foram subdivididas em duas formações: terras baixas e aluvial (IBGE, 2005; Figuras 4, 6, 7 e 8). Estas formações são ainda diferenciadas em diversas tipologias florestais, de acordo com a relativa dominância de palmeiras, bambus e/ou cipós (IBGE, 2005; Acre, 2000; Figuras 6, 7 e 8).

Campinas e campinaranas

São formações vegetais encontradas na Amazônia e que se desenvolvem sobre solos de areia branca (Anderson, 1981; IBGE, 2005; Silveira, 2003). Estes solos são extremamente pobres em nutrientes, com subsolo bastante impermeável (Jirka *et al.*, 2007). Por isso, as campinaranas apresentam proporcionalmente uma camada mais espessa de raízes superficiais quando comparadas com outros tipos de florestas da Amazônia (Jirka *et al.*, 2007; Silveira, 2003). As campinas são caracterizadas pela



Figura 9 – Vista panorâmica de uma campina na região do Igarapé Cruzeiro do Vale – Município de Porto Walter, oeste do Acre.

vegetação com sub-bosque de porte baixo e irregularmente aberto. Neste ambiente, há poucas árvores emergentes e uma densidade alta de árvores pequenas e finas (Silveira, 2003). No Acre, as campinaranas só foram encontradas na Bacia do Rio Juruá, sobretudo nos municípios de Cruzeiro

do Sul e Mâncio Lima (Figura 4). Em geral, estão presentes em áreas drenadas por rios de água preta, como os rios Bagé e o Machadinho (Acre, 2000). Silveira (2003) descreveu quatro tipologias para a vegetação que cresce sobre solo de areia branca no sudoeste amazônico. São elas: campina aberta arbustiva, campina dominada por *Mauritia flexuosa* (buriti), campina gramíneo-lenhosa e campinarana *lato sensu*. Além das campinaranas localizadas próximas à fronteira com o Amazonas, há vários enclaves deste tipo vegetacional ao longo da Bacia do Rio Juruá entre os municípios de Cruzeiro do Sul e Marechal Thaumaturgo. Entre eles está uma mancha de campinarana no município de Porto Walter, na margem esquerda do Igarapé Cruzeiro do Vale, que amostramos, do ponto de vista ornitológico, em 2007 (Guilherme & Borges, 2011; Figura 9).

Ocupação humana

Evidências sugerem que as terras baixas da Amazônia são ocupadas por ameríndios, caçadores e coletores nômades desde o final do Pleistoceno, há cerca de 11 mil anos antes do presente (Cleary, 2001). No sudoeste amazônico, região onde hoje se localiza os limites do estado do Acre, o vestígio mais antigo da presença humana foi revelado a partir da datação de fragmentos cerâmicos encontrados em um sítio arqueológico no município de Xapuri. Os fragmentos de vasos e urnas, encontrados em estruturas de terra circulares (geoglifos), revelaram que a região teria sido ocupada entre três e dois mil anos antes do presente (Nícole, 2000).

Mesmo não havendo um consenso entre os arqueólogos sobre a data precisa da chegada ameríndia na Amazônia sul-ocidental (Nícole, 2000), o fato é que, muito antes do homem europeu aportar por aqui, vários grupos indígenas já habitavam esta região. Atualmente, ao menos 12 etnias ainda sobrevivem no Acre, sendo a dos Kaxinawá a que possui o maior número de indivíduos (Pimenta, 2003).

A história da colonização moderna do estado do Acre está estritamente ligada à extração de látex. Antes da década de 1870, o sudoeste da Amazônia era conhecido apenas por alguns exploradores solitários, como o geógrafo inglês William Chandless, que subiu o Rio Purus em 1864/65 (Pimenta, 2003) e o Rio Acre em 1866 (Rancy, 1985). Porém, nenhum destes exploradores chegara a estabelecer qualquer núcleo de povoamento. Até então, as populações indígenas na região viviam totalmente isoladas do mundo moderno. Foi somente a partir do final do Século XIX, que veio para o Acre uma grande quantidade de nordestinos, em busca de explorar uma riqueza abundante na região, a seringueira. Estes nordestinos se estabeleceram na região e formaram, ali, os primeiros povoados e vilas, cuja economia baseava-se na extração gumífera. Este período ficou conhecido como o “Ciclo da Borracha”. Foi nesta época que iniciaram-se os conflitos com a Bolívia pelo domínio e posse das terras do Acre.

A partir de então, o ritmo de colonização do Estado não parou mais, alternando períodos com alto fluxo migratório e períodos de estagnação. Em meados do Século XX, após já ter resolvido seus conflitos de fronteira com os países vizinhos (Bolívia e Peru), o Acre sofreu dois ciclos migratórios bem marcados.

O primeiro destes ciclos se deu na década de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial. Nesta época, os seringais asiáticos haviam sido tomados pelos japoneses. Isto fez da Amazônia brasileira a única alternativa de fornecimento de látex para suprir a indústria bélica americana. Assim, o Brasil, em acordo com os Estados Unidos da América, incentivou maciçamente a ida de nordestinos para a Amazônia e, em particular, para o estado do Acre, onde já existiam inúmeros seringais praticamente abandonados. No entanto, com o fim da Segunda Guerra, o governo americano parou de enviar os recursos financeiros que subsidiavam a produção de látex na Amazônia. Desta forma, os seringais acreanos entraram novamente em franco declínio.

O segundo ciclo migratório ao Acre ocorreu a partir das décadas de 1960 e 1970, através das políticas desenvolvimentistas e de integração dos governos militares. Desde então, passaram

a chegar à região imigrantes vindos das regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste do país, em busca de grandes extensões de terras de baixo custo para serem utilizadas, sobretudo, em atividade pecuária. A chegada dos chamados “sulistas” ao Acre provocou diversos conflitos com os seringueiros que ainda viviam do extrativismo no interior da floresta. Muitos foram expulsos de suas colocações e tiveram como destino a periferia das cidades acreanas.

É nesta época que surgem os primeiros projetos de assentamentos no Acre. Destes, o primeiro e maior Projeto de Assentamento Dirigido (PAD) foi chamado de Pedro Peixoto, abrangendo uma área significativa do extremo leste do Estado. Segundo o ZEE-Acre (Acre, 2000), existem, hoje, 53 projetos destinados à ocupação de terras no Acre, o que corresponde a uma área de 9% do território acreano. A grande maioria destes assentamentos está localizada no leste do Estado (Figura 10). Aliado a isto, há, nesta porção do Estado, a influência das BRs 317 e 364, fazendo com que se torne a região com maior concentração de terras desmatadas do Acre (Figura 10).

De acordo com o último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE no ano 2000, no estado do Acre, havia 557.526 habitantes. Destes, 65% estavam na zona urbana e os 35% restantes na zona rural. Entretanto, em uma contagem realizada pelo IBGE, no ano de 2007, foi estimada uma população de 655.385 habitantes para o Estado (www.ibge.gov.br; Tabela 1).



Figura 10 – Localização dos principais projetos de assentamento no leste do estado do Acre. As linhas vermelhas observadas no interior dos círculos em destaque indicam a localização dos assentamentos do Incra.

O estado do Acre possui 22 municípios, tendo a cidade de Rio Branco como sua capital (Figura 11, Tabela 1). De acordo com a última contagem feita pelo IBGE (op. cit.), em Rio Branco havia 288.614 habitantes, em 2007, e atualmente deve ter em torno de 348.354 pessoas. Este percentual, estimado em 2014, corresponde a 45,9% de toda a população do Acre (Tabela 1).



Figura 11 – Divisão geopolítica do estado do Acre.
Os pontos negros indicam a localização das sedes municipais.

Tabela 1 – Contagem da População do estado do Acre em 2007. População residente(*), em 1º de abril de 2007, e estimativa em 2014, em cada município.

Ordem	Municípios	População em 2007	Estimativa em 2014
1	Acrelândia	11.739	13.011
2	Assis Brasil	5.413	6.308
3	Brasília	19.064	22.261
4	Bujari	6.311	8.782
5	Capixaba	8.456	9.368
6	Cruzeiro do Sul	74.101	79.819
7	Epitaciolândia	13.344	15.679
8	Feijó	31.257	32.560
9	Jordão	6.081	6.898
10	Mâncio Lima	13.753	15.890
11	Manoel Urbano	7.114	8.224
12	Marechal Thaumaturgo	13.144	15.123
13	Plácido de Castro	17.234	17.587
14	Porto Acre	13.845	15.534
15	Porto Walter	8.040	9.711
16	Rio Branco	288.614	348.354
17	Rodrigues Alves	12.305	15.260
18	Santa Rosa do Purus	3.963	5.061
19	Sena Madureira	34.221	39.366
20	Senador Guiomard	18.899	20.588
21	Tarauacá	32.311	36.763
22	Xapuri	14.411	16.639
Total		653.620	758.786

Fonte: IBGE, Contagem da População 2007

(*) Publicada no Diário Oficial da União de 05/10/2007. Estimativa em 2014 (http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2014/estimativa_tcu.shtm).

O estado do Acre está dividido em cinco regiões de desenvolvimento. Estas regiões foram organizadas obedecendo aos limites da rede hidrográfica do Estado. São elas: Regional do Baixo Acre, Alto Acre, Juruá, Purus e Tarauacá/Envira (Acre, 2000). A Regional do Baixo Acre é a que concentra maior densidade populacional e também a que apresenta maior desenvolvimento econômico. A economia do Estado está baseada no “setor primário” com a unidade produtiva predominantemente familiar, concentrada, sobretudo, nas atividades extrativistas (madeira, borracha e castanha) e agropecuárias (agricultura e pecuária). O setor industrial no Estado ainda é muito pouco desenvolvido. A maioria são microempresas, ou empresas familiares, sendo quase 70% delas concentradas no município de Rio Branco. A principal atividade destas microempresas está ligada à transformação da madeira (serrarias e marcenarias). Já o restante das pequenas indústrias do Estado está associado ao beneficiamento de produtos alimentícios (produção de farinha, beneficiamento de castanha, fábricas de biscoitos, etc.) (Acre, 2000).

Áreas Protegidas

O estado do Acre possui, atualmente, 15 Unidades de Conservação (UCs) federais e estaduais e 35 Terras Indígenas (TI) (Figura 12; Tabela 2). Das UCs, três são de proteção integral (que não podem ser habitadas) e 12 de uso sustentável (i.e., onde a presença e as atividades humanas são permitidas) (Figura 13).




Figura 12. Localização das Áreas Protegidas do estado do Acre (Unidades de Conservação + Terras Indígenas). Apenas as Terras Indígenas homologadas estão representadas nesta figura.

As UCs de proteção integral estão representadas por um Parque Nacional (PN) (Serra do Divisor); um Parque Estadual (PE) (Chandless) e uma Estação Ecológica (Rio Acre). Já as Unidades de uso sustentável estão representadas por três Florestas Nacionais (FLONAs) (Macauã,

Santa Rosa do Purus e São Francisco); quatro Florestas Estaduais (FE) (Antimary, Rio Liberdade, Mogno e Rio Gregório); cinco Reservas Extrativistas (Resex) (Alto Juruá, Alto Tarauacá, Cazumbá-Iracema, Chico Mendes e Riozinho da Liberdade) (Figura 12; Tabela 2). Não estão incluídas aqui as áreas de proteção ambiental criadas e mantidas pelos municípios; as pequenas APAs (Áreas de Proteção Ambiental) estaduais e uma Área de Relevante Interesse Ecológico (Seringal Nova Esperança) (ISA, 2015). A área ocupada por cada Área Protegida é apresentada na Tabela 2.

As Unidades de Conservação de proteção integral do Acre (Figura 13) ocupam 9,3% do território do Estado. Trata-se do tipo de UC mais importante no que diz respeito à conservação da diversidade biológica, uma vez que não há permissão para a residência humana em seus limites. As três UCs de proteção integral do Acre, o Parque Nacional da Serra do Divisor (PNSD), a Estação Ecológica Rio Acre (ESEC – Rio Acre) e o Parque Estadual Chandless já tiveram seus planos de manejo concluído, sendo, desta forma, unidades relativamente bem conhecidas em relação às suas aves (Whitney *et al.*, 1997 n. p.; Aleixo & Poletto 2004 n.p.; Whitney *et al.*, 2004; Buzzetti, 2008; Aleixo & Guilherme, 2010).




Figura 13 – Classificação das Unidades de Conservação do estado do Acre por tipo de uso.

As Unidades de Conservação de Uso Sustentável (Figura 13) ocupam 15,3% do território do Acre. Deste total, mais de 76% da área é representada pelas Reservas Extrativistas (Resex), sendo que a Resex Chico Mendes (Figura 12) é a maior delas em extensão territorial (Tabela 2).

As Resex do Acre têm como função primária a extração de látex e a coleta de produtos florestais (e.g., castanha). Porém, há dentro destas UCs a produção agrícola de subsistência, a pecuária e a criação, em pequena escala, de animais domésticos (Cavalcanti, 2002; Ruiz-Pérez *et al.*, 2005). Do ponto de vista da biodiversidade, a Resex do Alto Juruá é a mais bem conhecida (Cunha & Almeida, 2002).

Segundo o Zoneamento Ecológico Econômico do Acre, o conjunto das Terras Indígenas ocupa um total de 14,2% do território do Estado. A maior parte das Terras Indígenas do Acre está concentrada na Bacia do Rio Juruá (Região Centro-Oeste) (Figura 13). A estimativa é de que a população indígena do Estado, em todas as terras demarcadas, não passe de 10.000 pessoas (Acre, 2000). As principais atividades desenvolvidas pelos índios em suas terras são a agricultura de subsistência e o artesanato (Acre, 2000). O conhecimento da biodiversidade dentro das Terras Indígenas do Acre ainda é bastante escasso.

Tabela 2 – Áreas Protegidas (Unidades de Conservação + Terras Indígenas) do estado do Acre com suas respectivas extensões (em hectares)

Unidades de conservação	Área (ha)	Unidades de conservação	Área (ha)
Federais		Jaminawa do Rio Caeté	*
ESEC Rio Acre	77.500	Jaminawa do Igarapé Preto	25.651
Flona Macauã	173.475	Jaminawa/Envira	80.618
Flona Santa Rosa do Purus	230.257	Jaminawa do Rio Caeté	*
Flona São Francisco	21.600	Kampa do Igarapé Primavera	21.987
PARNA Serra do Divisor	846.633	Kampa do Rio Amônia	87.205
Resex Alto Juruá	506.186	Kampa e Isolados do Rio Envira	232.795
Resex Alto Tarauacá	151.200	Katukina/Kaxinawa	23.474
Resex Cazumbá – Iracema	750.795	Kaxinawa/Ashaninka do Rio Breu	31.277
Resex Chico Mendes	970.570	Kaxinawa da Colônia Vinte e Sete	105
Resex Riozinho da Liberdade	325.603	Kaxinawa do Baixo Jordão	8.726
Estaduais		Kaxinawa do Rio Humaitá	127.383
Floresta Estadual Antimary	65.965	Kaxinawa do Rio Jordão	87.293
Floresta Estadual Mogno	143.897	Kaxinawa Nova Olinda	27.533
Floresta Estadual Rio Gregório	216.062	Kaxinawa Igarapé do Caucho	12.318
Floresta Estadual Rio Liberdade	126.360	Kaxinawa Praia do Carapanã	60.698
Parque Estadual Chandless	695.303	Kaxinawa Seringal Independência	14.750
Terras indígenas		Kulina do Igarapé do Pau	45.590
Alto Rio Purus	263.129	Kulina do Médio Juruá	730.142
Alto Tarauacá	142.619	Kulina do Rio Envira	84.365
Arara do Rio Amônia	20.764	Mamoadate	313.647
Arara/Igarapé Humaitá	87.572	Manchineri do Seringal Guanabara	*
Cabeceira do Rio Acre	78.512	Nukini	27.263
Campinas/Katukina	32.623	Nawa	*
Igarapé Taboca do Alto	287	Poyanawa	24.499
Jaminawa/Arara do Rio Bagé	28.9266	Rio Gregório	187.400
		Riozinho do Alto Envira	260.970

* Em processo de Identificação e Homologação

Fonte: (<http://www.socioambiental.org/> - Instituto Socioambiental – ISA).



**História da exploração
ornitológica no estado do Acre**

As primeiras pesquisas no sudoeste amazônico brasileiro (rios Juruá e Purus) entre 1900 e 1950

Desde o início do Século XIX (anos 1800), que a Amazônia brasileira vem recebendo a visita de exploradores e naturalistas interessados na sua exuberante avifauna (Sick, 1997). Apesar disso, demorou quase um século para que a porção sul-ocidental da Amazônia brasileira começasse a receber a visita dos primeiros exploradores e naturalistas interessados em sua ornitofauna. As primeiras grandes expedições ornitológicas ao sudoeste amazônico só ocorreram no início do Século XX (entre 1901 e 1940).

O primeiro conhecimento que se tem sobre as aves do Vale do Juruá foi baseado na expedição realizada pelo naturalista e coletor do Museu Paulista, Ernesto Garbe. Durante um ano, entre novembro de 1901 e novembro de 1902, Garbe permaneceu coletando animais de diversos grupos, incluindo as aves, na região do Médio Rio Juruá (estado do Amazonas), onde hoje é a cidade de Eirunepé (antiga Vila São Felipe e João Pessoa). Durante esta expedição, foram coletados 399 espécimes distribuídos em 188 espécies diferentes de aves. Os espécimes coletados por Garbe encontram-se depositados no atual Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo e foram estudados pelo alemão, naturalizado brasileiro, Hermann Friedrich Albrecht von Ihering (Ihering, 1904). Da coleção reunida pelo Sr. Garbe, foram descritas sete novas espécies para a ciência e divulgados 18 novos registros de aves para o território brasileiro (Ihering, 1904).

Entre julho de 1936 e fevereiro de 1937, o naturalista e coletor equatoriano Afonso M. Olalla, sua esposa, e mais quatro colaboradores, fizeram uma expedição à localidade João Pessoa (hoje Eirunepé), no Médio Rio Juruá (mesma localidade visitada por Garbe). Esta expedição foi realizada a pedido do Conde sueco Nils Gyldenstolpe do Museu de Estocolmo (*Royal Natural History Museum in Stockholm*), com recursos da *Knut & Alice Wallenberg Foundation* (Gyldenstolpe, 1945b). Os resultados desta expedição foram impressionantes. Ao todo, foram coletados 4.516 espécimes de aves, sendo que destes, mais da metade (2.785) foram enviados ao Museu de Estocolmo (Olalla, 1937). Todos estes espécimes foram, posteriormente, estudados, e os resultados divulgados pelo Conde N. Gyldenstolpe em uma bela e extensa monografia (Gyldenstolpe, 1945b).

A Bacia do Rio Purus, a exemplo da do Juruá, também recebeu suas primeiras grandes expedições ornitológicas no início do Século XX. Duas expedições científicas, realizadas entre junho e setembro de 1903 e fevereiro e maio de 1904, pela equipe de técnicos do Museu Paraense

Emílio Goeldi, exploraram o médio curso do Rio Purus dentro do estado do Amazonas (região entre Lábrea e Boca do Acre). Durante estas expedições, foram coletados, além de material botânico, 565 espécimes de aves. O estudo destes espécimes ficou a cargo da então pesquisadora do Goeldi, Emilia Snethlage. Em seu manuscrito, Snethlage revelou a presença de 193 espécies de aves para a região. Destas, ao menos 16 eram novos registros para o Brasil e quatro representavam novos táxons para a ciência (Snethlage, 1908).

Entre dezembro de 1921 e o final do ano de 1922, o coletor profissional Samuel M. Klages, do *Carnegie Museum* de *Pittsburgh* nos EUA, permaneceu coletando material zoológico no Médio Rio Purus, principalmente na localidade conhecida como Huitanaã (ou Hyutanahán), entre Lábrea e Boca do Acre. Cerca de 4.198 espécimes de aves foram coletados e enviados ao *Carnegie Museum*. Segundo Gyldenstolpe (1951), o material coletado por Klages nunca foi estudado em conjunto. Ao que parece, dentre a magnífica série por ele coligida, só foram feitas (por diversos pesquisadores, entre eles o ornitólogo W. E. C. Todd) pequenas revisões e descrições de alguns táxons isolados.

Entre setembro de 1935 e janeiro de 1936, Afonso M. Olalla e seus assistentes coletaram muitos espécimes de aves no Baixo e Médio Purus. Parte dos espécimes (cerca de 1.600 peles) foi vendida ao Museu de Estocolmo. De posse destes espécimes, o Conde Gyldenstolpe reuniu todas as informações disponíveis sobre a avifauna da Bacia do Purus e publicou um extenso compêndio sobre as aves daquela região (Gyldenstolpe, 1951). Passado mais de meio século (64 anos) desde a publicação da monografia de Gyldenstolpe, ela ainda continua sendo o trabalho mais completo sobre a avifauna da Bacia do Rio Purus.

Seguindo a cronologia das expedições ao sudoeste amazônico, até o ano de 1950, nenhum técnico, naturalista ou mesmo ornitólogo profissional havia coletado aves em território acreano. Por consequência disso, o conhecimento da avifauna do Acre ficou, por diversas vezes, sendo referido a partir da extensão da distribuição geográfica das espécies identificadas no Médio e Baixo Juruá e Purus como resultado das expedições já mencionadas (Pacheco & Parrini, 2002).

Início da exploração ornitológica no estado do Acre

A história ornitológica do Acre só tem início a partir de 1950. Nesta década, duas expedições zoológicas pioneiras, realizadas ao então Território do Acre, representaram o marco inicial do conhecimento de sua avifauna.

A primeira destas expedições ocorreu em agosto de 1951 e foi idealizada pelo herpetólogo, do Departamento de Zoologia da Secretaria de Agricultura do estado de São Paulo (hoje Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo), Paulo E. Vanzolini. O objetivo desta expedição foi a coleta de material zoológico em geral (Vanzolini, 1952). Nesta viagem ao Acre, Vanzolini teve a companhia de três técnicos da sua Instituição. Durante 24 dias, entre os meses de agosto e setembro daquele ano, a equipe permaneceu coletando no leste do Estado (na estrada que liga a cidade de Rio Branco a Plácido de Castro) (Vanzolini, 1952). Ao todo, foram obtidos 324 espécimes de aves. Todos estes espécimes foram depositados no Museu Paulista e o seu estudo ficou sobre a responsabilidade do ornitólogo Olivério M. de Oliveira Pinto.

A identificação dos espécimes revelou a presença das primeiras 141 espécies de aves de ocorrência comprovada para o estado do Acre (Pinto & Camargo, 1954; Figura 23). Destas, ao menos quatro táxons (entre espécies e subespécies) eram novos para o território brasileiro (Pinto & Camargo, 1954).

A segunda expedição pioneira ao Acre aconteceu em 1956, na porção oeste do Estado. Esta expedição foi realizada sob os auspícios do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA, tendo a colaboração do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), da equipe paleontológica do Museu Americano de História Natural de Nova York (*American Museum of Natural History* – AMNH)

e do Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, do Rio de Janeiro. Desta expedição participaram o ornitólogo do Museu Goeldi, Fernando da Costa Novaes, e os paleontólogos George Gaylord Simpson, do AMNH e Llewellyn Ivor Price, do DNPM. Durante três meses, de junho a setembro, os pesquisadores navegaram pelo Rio Juruá, de Cruzeiro do Sul à Foz do Rio Breu, próximo a fronteira com o Peru. O F. Novaes concentrou suas coletas ornitológicas em basicamente dois pontos: (a) nos arredores de Cruzeiro do Sul (quase todo o mês de junho) e (b) no Seringal Oriente, próximo de Marechal Thaumaturgo (agosto e setembro). Ao final desta expedição, Novaes e seu taxidermista M. Moreira haviam coletado os primeiros espécimes de aves para o extremo-oeste do Acre (377 no total). Destes espécimes, 96% encontram-se depositados no MPEG e o restante está no Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo e no *Louisiana State University Museum of Natural Science* – LSUMZ.

O próprio Novaes estudou as peles oriundas do Juruá. Neste estudo, o autor divulga a ocorrência das primeiras 180 espécies de aves no extremo-oeste do Acre (Novaes, 1957). Um ano após ter divulgado a lista de espécies do Juruá, Novaes publicou um segundo manuscrito, ainda como resultado da sua viagem ao Acre. Neste artigo, o autor procurou associar as aves observadas no Alto Juruá aos seus ambientes de ocorrência (Novaes, 1958). Considero esse manuscrito como um marco na história da Ornitologia do sudoeste amazônico, pois é o primeiro com enfoque eminentemente ecológico. Nele, Novaes nos brinda com informações detalhadas sobre a estratificação vertical das aves na floresta de várzea. Além disso, o autor descreve os principais *habitats* ribeirinhos e as aves associadas a eles em diversos trechos do Rio Juruá.

No ano de 1962, vem ao Acre o engenheiro químico e ornitólogo amador Johan Dalgas Frisch. Em visita ao seringal Bagaço, ao norte da capital Rio Branco, Dalgas gravou o canto do uirapuru-verdadeiro (*Cyphorhinus arada modulator*) no dia 9 de novembro. Esta gravação foi divulgada no Brasil e exterior através de um *long-play* lançado em 1963 (Frisch, 1963, 2005).

Em 1968, o coletor particular José Hidasí realizou uma breve visita ao estado do Acre. Durante os meses de maio e junho deste ano, J. Hidasí coletou mais de 250 espécimes no leste do Estado (J. Hidasí *in litt.*). Suas coletas foram concentradas no Seringal Nova Empresa (nos arredores de Rio Branco) e na Fazenda Campo Lindo (arredores da atual cidade de Capixaba). Segundo Sr. Hidasí (*in litt.*), o material por ele coligido foi distribuído (muitas vezes por permuta) a diversas instituições nacionais e estrangeiras. De fato, em uma tentativa de rastrear todo este material, encontramos espécimes oriundos de suas coletas no Acre depositados no LSUMZ, no *Florida Museum of Natural History* – FMNH, no Museu Nacional/Universidade Federal do Rio de Janeiro – MNRJ, na coleção particular do próprio coletor (CPJH) e no Museu de Ornitologia de Goiânia, ambos sediados na cidade de Goiânia, Goiás.

Na excelente coleção reunida por J. Hidasí havia, ao menos, uma espécie nova para o Brasil – a tiriba-rupestre (*Pyrrhura rupicola*), reportada anos depois (Sick, 1997); diversas espécies novas para a região do Acre (e.g., *Chaetura brachyura*, *Ramphotrigon megacephalum*, *Dacnis lineata*, entre outras) e espécies que representavam um significativo aumento da sua distribuição geográfica em território brasileiro (e.g., *Hemitriccus iobannis*, *Todirostrum chrysocrotaphum* e *Inezia inornata*). Porém, com exceção da tiriba-rupestre, os demais registros (op. cit.) permaneceram nas coleções científicas e jamais foram divulgados na literatura. Acredito que isto aconteceu porque seus espécimes foram distribuídos em diversas instituições, o que, evidentemente, inviabilizou o seu estudo em conjunto. Desta forma, apenas relatos esparsos sobre algumas espécies coletadas no Acre por J. Hidasí podem ser encontrados na literatura científica, como, por exemplo, nos artigos divulgados por: Pierpont & Fitzpatrick (1983); Teixeira *et al.* (1994); Hidasí & Bankovics (1997) e Sick (1997).

No ano de 1976, o funcionário do Instituto Evandro Chagas (Belém), Geraldo Pereira da Silva, coletou aves na região de Sena Madureira e Manoel Urbano. A finalidade primordial desta coleta foi a detecção, nas aves silvestres, de arboviroses. A coleção reunida por G. P. Silva no Acre foi modesta, com apenas 44 espécimes. Estes espécimes foram depositados no Museu Paraense

Emílio Goeldi e, posteriormente, estudados por F. Novaes. Apesar do pequeno número de espécimes obtidos, dois importantes registros foram feitos: o sabiá-de-cara-cinza (*Catharus minimus*) que é espécie migratória (primeiro registro para o estado do Acre) e o barranqueiro-ferrugem-do-acre, *Clibanornis watkinsi* (primeiro registro para o Brasil) (Novaes, 1978).

Entre o material coletado por G. P. Silva em diversas localidades amazônicas, a presença de um indivíduo conhecido popularmente como limpa-folha-de-bico-virado, pertencente à espécie *Syndactyla ucayalae*, causou certa polêmica quanto à sua origem. O espécime estava conservado em álcool e foi encontrado em um balde com etiqueta de Santarém – Pará. Na época, aquele indivíduo representava o primeiro registro desta espécie para o Brasil. Até então, a espécie era considerada endêmica da Amazônia peruana. Por este motivo, Novaes (1978) lançou dúvida sobre a presença de *S. ucayalae* no Pará. A sugestão de Novaes era a de que o espécime poderia ter sido coletado no Acre ou em Rondônia e ter sido acondicionado em um recipiente com indivíduos de outras localidades. No entanto, com a divulgação recente da presença desta espécie na região da Serra dos Carajás e de Altamira no Pará (Aleixo *et al.*, 2000), ficou claro que o espécime coletado por G. P. Silva pode mesmo ter vindo da região de Santarém no leste do estado do Pará (Aleixo *et al.*, 2000).

Após 10 anos sem qualquer visita de ornitólogos ao Acre, o célebre ornitólogo americano Theodore A. Parker III, em 1986, fez uma pequena viagem pela BR-317, no trecho entre Brasiléia e Rio Branco. Na ocasião, entre 9 de junho e 8 de agosto daquele ano, T. A. Parker realizava, em companhia de J. V. Remsen, Jr., um levantamento avifaunístico no Departamento de Pando, na Bolívia (Parker & Remsen, 1987). Assim, nos dias 26 e 27 de junho, T. A. Parker realizou um breve deslocamento até a cidade de Rio Branco. Durante o trajeto, o experiente ornitólogo americano observou, nos arredores da cidade de Capixaba, a maracanã-de-cabeça-azul (*Primolius couloni*). Aquele registro foi o primeiro desta espécie em território brasileiro (Parker & Remsen, 1987).

Três anos depois, em 1989, o inglês Bruce Forrester (observador de aves amador) realizou uma curta viagem entre Brasiléia, Rio Branco e Plácido de Castro. Logo em seguida, no ano de 1992, Forrester retorna à mesma região e também faz uma breve visita à cidade de Cruzeiro do Sul e seus arredores. Como resultado de suas observações no Acre, e em diversas localidades do Brasil, Forrester publicou, no ano seguinte, o livro intitulado: *Birding Brazil – A Check-list and Site Guide*. Em seu livro, destinado a ornitólogos amadores (conhecidos fora do Brasil como *Birders*), Forrester lista (apenas com os nomes em inglês) a ocorrência de 286 espécies para o estado do Acre. Alguns de seus registros foram importantes, tais como: *Emerald Toucanet – Aulacorhynchus prasinus* (o primeiro para o Brasil) – a subespécie de *A. prasinus* que ocorre na região foi recentemente elevada ao nível específico *Aulacorhynchus atrogularis* (CBRO, 2014). *Sclater's Antwren – Myrmotherula sclateri* e *Peruvian Recurvebill – Simoxenops ucayalae* (os primeiros para o Estado). No entanto, outros registros foram duvidosos, como por exemplo: *Rio Suno Antwren – Myrmotherula sunensis*. Neste caso, trata-se de uma espécie de difícil identificação em campo e, até hoje, a sua presença no Estado não foi confirmada por nenhum registro documental.

A década de 1990 foi marcada pela redescoberta do Acre como área prioritária para realização de novos levantamentos ornitológicos. O interesse científico por uma região de alta biodiversidade e a necessidade de realização do Plano de Manejo de duas grandes unidades de Conservação, localizadas no Alto Juruá, levaram para o oeste do Acre notáveis e experientes ornitólogos do Brasil e do exterior.

Entre julho de 1991 e junho de 1992, uma grande expedição zoológica multidisciplinar foi realizada, com apoio financeiro da *New York Zoological Society* e da *National Geographic Society*, ao longo de toda a extensão nacional do Rio Juruá (Peres, 1993; Patton *et al.*, 1994). Esta expedição teve como principal objetivo determinar a importância do Rio Juruá como barreira biogeográfica para diversos grupos zoológicos (Gascon *et al.*, 2000). Para acompanhar a equipe de herpetólogos e mastozoólogos nesta viagem, Carlos Peres (que à época prestava serviços ao Museu Goeldi) convidou o ornitólogo inglês Andrew Whittaker. Ao final da expedição, A. Whittaker conseguiu reunir, em território acreano, 527 espécimes de aves coletadas basicamente entre as cidades de

Porto Walter e Marechal Thaumaturgo (localidades Porongaba e Sobral). Todos estes espécimes estão depositados na coleção ornitológica *Dr. Fernando C. Novaes – MPEG* e parte dos resultados foi divulgado em Whittaker & Oren (1999).

No final de 1994, o ornitólogo do Museu Paraense Emílio Goeldi, David Oren, coordenou uma expedição de coleta e observações ornitológicas dentro da Reserva Extrativista do Alto Juruá – REAJ. Esta expedição foi custeada pela Fundação John D. e Catherine T. MacArthur, dentro do



Figura 14 – A primeira expedição ornitológica à Reserva Extrativista do Alto Juruá realizada em novembro de 1994. Da esquerda para direita: David Oren, Dionísio C. Pimentel e Andrew Whittaker.

projeto intitulado: “É possível populações tradicionais gerenciarem áreas de conservação ambiental? Um projeto-piloto na Reserva Extrativista do Alto Juruá” (Cunha & Almeida, 2002). Da equipe de Ornitologia que participou daquela expedição, faziam parte, além do coordenador, o ornitólogo Andrew Whittaker, eu, então estudante de biologia da Ufac, e o técnico em taxidermia, Dionísio C. Pimentel Neto (Figuras 14 e 15). Entre 16 de novembro e 5 de dezembro daquele ano, foram coletados 237 espécimes no trecho compreendido entre a Foz do Rio Tejo e a localidade conhecida como “Restauração”. Esta localidade situa-se na margem esquerda do Rio Tejo, aproximadamente 85 km a montante de sua foz. Todos os espécimes coletados na REAJ foram depositados na coleção ornitológica *Dr. Fernando C. Novaes – MPEG*. Na época, detectou-se 12 novos registros de aves para o território brasileiro e obteve-se um grande número de peles de espécies, endêmicas do sudoeste amazônico, cuja representação em coleções científicas no Brasil era quase inexistente (Whittaker & Oren 1999).

Ainda dentro do projeto mencionado acima, A. Whittaker retornou a REAJ em 1995. Nos anos seguintes, outros ornitólogos também visitaram aquela Unidade de Conservação, tais como: Fernando Pacheco e Ricardo Parrini (de agosto a setembro de 1997) e Ricardo Parrini em companhia

de Jeremy C. Minns (de setembro a outubro de 1999) (Pacheco & Parrini, 2002). Durante estas expedições, foram realizadas apenas observações e gravações. Ao final das campanhas de campo, todas as observações realizadas dentro da REAJ foram reunidas em uma lista de espécies. Nesta lista, há 543 espécies de aves confirmadas e 73 espécies que necessitavam de algum tipo de registro documental (Whittaker *et al.*, 2002). As espécies confirmadas para a REAJ fizeram dela uma das localidades de maior riqueza avifaunística da Amazônia brasileira (Pacheco & Parrini 2002, Brown & Freitas, 2002).



Figura 15 – Andrew Whittaker, à direita de Edson Guilherme, conversando com os moradores da Reserva Extrativista do Alto Juruá sobre o conhecimento deles a respeito das aves que ocorrem na região (novembro de 1994).

Além da REAJ, uma outra Unidade de Conservação do Juruá foi inventariada praticamente na mesma época. Trata-se do Parque Nacional da Serra do Divisor – PNSD, que recebeu a visita, em 1996 e 1997, dos ornitólogos D. C. Oren e Bret M. Whitney. O objetivo da ida destes ornitólogos ao PNSD foi o de realizar uma avaliação ecológica rápida – AER da sua avifauna. Esta AER foi parte integrante do Plano de Manejo do PNSD, coordenado pela organização não governamental S.O.S Amazônia, com auspícios da *The Nature Conservancy* (Scarcello, 1999). Foram realizadas duas expedições, uma na época seca, de 2 a 30 de junho de 1996, na parte norte do Parque, e outra na época chuvosa, de 14 a 30 de março de 1997, na região sul do PNSD. Registrou-se, entre observações e capturas, mais de 400 espécies durante estas expedições (Whitney *et al.*, 1997 n. p.). Ao final dos trabalhos, mais de 300 espécimes haviam sido coletados. Todos estes espécimes foram depositados no MPEG. Contudo, o resultado mais importante desta expedição foi a descoberta de uma espécie nova para a ciência. Trata-se de um tamnofílideo do gênero *Thamnophilus* que foi observado e gravado pela primeira vez na Serra da Jaquirana, porção norte do Parque. Esta espécie acabou sendo batizada de *Thamnophilus divisorius*, em homenagem ao local do encontro (Serra do Divisor), e seu nome em português ficou assinalado como “choca-do-Acre”, em alusão ao Estado do Brasil onde foi descoberta (Whitney *et al.*, 2004).

Terminada a década de 1990, o PNSD só volta a ser visitado em 2004, desta vez pelos ornitólogos do Museu Goeldi, Alexandre Aleixo e Fabíola Poletto. Nesta época, duas expedições foram realizadas como parte do projeto de pesquisa intitulado: “Caracterização ecológica, biogeográfica e conservação da avifauna do Parque Nacional da Serra do Divisor”, coordenado pela SOS Amazônia com recursos das ONGs TNC/Fundação Moore (A. Aleixo *in litt.*). As campanhas de campo ocorreram em duas etapas: de 19 a 30 de maio de 2004 e de 30 de outubro a 14 de novembro do mesmo ano (Aleixo & Poletto, 2004 n. p.). Durante as duas campanhas, poucos espécimes foram coletados. Porém, registrou-se mais de 300 espécies de aves, sendo que, destas,

nove eram registros novos para o Parque (Aleixo & Poletto 2004 n. p.).

Um ano antes, em 2003, A. Aleixo e F. Poletto haviam concluído um levantamento avifaunístico em um enclave de campinarana localizado na fronteira do Acre com o Amazonas. Este levantamento foi financiado pelo Governo Federal dentro do *Programa Áreas Protegidas da Amazônia – ARPA*. A campinarana inventariada localizava-se no polígono JU-008, entre os municípios de Mâncio Lima (no estado do Acre) e Guajará (no estado do Amazonas) (Aleixo, 2003 n. p.). Os principais resultados desta expedição foram divulgados por Poletto & Aleixo (2005).

Enquanto o extremo-oeste do Estado recebia a visita de diversos ornitólogos (na década de 1990), a região central do Acre permaneceu totalmente desconhecida. Quanto ao leste do Estado, esparsos levantamentos voltaram a acontecer somente a partir de 1998.

Em março de 1998, o ornitólogo Paulo Martuscelli é convidado pelo IBAMA e pelo CTA (Centro dos Trabalhadores da Amazônia) para coordenar um inventário de fauna na Floresta Nacional do Rio Macauã, Município de Sena Madureira. Segundo P. Martuscelli (*in litt.*) este inventário teria como principal objetivo avaliar a possibilidade de se implantar uma exploração madeireira na Flona. Durante o inventário, ocorrido em março do mesmo ano, P. Martuscelli coletou dentro da Flona cerca de 220 espécimes de aves. Posteriormente, estes espécimes foram doados ao Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. Ao dar entrada no MZUSP, o seu curador, Luis Fábio Silveira, percebeu que tinha em mãos uma coleção de extrema importância, pois a maioria dos espécimes coletados por P. Martuscelli era de aves associadas às florestas com bambus do sudoeste amazônico. Em nosso país, a representatividade destas espécies nas coleções ornitológicas ainda é muito baixa. O estudo da série coletada na Flona Macauã revelou a presença de dois novos registros para o Brasil, a saber: o pica-pau-anão-de-barras-sutis (*Picum subtile*) (Rego *et al.*, 2009) e o ferreirinho-de-cara-branca (*Poecilatriccus albifacies*) (Zimmer *et al.*, 2010).

O meu começo na Ornitologia (1992 – 2001)

O início do meu trabalho com aves no Acre começa em 1992, quando ainda era aluno do curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas. Nesta época, era estagiário no Laboratório de Pesquisas Paleontológicas – LPP da Universidade Federal do Acre. Em um dado momento, fui incentivado pelos pesquisadores do Laboratório a escolher um grupo zoológico, dentre os quais ainda não havia um pesquisador do LPP engajado para começar um trabalho pioneiro. Desta feita, entre a Ictiologia, a Herpetologia e a Ornitologia, optei pela última. A minha primeira missão foi a de dissecar aves para formar uma coleção óssea neornitológica no laboratório. No início foi difícil, principalmente pela falta de um orientador que conhecesse o grupo das Aves, porém, a cada esqueleto limpo, fui aprendendo um pouco mais.

A formação desta pequena coleção óssea no LPP me deu a oportunidade de participar, pela primeira vez, de um Congresso Brasileiro de Ornitologia – CBO. Tratava-se do III CBO, que foi realizado em Pelotas-RS no ano de 1993. Na oportunidade, apresentei, em coautoria com o paleontólogo e orientador Jean C. Y. Bocquentin, o meu primeiro resumo (Silva & Bocquentin, 1993). Durante este evento, tive a oportunidade de conhecer ornitólogos renomados como Willian Belton, Fernando Pacheco, Jacques Vielliard, entre outros. Na época, fiz amizade com alguns estudantes de biologia, os quais, mais tarde, viriam a se tornar importantes e respeitados ornitólogos brasileiros, entre eles, Alexandre Aleixo (Museu Goeldi) e Sérgio Henrique Borges (Universidade Federal do Amazonas - UFAM, Manaus).

No ano seguinte, em 1994, o pesquisador David C. Oren (Museu Paraense Emílio Goeldi) faz uma visita ao LPP na companhia do paleontólogo Alceu Ranzi. Ao ser apresentado por Ranzi a Oren, tive a oportunidade de mostrar a minha pequena coleção óssea de aves reunida no laboratório até aquele momento. Ao ver o material que tinha em mãos e, ao se ver questionado por um turbilhão de dúvidas quanto às identificações, Oren decidiu convidar-me a participar de uma

grande expedição ornitológica ao Alto Juruá que ocorrera nos últimos dois meses daquele ano. Esta viagem, já comentada acima, foi um divisor de águas em minha carreira. Foi nesta expedição que aprendi a trabalhar com redes de captura e também aprendi as técnicas de preparação de espécimes em campo. A partir de então, decidi, em definitivo, que me dedicaria também às aves atuais.

Em 1995, fui aprovado na prova do curso de mestrado em Ecologia do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. O curso começou no ano seguinte e, lá, tive a oportunidade de trabalhar com anilhamento de aves em uma área de corte seletivo de madeira sob a orientação do ecólogo Renato Cintra (Guilherme & Cintra, 2001).

De volta ao Acre, em 1998, fui aprovado em um concurso para professor substituto da Ufac, tendo sido efetivado, através de outro concurso, quatro anos depois (2002). Desde a minha primeira nomeação, comecei a anilhar aves no Parque Zoobotânico da universidade dentro do projeto “Anilhamento de aves em fragmentos urbanos e rurais no Município de Rio Branco, Acre, Brasil” aprovado pelo CEMAVE/IBAMA. Os resultados obtidos com a realização deste projeto foram divulgados no VIII Congresso Brasileiro de Ornitologia, ocorrido em Florianópolis (Guilherme, 2000a; Tavares & Guilherme, 2000). Um ano depois, divulguei a lista da avifauna do Parque Zoobotânico e do Campus da Universidade Federal do Acre como resultado dos estudos realizados ali, desde que retornei ao Acre, em 1998, após o mestrado (Guilherme, 2001). O anilhamento de aves no Campus e Parque Zoobotânico da Ufac continua até os dias atuais. Pela regularidade da ação, a partir de 2010, a Universidade Federal do Acre tem funcionado como uma Estação de Anilhamento de Aves.

A experiência adquirida na graduação com a dissecação de aves atuais no LPP me permitiu não só localizar, mas também reidentificar os fósseis deste grupo que se encontravam “perdidos” dentro da coleção de paleovertebrados do Laboratório de Paleontologia. Devido à grande semelhança morfológica, alguns dos fósseis de aves haviam sido identificados como sendo de répteis. Por esse motivo, foram armazenados nas prateleiras junto a centenas de fragmentos fósseis pertencentes, na sua maioria, ao grupo dos jacarés. Assim, após uma ampla revisão de toda a coleção do LPP, e tendo em mãos importantes fragmentos fósseis de aves, contatei o renomado estudioso das aves fósseis sul-americanas, Herculano Alvarenga, para, em parceria, estudarmos o material. Em nosso estudo, descobrimos que aqueles fósseis descobertos no laboratório pertenciam a duas novas espécies de aves (fósseis) para a ciência. Estas espécies foram então batizadas como *Anbinga minuta* (a menor das anhingas) e *Macranbinga ranzii* (em homenagem a Alceu Ranzi, pioneiro nos estudos dos fósseis do Acre) (Alvarenga & Guilherme, 2003).

Os anos 2002 – 2004

Nos meses de junho e agosto de 2002 e 2003, o Paleontólogo David Tab Rasmussen, da Washington University in St. Louis, esteve no Acre e ficou estabelecido dentro da Fazenda Experimental Catuaba – FEC. O objetivo principal de sua estada na fazenda era o de acompanhar sua esposa, a primatóloga Jennifer Alexis Rehg que, na época, coletava dados sobre o comportamento de alguns primatas da reserva para compor a sua tese de doutorado. Desta forma, D. T. Rasmussen aproveitou o tempo que esteve na FEC para fazer um levantamento preliminar das aves presentes nos limites da reserva. Após o seu retorno aos EUA, Rasmussen foi convidado por Patricia M. Drumond (pesquisadora da Embrapa/Acre) a contribuir com um livro, que ela estava organizando, sobre a fauna do Acre. A pesquisadora solicitou a ele que elaborasse um manuscrito sobre a avifauna observada na FEC. Assim, as observações de T. Rasmussen, aliadas às de J. A. Rehg e também algumas que realizei lá, em anos anteriores, foram reunidas e publicadas em um capítulo dentro do livro intitulado *Fauna do Acre*, lançado em 2005 pela Editora da Universidade Federal do Acre – Edufac (Rasmussen *et al.*, 2005).

As expedições realizadas dentro do Projeto Avifauna do estado do Acre

Em julho de 2005, começo o curso de Doutorado na Universidade Federal do Pará/Museu Paraense Emílio Goeldi em Belém. A partir de então, dou início ao desenvolvimento do projeto intitulado *Avifauna do estado do Acre: Composição, distribuição geográfica e conservação* (Guilherme, 2009).

Durante o desenvolvimento do projeto de tese, realizei cerca de 20 incursões de campo no Acre entre 2005 e 2007. Destaco, aqui, as quatro principais. Em cada uma delas, pude contar com a participação de experientes amigos ornitólogos que residem e trabalham com aves no Bioma Amazônia:

Expedição à Estação Ecológica Rio Acre

Em agosto de 2005 e fevereiro de 2006, duas expedições ornitológicas foram realizadas no sudeste do Acre na fronteira Brasil/Peru. Estas expedições tiveram como objetivo contribuir com a confecção do Plano de Manejo da Estação Ecológica Rio Acre (ESEC Rio ACRE), uma reserva de uso indireto sob a responsabilidade do ICMBIO. As expedições multidisciplinares foram capitaneadas pela Fundação SOS Amazônia e Alexandre Aleixo (Museu Goeldi) foi o pesquisador responsável pela equipe de Ornitologia. Da primeira expedição (agosto de 2005), participaram Alexandre Aleixo e o taxidermista Manoel Santa Brígida e, na segunda campanha (fevereiro de 2006), me integrei à equipe (Figura 16). Na oportunidade, foram registradas 365 espécies de aves, incluindo-se diversas espécies raras, espécies com distribuição geográfica restrita além de espécies pouco conhecidas em território brasileiro (Aleixo e Guilherme, 2010).



Figura 16 – Equipe que participou da expedição à Estação Ecológica Rio Acre em fevereiro de 2006. Da esquerda para direita: Edson Guilherme, Manoel Santa Brígida e Alexandre Aleixo.

Expedição ao Ramal Jarinal

Esta expedição contou com a participação do ornitólogo e professor da Universidade Federal do Pará, Marcos Pérsio Dantas Santos. A expedição foi realizada em uma região coberta por florestas dominadas por bambus nativos do gênero *Guadua*. Estas florestas são conhecidas regionalmente como “tabocais”. O levantamento ornitológico foi realizado no período de 11 a 23 de novembro de 2006. A área inventariada está localizada em uma vicinal da estrada Transacreana no Km 11 do Ramal Jarinal, região leste do estado do Acre. A expedição foi realizada com recursos disponibilizados

pela Conservação Internacional (CI – Belém) e teve o apoio logístico do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG). Participaram, também, o biólogo Liondon Jhonson como ajudante de campo, e o taxidermista do MPEG José Nilton Santa Brígida (Figura 17). Ao término de 12 dias de amostragem e após a realização de 916 horas/rede e oito horas de gravações, registrou-se 266 espécies de aves na região.

Registramos, nesta localidade, ao menos 20 espécies reconhecidamente associadas ou restritas às florestas dominadas por bambus no oeste amazônico (Guilherme & Santos, 2009). Cinco indivíduos de “choquinha”, coletados durante esta expedição, foram designados respectivamente holótipo e parátipos de uma nova espécie descrita para a ciência. Esta espécie foi batizada com o nome de *Myrmotherula oreni*, em homenagem a David Oren, do Museu Paraense Emílio Goldi, o responsável pela retomada das expedições ao Acre no início da década de 1990. Por ser encontrada quase que exclusivamente nos tabocais do leste do Acre e regiões circunvizinhas do Peru e Bolívia, esta espécie passou a ser chamada popularmente de “choquinha-do-bambu” (Miranda *et al.*, 2013).



Figura 17 – Equipe que participou da expedição aos tabocais do Ramal Jarinal, no leste do Acre, em novembro de 2006. Da esquerda para direita: Liondon Jhonson, José Nilton Santa Brígida, Edson Guilherme e Marcos Pêrsio Dantas Santos.

Expedição à campinarana no Alto Juruá

Nesta expedição, contei com a colaboração do ornitólogo Sérgio Henrique Borges, então membro da Fundação Vitória Amazônica com sede em Manaus, AM. No período de 22 a 31 de janeiro de 2007, inventariamos um enclave de campina/campinarana no Município de Porto Walter, na margem direita do Igarapé Cruzeiro do Vale. Esta pequena mancha de vegetação não florestal de aproximadamente 103 Km² pertence a um tipo vegetacional único que cresce sobre solo arenoso em meio à floresta ombrófila. Esta mancha de campinarana está situada dentro da Colônia Dois Portos, de propriedade de Damião Gonçalves. Esta expedição também contou com auspícios da Conservação Internacional (CI – Belém) e apoio logístico do Museu Paraense Emílio Goeldi. Dela participaram o taxidermista Manoel Santa Brígida de Belém e o mateiro e guia Lêncio Cerqueira de Menezes de Cruzeiro do Sul (Figura 18). Ao término de nove dias de amostragem, e após a realização de 1.425 horas/rede e oito horas de gravações, registramos 114 espécies de aves (Guilherme & Borges, 2011).



Figura 18 – Equipe que participou da expedição ao enclave de campinarana na margem esquerda do Igarapé Cruzeiro do Vale no Alto Rio Juruá, em janeiro de 2007. Da esquerda para direita: Edson Guilherme, Lêncio Cerqueira de Menezes, Manoel Santa Brígida e Sérgio Henrique Borges.

Expedição ao Alto Purus

A expedição ao Alto Purus contou com a participação do ornitólogo Sidnei de Melo Dantas. O levantamento ocorreu no período de 17 a 31 de agosto de 2007. Três localidades foram visitadas: (a) Localidade Santa Cruz Velha, margem direita do Purus, à montante da ponte sobre o Purus; (b) margem esquerda do Rio Chandless, a aproximadamente 3 km da sua foz; e (c) Seringal Terra-Nova, margem esquerda do Purus, logo à montante da Foz do Rio Chandless. Observações foram feitas também ao longo do rio, no trajeto entre a ponte e as localidades inventariadas. Esta expedição contou com auspícios da Conservação Internacional (CI – Belém) e apoio logístico do Museu Paraense Emílio Goeldi. O renomado taxidermista Manoel Santa Brígida também fez parte da expedição (Figura 19). A expedição estava programada para 20 dias, porém, no 14º, tivemos que



Figura 19 – Equipe que participou da expedição ao Alto Rio Purus e boca do Rio Chandless em agosto de 2007. Da esquerda para direita: Edson Guilherme, Sidnei de Melo Dantas e Manoel Santa Brígida.

abortar a expedição porque nosso taxidermista teve um problema de saúde quando estávamos na Localidade Santa Cruz Velha, no Alto Rio Purus. Mesmo depois de ter se aposentado no início da década de 1990, pelo Museu Goeldi, Manoel Santa Brígida continuou acompanhando cientistas por todo Brasil como *freelancer*. Contudo, após esta enfermidade, ele parou com as pesquisas de campo fora da região metropolitana de Belém. Após 40 anos de trabalho na Amazônia, como técnico do Museu Goeldi, esta pesquisa ao Alto Rio Purus foi a última grande expedição científica que Manoel Santa Brígida participou dentro da sua brilhante carreira. Foi uma honra para mim e para meu colega Sidnei Dantas ter, nesta expedição, a companhia do melhor e mais dedicado taxidermista da Amazônia brasileira. Aproveito para agradecer ao “Santa” (forma carinhosa como nos dirigimos a ele) por toda ajuda, zelo e dedicação que sempre teve comigo ao longo das várias expedições que fizemos em todo o estado do Acre no período de 2006 a 2007. Ao término de 14 dias de amostragem e, após a realização de 980 horas/rede e sete horas de gravações, registramos 321 espécies de aves na região do Alto Rio Purus (Guilherme & Dantas, 2011).

O período 2008 – 2010

No período de 13 a 29 de fevereiro e de 2 a 15 de agosto de 2008, o biólogo Dante Buzzetti percorreu diversos pontos do Parque Estadual Chandless, com o objetivo de fazer uma avaliação ecológica rápida (A.E.R) da avifauna local. Esta A.E.R é agora parte integrante do Plano de Manejo desta Unidade de Conservação elaborado por uma equipe multidisciplinar coordenada pela ONG – SOS Amazônia. Após as duas campanhas de campo, foram registradas 407 espécies dentro do Parque. Entre as espécies mais importantes, destacam-se: o tricolino-oliváceo (*Pseudocolopteryx acutipennis*), primeiro registro para o estado do Acre e o japim-da-selva (*Cacicus koepckeae*), primeiro registro em território brasileiro (Buzzetti, 2008). Infelizmente, o autor ainda não formalizou esta descoberta, através de uma nota científica, apresentando algum registro documental válido (e.g., foto, sons). Por esta razão, esta espécie ainda continua fora da lista primária das aves do Brasil (CBRO, 2014; Piacentini *et al.*, 2015).

Neste mesmo ano (2008), os biólogos Luiz Augusto Macedo Mestre e Gregory Thom fizeram um levantamento dentro da Reserva Extrativista Chico Mendes em Xapuri. O intuito dos pesquisadores foi o de investigar a comunidade de aves em áreas que pegaram fogo, no ano de 2005, e que estavam há três anos em processo de recuperação. A pesquisa fez parte de um amplo projeto intitulado *Biodiversity implications of forest disturbance and related landscape dynamics in the Brazilian Amazon*, desenvolvido através de um convênio entre várias instituições norte-americanas (*South Dakota State University, National Aeronautics and Space Administration, Lancaster University*) e o Museu Paraense Emílio Goeldi. Na área inventariada da reserva, foram registradas 344 espécies de aves, incluindo-se algumas pouco conhecidas como o flautim-rufo (*Cnipodectes superrufus*), que havia sido recém-descrita para ciência (Mestre *et al.*, 2010).

Nos anos de 2008 e 2009, uma equipe capitaneada pela bióloga Willandia Chaves desenvolveu, no Acre, o projeto intitulado “Conservação da vida selvagem ameaçada no sudoeste da Amazônia, Brasil – *Conservation of Threatened Wildlife in Southwestern Amazonia, Brazil*”. Este projeto foi financiado pelo Programa de Liderança em Conservação (<http://www.conservationleadershipprogramme.org>) e teve como principal foco as espécies de aves que são de interesse para conservação e que ocorrem em áreas protegidas do sudeste do Acre. O ornitólogo participante do projeto, então estudante de pós-graduação da Universidade da Flórida/EUA, John J. DeLuca, visitou diversas localidades dentro da Reserva Extrativista Chico Mendes, da Floresta Estadual do Antimary, do Projeto de Assentamento Pedro Peixoto e do Parque Zoobotânico da Universidade Federal do Acre, em busca de espécies de aves consideradas raras, endêmicas ou cinegéticas. Os principais resultados deste projeto foram a extensão da distribuição geográfica do flautim-rufo (*Cnipodectes superrufus*) e de algumas espécies pouco conhecidas no leste do Acre, tais como: o periquito-da-amazônia (*Nannopsittaca dachilleae*), o capitão-de-colar-amarelo (*Eubucco tucinkae*) e o pinto-do-mato-de-frente-ruiva (*Formicarius rufifrons*)

(Chaves *et al.*, 2010; DeLuca, 2012).

Em setembro de 2009, recebo a visita dos ornitólogos Kevin J. Zimmer e Andrew Whittaker (Figura 20) em Rio Branco. Vieram em uma viagem de exploração com auspícios de Barbara & Earl Doolin. Durante as duas semanas que estiveram no Acre, dois registros importantes foram feitos: a redescoberta do ferreirinho-de-cara-branca (*Poecilatriccus albifacies*) em território brasileiro e a descoberta de uma espécie nova para a ciência, a maria-sebinha-do-acre (*Hemitriccus cobnhafti*) (Zimmer *et al.*, 2010; Zimmer *et al.*, 2013).



Figura 20 – Os ornitólogos Kevin J. Zimmer e Andrew Whittaker durante visita ao Acre em setembro de 2009.

Os anos 2010 – 2015

A observação de aves (*birdwatchers*)

O início da década de 2010 é marcado pela descoberta do Acre como uma região importante para a atividade de observação de aves.

Embora a observação amadora de aves seja uma atividade muito antiga e bastante difundida no continente Europeu e em parte da América do Norte (EUA e Canadá), no Brasil esta atividade ficou por muito tempo restrita a pequenos grupos de pessoas que se juntavam e formavam um COA (Clube de Observadores de Aves) nas cidades onde residiam. O primeiro clube de observadores de aves do Brasil foi fundado em 1974 no Rio Grande do Sul. Desde então, diversos outros grupos se formaram pelo Brasil e alguns continuam atuantes até hoje, como é o caso do Clube de Observadores de Aves de Porto Alegre (<http://www.coapoa.org>).

Os COAs foram importantes para divulgar a atividade de observação de aves, mas ficavam restritos a grupos formados quase sempre por estudantes e ex-alunos das universidades. A grande reviravolta surgiu com a criação do site *WikiAves – A Enciclopédia das Aves do Brasil* em dezembro 2008 (www.wikiaves.com).

O Wikiaves é uma espécie de rede social que permite ao usuário postar fotos de aves tiradas na natureza. O usuário não precisa saber, *a priori*, qual o nome científico ou popular da ave fotografada. Ao postar uma foto sem identificação, os outros membros da rede, que inclui ornitólogos e observadores experientes, sugerem a identificação correta da espécie. Desta forma,

o autor pode saber, em um curto espaço de tempo, qual a espécie e o nome popular da ave que ele fotografou. O site ganhou a confiança dos usuários porque as regras de postagem são rígidas e os moderadores excluem imediatamente quem as infringem. Cada espécie fotografada amplia a lista pessoal do observador. Na expectativa de fotografar o maior número de espécies possíveis, alguns usuários não medem esforços para percorrer longas distâncias dentro do país em busca de aves que eles ainda não “clikaram”. Isto alavancou rapidamente a observação de aves no Brasil e o estado do Acre entrou na “mira” dos membros do Wikiaves.

A descoberta do Acre pelos *wikiaveanos*

O primeiro membro do Wikiaves a vir ao Acre com o intuito exclusivo de fotografar aves para postar no site foi Hugo Viana, engenheiro eletricista paraibano radicado em Brasília. Ele chegou em Rio Branco no dia 12 de maio de 2010 e permaneceu no Estado por uma semana. Na oportunidade, visitou as áreas verdes da capital e foi até Xapuri. Em outubro deste mesmo ano, passou por aqui o arquiteto aposentado do Ministério da Educação, Tancredo Maia Filho, acreano radicado em Brasília há muitos anos. Um pouco mais de um ano após a visita do primeiro *wikiaveano*, em 21 de agosto de 2011, chega ao Acre pela primeira vez um moderador do Wikiaves, Emerson Panis Kaseker (Figura 21). Kaseker permaneceu no Acre por 10 dias e visitou, além da Capital, os municípios de Bujari, Sena Madureira e Manoel Urbano. Ficou tão impressionado com a diversidade avisfaunística



Figura 21 – Emerson Panis Kaseker, moderador do Wikiaves, no Parque Zootobânico da Ufac.

do Estado que voltou em maio de 2013. Nesta oportunidade, veio com outro membro do site, o professor Luiz Rondini. Foram 413 fotos de aves do Acre postadas no site, o que lhe rendeu um convite para dar uma palestra na mais tradicional reunião de observadores de aves do Brasil, o IX AVISTAR (Encontro Brasileiro de Observação de Aves - www.avistarbrasil.com.br), que ocorreu em São Paulo no período de 16 a 18 de maio de 2014. Com o título “Acre: um destino inexplorado” (<http://pt.slideshare.net/emersonpaniskaseker/acre-um-destino-inexplorado>), Kaseker mostrou a um grande número de observadores de aves as dicas de como chegar, se hospedar e onde encontrar as aves raras ou endêmicas que, em território brasileiro, ocorre quase que exclusivamente no Acre.

Em 25 de janeiro de 2013, chega ao Acre, vindo de Taubaté – SP, o biólogo Tomaz Nascimento de Melo. O intuito, a princípio, foi de visitar o Estado, mas no decorrer de sua estada, aproveitou para concorrer a uma vaga ao curso de Mestrado em Ecologia e Manejo de Recursos Naturais, oferecido pela Universidade Federal do Acre. Em abril deste mesmo ano, Tomaz ingressou no Mestrado para desenvolver um projeto com aves sob minha orientação. Durante este período, iniciou também a atividade de guia de observação de aves, suprimindo uma lacuna existente no Estado em relação aos observadores de aves que demonstravam interesse em vir fotografar no Acre.

Apenas três anos após a divulgação da lista atualizada das aves do Acre, com 667 espécies (Guilherme, 2012), 42 novos registros foram acrescentados para os limites territoriais do Estado (Figura 23). Destes, 12 foram feitos por membros do site Wikiaves que não estavam fazendo levantamentos ornitológicos formais dentro do Acre. Entre os novos registros, podemos destacar: o gavião-de-asa-larga – *Buteo platypterus* (Caruta, J. N., 2014 [Wikiaves – WA1498997]), fotografado em Sena Madureira; o esmerilhão – *Falco columbarius* (Mendizabal, S. I., 2012 [Wikiaves – WA1060596]) em Xapuri; o alegrinho-do-chaco – *Inezia inornata* (Moss, M., 2013. [Wikiaves – WA1065636]), fotografado em Sena Madureira e a papa-lagarta-de-asa-vermelha – *Coccyzus americanus* (Melo-Sampaio, P. R., 2013. [Wikiaves – WA1149979]), fotografada no Município de Rio Branco. Estes são belos exemplos de contribuição social para a ciência.

Hoje, o Acre é um destino praticamente consolidado para a atividade de observação de Aves. A capital conta com bons hotéis, há locadora de carros, bons restaurantes e parques urbanos onde é possível encontrar aves raras. É preciso que órgãos do governo local, tais como a Secretaria de Estado de Turismo e Lazer, Secretarias (municipal e estadual) do Meio ambiente, gestores dos parques da cidade (Horto Florestal, Parque Chico Mendes, Parque Capitão Ciríaco) atentem para o potencial econômico gerado pela atividade ligada a observação de aves. Campanhas de divulgação da nossa avifauna através de guias (folder), com fotos e mapas, cartazes, propagandas na internet e TV; treinamento de novos guias; poderiam aumentar exponencialmente o fluxo de turistas no Acre nos próximos anos.

A criação do Ornitolab e as primeiras dissertações de mestrado

No dia 05 de julho de 2009, retomo minhas atividades no Campus da Universidade Federal do Acre (Ufac), após concluir o doutorado em Belém (2005 – 2009). A partir de então, o material ornitológico da Ufac, que antes ficava dentro do Laboratório de Paleontologia, ganha espaço próprio. Em 2010, passamos a ter o Ornitolab (Laboratório de Ornitologia da Ufac). Foi neste período que iniciei a orientação de bolsistas do Programa de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) para alunos dos cursos de graduação. Entre bolsistas e estagiários, quinze alunos já passaram pelo Ornitolab nos últimos cinco anos. Alguns iniciaram suas atividades desde o primeiro período da graduação, como é o caso de Rosiane Portela de Mesquita (já formada, atualmente faz mestrado), Jônatas Machado Lima e Rafael Ruan Araújo Pinto. A bióloga Edilaine Lemes Marques iniciou suas atividades no Ornitolab, dois anos antes de se formar e, logo em seguida, entrou no curso de mestrado para continuar seu trabalho com Aves. Hoje é mestre em Ecologia e Manejo de Recursos Naturais.

Em 22 de junho de 2011, solicitei ao colegiado do Curso de Pós-Graduação em Ecologia e Manejo de Recursos Naturais o meu credenciamento como membro do curso de mestrado. Após a reunião do colegiado, tive o nome aprovado e, desde então, faço parte do corpo docente como orientador. Surgiu, então, a oportunidade para que alunos pudessem se candidatar ao mestrado para realizar suas pesquisas com aves. No período de 2012 a 2015, cinco alunos entraram na Pós-Graduação em Ecologia para trabalhar com aves, sendo que três deles já finalizaram o curso com suas dissertações aprovadas. As dissertações já defendidas são:

- *Efeito das queimadas não recorrentes sobre a avifauna de sub-bosque em fragmentos florestais de terra-firme no leste do estado do Acre.* Elaborada pela bióloga Tatiana Lemos da Silva Machado.
- *O papel das matas ripárias na manutenção das aves de sub-bosque no leste do estado do Acre, Brasil.* Elaborada pela bióloga Edilaine Lemes Marques.
- *Estratégias de forrageio, preferência de habitat e coexistência de *Ramphotrigon fuscicauda* e *Ramphotrigon megacephalum* no leste do Acre.* Elaborado pelo biólogo Tomaz Nascimento de Melo.

Com a realização de pesquisas regulares em nível de Pós-Graduação, o Acre passa a fazer parte de um seleto grupo de estados amazônicos com ornitólogos residentes estudando as aves regularmente. A expectativa é que, nos próximos 20 ou 30 anos, a avifauna do Estado esteja entre as mais bem inventariadas, dentro do Bioma Amazônia, em território brasileiro.

Localidades ornitológicas

Cada vez que uma (ou mais) ave é registrada, seja através: da citação em um artigo científico; de um espécime depositado em museu; de uma foto ou canto publicado em mídia eletrônica, o ponto deste registro passa a se constituir em uma “localidade ornitológica”. Partindo deste princípio, reunimos todas as localidades ornitológicas do Acre, nos últimos 65 anos (1950 – 2015), para que fosse possível verificar a evolução das pesquisas com aves no Estado ao longo das décadas (Figura 22). Nos mapas a seguir é possível notar como o espaço físico do Acre foi sendo inventariado ao longo do tempo. Houve um aumento considerável dos inventários dentro do Acre principalmente a partir dos anos 2000. Dos rios acreanos, o Juruá, em seu alto curso, foi o mais pesquisado do ponto de vista ornitológico.

Nestes 65 anos, os ornitólogos exploraram principalmente o curso dos principais rios, das estradas e ramais e os arredores dos centros urbanos. A maioria dos interflúvios na região central do Estado sequer foi visitada. Quase toda a fronteira do Acre com o vizinho Peru também nunca foi pesquisada. Com certeza, isto ocorreu por causa da dificuldade de se chegar a estas regiões remotas. É certo que quando os primeiros ornitólogos nelas chegarem, muitas surpresas serão reveladas. É possível que nas cabeceiras dos rios Iaco, Macauã, Tarauacá, Muru, Purus, Liberdade, Gregório, entre outros, ocorram espécies típicas do sopé dos Andes e espécies migratórias que nunca foram registradas em território acreano e, quem sabe, até mesmo em território brasileiro. As regiões ainda não inventariadas são consideradas lacunas de conhecimento em nosso Estado e elas devem ser vistas como prioridades para novos levantamentos quando se pensar em realizar inventários ornitológicos no estado do Acre.




Figura 22 – Evolução das localidades ornitológicas no estado do Acre entre 1950 e 2015.



Aves do Acre em números

Riqueza de espécies

Para a confecção deste livro, trabalhei com 10.687 registros de aves feitos dentro dos limites territoriais do Acre no período de 1950 a 2015. Destes, 5.335 são de espécimes coletados e depositados em museus. Os demais são registros visuais, fotográficos ou de vocalização. Existem, hoje, no Acre, 708 espécies de aves confirmadas (Figura 23). Há, ainda, 22 espécies que necessitam de algum registro documental que atestem a sua ocorrência no Estado (Capítulo 4 - espécies grafadas em vermelho no Catálogo). Os registros confirmados e os não confirmados perfazem um total de 730 espécies de aves de potencial ocorrência nos limites territoriais do Acre (Capítulo 4). As espécies biológicas distribuem-se em 80 famílias e 27 ordens. As dez famílias com maior número de espécies são: (não-Passeriformes) Accipitridae (32), Trochilidae (28), Psittacidae (24), Picidae (18), e (Passeriformes) Tyrannidae (64), Thamnophilidae (63), Thraupidae (55), Furnariidae (25), Rhynchocyclidae (24) e Dendrocolaptidae (20), totalizando 49,8% das espécies do Estado. Os não-Passeriformes apresentam 324 espécies e os Passeriformes 384. Entre os Passeriformes, os Sub-oscines (Tyranni) possuem 256 espécies e os Oscines (Passeri) 128 espécies.

A maior parte das espécies de aves presentes no Acre possui registro confirmado através de espécime testemunho¹ (Guilherme, 2012). O Museu Paraense Emílio Goeldi abriga, atualmente, a grande maioria destes espécimes, ou seja, 75,9% (4.053), seguido do Laboratório de Ornitologia da Universidade Federal do Acre, com 12,3% (660) e do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, com 10,4% (558). Os demais espécimes, cerca de 1,4%, estão espalhados em diversos museus, quase todos fora do Brasil (Figura 24). Diante desta configuração, quem pretender estudar os espécimes de aves oriundos do Acre deverá fazer uma visita ao Museu Paraense Emílio Goeldi em Belém.

¹ Aves taxidermizadas ou conservadas em meio líquido (álcool, formol), depositadas em museus ou coleções científicas, disponíveis para estudos.




Figura 23 – Número cumulativo de espécies de aves registradas no estado do Acre entre 1950 e 2015.

A curva cumulativa de espécies, desde os primeiros levantamentos até o presente, parece demonstrar sinais de estabilização (Figura 23). Isto nos indica que estamos próximos de chegar a uma lista robusta e completa das aves que ocorrem dentro dos limites territoriais do estado do Acre.




Figura 24 – Instituições depositárias de espécimes de aves provenientes do estado do Acre. MPEG: Museu Paraense Emílio Goeldi (Belém/PA); UFAC: Laboratório de Ornitologia da Universidade Federal do Acre; MZUSP: Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo; CPJH: Coleção Particular do Prof. José Hidasi e Museu de Ornitologia de Goiânia; MNRJ: Museu Nacional do Rio de Janeiro.

Cerca de 90% das aves do Acre é residente¹. Deste percentual, seis são invasoras. As aves invasoras são aquelas que chegaram ao Acre após a retirada da cobertura florestal e a formação de ambientes abertos (*e.g.*, pastagens). Entre as espécies invasoras estão a garça-vaqueira (*Bubulcus ibis*), o gavião-de-rabo-branco (*Geranoaetus albicaudatus*), o caracará (*Caracara plancus*), o quero-quero (*Vanellus chilensis*), a coruja-buraqueira (*Athene cunicularia*) e o caminheiro-zumbidor (*Anthus lutescens*). Além das espécies invasoras, há também cinco espécies introduzidas. Houve dois tipos de introdução de aves no Acre: as espécies que foram trazidas e soltas, deliberadamente, aqui na região como o pombo-doméstico (*Columba livia*) e o pardal (*Passer domesticus*), e aquelas que conseguiram escapar de gaiolas e viveiros, constituindo populações silvestres viáveis, como o canário-da-terra-verdadeiro (*Sicalis flaveola*), o bicudo (*Sporophila maximiliani*) e o bico-de-lacre (*Estrilda astrild*). As aves introduzidas se adaptaram bem à região e atualmente se reproduzem na natureza sem cuidados antrópicos.

Aves migratórias

Pouco antes de iniciar o inverno rigoroso em regiões próximas aos polos norte e sul da Terra, algumas aves que se reproduzem nestas áreas iniciam uma jornada de milhares de quilômetros em busca das regiões mais quentes do planeta. Dentre as espécies que migram pelas Américas, muitas passam pela Amazônia. Enquanto umas passam todo o período do inverno setentrional ou austral aqui, outras apenas atravessam este bioma em busca de sítios mais favoráveis. O Acre está na rota destas espécies. Cerca de 78 espécies migratórias já foram registradas no Estado, das quais, 31 (39,7%) são migrantes neárticas, vindas do Hemisfério Norte (norte do México, Estados Unidos da América, Canadá), 14 (17,9%) são migrantes intratropicais (que fazem deslocamentos regionais dentro da região Neotropical) e 30 (38,4%) são migrantes austrais, vindas do sul do continente sul americano (Argentina, Chile, Uruguai e centro sul do Brasil) (Tabela 3). O flamingo-da-puna (*Phoenicoparrus jamesi*), o gavião-de-sobre-branco (*Parabuteo leucorrhous*) e o bico-reto-azul (*Helimaster furcifer*) foram as únicas espécies registradas no Acre classificadas como migrante acidental ou vagante.

Espécies migratórias que passam pelo Acre

Ao longo de todo o ano, estão passando pelo Estado aves vindas de diversos locais das Américas. Ao aportarem aqui, estão em busca de alimento e descanso, por um breve período, para, em seguida, seguirem viagem, seja com destino ao local onde passarão o verão, ou voltando aos locais onde nasceram, para, enfim, gerar novos filhotes e dar continuidade ao ciclo de vida da espécie.

O sabiá-de-óculos (*Catharus swainsoni*), o piui-boreal (*Contopus cooperi*) e o suiriri-valente (*Tyrannus tyrannus*) se reproduzem no norte dos Estados Unidos e no Canadá e migram para as florestas da América do Sul durante o inverno setentrional. São as migrantes neárticas. Já a guaracava-grande (*Elaenia spectabilis*), a guaracava-de-bico-curto (*Elaenia parvirostris*), o príncipe (*Pyrocephalus rubinus*), o sabiá-poca (*Turdus amaurochalinus*) e a andorinha-do-sul (*Progne elegans*) se reproduzem no sul da América do Sul e migram para a região norte deste continente durante o inverno austral. Por isto elas são chamadas de migrantes austrais. Tanto as migrantes neárticas, quanto as austrais, passam pela Amazônia e o Acre faz parte dos seus sítios de invernada (Tabela 3). Há, também, um grupo de espécies que faz deslocamentos regionais e, por isso, as classifico como migrantes intratropicais. Entre elas, está o tuiuí (*Jabiru mycteria*), o cabeça-seca (*Mycteria americana*) e o colhereiro (*Platalea ajaja*). Estas aves se reproduzem no Pantanal e em outras regiões de charco e depois se deslocam para o norte (*e.g.*, Bacia do Orinoco). No meio do caminho, elas param para se alimentar e descansar.

¹ Aves que vivem e se reproduzem em uma determinada região (não migratórias).

No Acre, é possível observar, em determinadas ocasiões, colônias de indivíduos jovens destas espécies à beira dos açudes, rios e meandros abandonados (conhecidos regionalmente como lagos). Também é possível ver bandos inteiros voando alto, nos céus do Estado, rumo ao norte, agrupados em formações no formato de “V”. Outro caso de migração regional é o do tiê-preto-e-branco (*Conothraupis speculigera*) que se reproduz, no final da estação chuvosa, na região transandina, no noroeste do Peru e oeste do Equador, e migra para as terras baixas da Amazônia no início da estação seca. O tiê-preto-e-branco já foi registrado nas florestas do Alto Juruá e na região do riozinho da Liberdade no oeste do Acre (Guilherme, 2007). Moradores ribeirinhos e das fazendas da nossa região relatam, costumeiramente, a presença de bandos contendo centenas de gaviões cruzando o céu, às vezes em direção ao sul e outras vezes em direção ao norte. O gavião-papa-gafanhoto (*Buteo swainsoni*) é uma das espécies de Accipitriformes¹ que migra do Hemisfério Norte para a América do Sul e, não é incomum, observá-los viajando em bandos com centenas de indivíduos.

Pelos rios, lagos e açudes do Acre também passam as aves migratórias limícolas². Estas aves são mais comumente vistas nas regiões litorâneas, se alimentando nas praias à beira do mar. São conhecidas popularmente como maçaricos, narcejas, batuíras e pernilongos. Passam por aqui tanto migratórias neárticas, como: o maçarico-de-colete (*Calidris melanotos*), o maçarico-pintado (*Actitis macularius*), o maçarico-solitário (*Tringa solitaria*) e o maçarico-de-perna-amarela (*Tringa flavipes*), quanto austrais, como a narceja (*Gallinago paraguaiiae*) (Tabela 3). Estas espécies costumam viajar longas distâncias. Quando são vistas no Acre, normalmente estão de passagem se alimentando ou descansando.

Os rios Purus e Juruá, com suas praias arenosas na época seca, são os mais importantes sítios de internada para a maioria das aves migratórias limícolas (neárticas e austrais) dentro do estado do Acre (Guilherme & Dantas, 2011a).

Tabela 3 – Espécies migratórias registradas no estado do Acre

Espécie	Nome em português	Migrante
<i>Anas discors</i>	marreca-de-asa-azul	neártica
<i>Parabuteo leucorrhous</i>	gavião-de-sobre-branco	vagante
<i>Phoenicoparrus jamesi</i>	flamingo-da-puna	vagante
<i>Jabiru mycteria</i>	tuiuiú	intratropical
<i>Mycteria americana</i>	cabeça-seca	intratropical
<i>Platalea ajaja</i>	colhereiro	intratropical
<i>Pandion haliaetus</i>	águia-pescadora	neártica
<i>Elanoides forficatus</i>	gavião-tesoura	intratropical
<i>Buteo platypterus</i>	gavião-de-asa-larga	neártica
<i>Buteo swainsoni</i>	gavião-papa-gafanhoto	neártica
<i>Phuialis dominica</i>	batuiraçu	neártica
<i>Himantopus mexicanus</i>	pernilongo-de-costas-negras	intratropical
<i>Gallinago paraguaiiae</i>	narceja	austral
<i>Actitis macularius</i>	maçarico-pintado	neártica
<i>Tringa solitaria</i>	maçarico-solitário	neártica
<i>Tringa melanoleuca</i>	maçarico-grande-de-perna-amarela	neártica
<i>Tringa flavipes</i>	maçarico-de-perna-amarela	neártica
<i>Calidris minutilla</i>	maçariquinho	neártica
<i>Calidris fuscicollis</i>	maçarico-de-sobre-branco	neártica
<i>Calidris bairdii</i>	maçarico-de-bico-fino	neártica
<i>Calidris melanotos</i>	maçarico-de-colete	neártica
<i>Calidris himantopus</i>	maçarico-pernilongo	neártica
<i>Calidris subruficollis</i>	maçarico-acanelado	neártica
<i>Phalaropus tricolor</i>	pisa-n'água	neártica
<i>Leucophaeus atricilla</i>	gaivota-alegre	neártica
<i>Columbina picui</i>	rolinha-picui	intratropical
<i>Micrococyx cinereus</i>	papa-lagarta-cinzento	austral
<i>Coccyzus americanus</i>	papa-lagarta-de-asa-vermelha	neártica
<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>	papa-lagarta-de-bico-preto	neártica
<i>Hydropsalis parvula</i>	bacurau-chintã	austral
<i>Hydropsalis torquata</i>	bacurau-tesoura	austral
<i>Chordeiles nacunda</i>	corucão	austral
<i>Chaetura meridionalis</i>	andorinhão-do-temporal	austral
<i>Chrysolampis mosquitus</i>	beija-flor-vermelho	intratropical
<i>Heliomaster furcifer</i>	bico-reto-azul	vagante
<i>Inezia inornata</i>	alegrinho-do-chaco	austral
<i>Elaenia spectabilis</i>	guaracava-grande	austral
<i>Elaenia chilensis</i>	guaracava-de-crista-branca	austral
<i>Elaenia parvirostris</i>	guaracava-de-bico-curto	austral
<i>Myiopagis viridicata</i>	guaracava-de-crista-alaranjada	austral
<i>Pseudocolopteryx acutipennis</i>	tricolino-oliváceo	austral

1 – Ordem que agrupa as águias e gaviões.

2 – Aves associadas a ambientes aquáticos.

Espécie	Nome em português	Migrante
<i>Myiarchus swainsoni</i>	irré	austral
<i>Myiarchus tyrannulus</i>	maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado	austral
<i>Casiornis rufus</i>	maria-ferrugem	austral
<i>Myiodynastes luteiventris</i>	bem-te-vi-de-barriga-sulfúrea	intratropical
<i>Tyrannus albogularis</i>	suiriri-de-garganta-branca	austral
<i>Tyrannus savana</i>	tesourinha	austral
<i>Tyrannus tyrannus</i>	suiriri-valente	neártica
<i>Griseotyrannus aurantioatrocristatus</i>	peitica-de-chapéu-preto	austral
<i>Empidonomus varius</i>	peitica	austral
<i>Myiophobus fasciatus</i>	filipe	austral
<i>Sublegatus modestus</i>	guaracava-modesta	austral
<i>Pyrocephalus rubinus</i>	príncipe	austral
<i>Fluvicola albiventer</i>	lavadeira-de-cara-branca	austral
<i>Lathrotriccus euleri</i>	enferrujado	austral
<i>Empidonax alnorum</i>	papa-moscas-de-alder	neártica
<i>Contopus cooperi</i>	piui-boreal	neártica
<i>Contopus virens</i>	piui-verdadeiro	neártica
<i>Contopus cinereus</i>	papa-moscas-cinzento	austral
<i>Vireo chivi</i>	juruvicara	austral
<i>Vireo flavoviridis</i>	juruvicara-verde-amarelada	intratropical
<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	andorinha-pequena-de-casa	austral
<i>Progne subis</i>	andorinha-azul	neártica
<i>Progne elegans</i>	andorinha-do-sul	austral
<i>Riparia riparia</i>	andorinha-barranco	neártica
<i>Hirundo rustica</i>	andorinha-de-bando	neártica
<i>Catharus minimus</i>	sabiá-de-cara-cinza	neártica
<i>Catharus swainsoni</i>	sabiá-de-óculos	neártica
<i>Turdus amaurochalinus</i>	sabiá-poca	austral
<i>Geothlypis agilis</i>	mariquita-de-connecticut	neártica
<i>Conothraupis speculigera</i>	tiê-preto-e-branco	intratropical
<i>Sporophila bouvronides</i>	estrela-do-norte	intratropical
<i>Sporophila lineola</i>	bigodinho	austral
<i>Sporophila luctuosa</i>	papa-capim-preto-e-branco	intratropical
<i>Sporophila nigrifrons</i>	baiano	intratropical
<i>Sporophila caerulea</i>	coleurinho	intratropical
<i>Piranga rubra</i>	sanhaçu-vermelho	neártica
<i>Piranga olivacea</i>	sanhaçu-escarlata	neártica

Espécies endêmicas

Uma área de endemismo é aquela que concentra um grupo de espécies com padrão de distribuição geográfica restrito e coincidente. As espécies que só ocorrem dentro destas áreas são chamadas de endêmicas. Na Amazônia, existem várias regiões que funcionam como centros de endemismo. A maioria delas é delimitada pelos grandes rios, tais como o Madeira, o Tapajós e o Xingu, ao sul do Rio Solimões/ Amazonas, e o Japurá e Negro ao norte (Cracraft, 1985; Silva *et al.*, 2005b). Cada um destes centros possui um nome específico. São eles: o Inambari, o Rondônia, o Tapajós, o Xingu e o Belém, ao sul, e os centros Guiana, Imeri e Napo (Figura 25), além do recém-criado centro Jaú (Borges & Silva, 2012), ao norte da calha do Solimões Amazonas (Cracraft, 1985; Silva *et al.*, 2005b).

O estado do Acre está localizado dentro do centro de endemismo Inambari (Haffer, 1978; Cracraft, 1985; Silva *et al.*, 2005b; Figura 25). Este centro é delimitado pelos rios Guaporé/Madeira



Figura 25 – Centros de endemismo da Amazônia (Fonte: Conservação Internacional – Belém, PA).

a leste, Solimões ao norte e pelo Rio Ucayali e pela cordilheira andina a sudoeste (Silva *et al.*, 2005b; Figura 25). Ao menos 23 espécies de aves registradas no Acre (não incluindo as subespécies) são restritas ao centro Inambari (Tabela 4). Além destas, 12 espécies são endêmicas da região compreendida entre o sopé dos Andes e as terras baixas adjacentes da Amazônia equatorial, peruana, boliviana e brasileira (Tabela 4). No Brasil, estas 12 espécies são encontradas quase que exclusivamente no estado do Acre e no sul do estado do Amazonas. A distribuição geográfica da agulha-de-garganta-branca é um bom exemplo deste tipo de endemismo (Figura 26).

Espécies de aves que possuem uma pequena distribuição geográfica global são mais susceptíveis à extinção por perda de *habitat* quando comparadas com espécies de ampla distribuição. Mudanças ambientais drásticas no Bioma Amazônia, tais como o desmatamento, podem causar a extinção local ou total das aves endêmicas. Por isso, a presença destes endemismos (Figura 26; Tabela 4) em uma determinada área deve ser a norteadora na tomada de decisão, quando se pensa em criar novas unidades de conservação ou realizar ações que visem à conservação da natureza no

sudoeste amazônico e, em particular, no estado do Acre.




Figura 26 – Distribuição geográfica da agulha-de-garganta-branca (*Brachygalba albogularis*). Uma das espécies endêmicas da Amazônia sul-ocidental.

Tabela 4 – Aves endêmicas do sudoeste amazônico que ocorrem no estado do Acre

Espécie	Nome em português	Endemismo
<i>Crypturellus atrocapillus</i>	inhambu-de-coroa-preta	sopé dos Andes e terras baixas adjacentes
<i>Crypturellus bartletti</i>	inhambu-anhangá	Inambari
<i>Psophia leucoptera</i>	jacamim-de-costas-brancas	Inambari
<i>Amazilia lactea bartletti</i>	beija-flor-de-peito-azul	Inambari
<i>Brachygalba albogularis</i>	agulha-de-garganta-branca	Inambari
<i>Malacoptila semicincta</i>	barbudo-de-coleira	Inambari
<i>Nonnula sclateri</i>	freirinha-amarelada	Inambari
<i>Eubucco tucinkae</i>	capitão-de-colar-amarelo	sopé dos Andes e terras baixas adjacentes
<i>Picumnus subtilis</i>	pica-pau-anão-de-barras-sutis	sopé dos Andes e terras baixas adjacentes
<i>Celeus spectabilis</i>	pica-pau-lindo	sopé dos Andes e terras baixas adjacentes
<i>Primolius couloni</i>	maracanã-de-cabeça-azul	Inambari
<i>Pyrrhura rupicola</i>	tiriba-rupestre	Inambari
<i>Nannopsittaca dachilleae</i>	periquito-da-amazônia	Inambari
<i>Myrmotherula oreni</i>	choquinha-do-bambu	Inambari
<i>Myrmotherula heteroptera</i>	choquinha-do-purus	Inambari
<i>Thamnomanes schistogynus</i>	uirapuru-azul	Inambari
<i>Thamnophilus divisorius</i>	choca-do-acre	sopé dos Andes e terras baixas adjacentes
<i>Myrmoborus lophotes</i>	formigueiro-do-bambu	Inambari
<i>Akletus goeldii</i>	formigueiro-de-goeldi	Inambari
<i>Hypocnemis subflava</i>	cantador-galego	sopé dos Andes e terras baixas adjacentes
<i>Gymnopitrys salvini</i>	mãe-de-taoca-de-cauda-barrada	Inambari

Espécie	Nome em português	Endemismo
<i>Grallaria eludens</i>	tovacuçu-xodó	Inambari
<i>Formicarius rufifrons</i>	pinto-do-mato-de-fronte-ruiva	sopé dos Andes e terras baixas adjacentes
<i>Glybhorynchus spirurus albogularis</i>	arapaçu-bico-de-cunha	sopé dos Andes e terras baixas adjacentes
<i>Xiphorhynchus chunchotambo</i>	arapaçu-de-tschudi	sopé dos Andes e terras baixas adjacentes
<i>Clibanornis watkinsi</i>	barraqueiro-ferrugem-do-acre	Inambari
<i>Neopelma sulphureiventer</i>	fruxu-de-barriga-amarela	sopé dos Andes e terras baixas adjacentes
<i>Ceratopipra chloromeros</i>	dançador-de-cauda-graduada	sopé dos Andes e terras baixas adjacentes
<i>Conioptilon mcilbennyi</i>	anambé-de-cara-preta	Inambari
<i>Cnipodectes superrufus</i>	flautim-rufo	Inambari
<i>Mionectes amazonus</i>	abre-asa-do-acre	Inambari
<i>Poecilatriccus albifacies</i>	ferreirinho-de-cara-branca	sopé dos Andes e terras baixas adjacentes
<i>Hemitriccus cobnbafti</i>	maria-sebinha-do-acre	Inambari
<i>Hemitriccus aff. minor</i>	maria-sebinha	Inambari
<i>Lophotriccus eulophotes</i>	maria-topetuda	Inambari

Espécies ameaçadas

No Acre, em se tratando das aves nativas e residentes, apenas a azulona (*Tinamus tao*), o gavião-real (*Harpia harpyja*), o uiraçu-falso (*Morphnus guianensis*) e o jacu-estalo (*Neomorphus geoffroyi*), aparecem como vulneráveis na lista das aves brasileiras ameaçadas de extinção (DOU, 2014). No entanto, se levamos em consideração a lista vermelha de espécies ameaçadas, divulgada pela IUCN (International Union for Conservation of Nature), há, no Estado, 11 espécies enquadradas na categoria “quase ameaçada” (em inglês, Near Threatened). São elas: o inhambu-de-coroa-preta (*Crypturellus atrocapillus*) o gavião-real (*Harpia harpyja*), o uiraçu-falso (*Morphnus guianensis*), a tiriba-rupestre (*Pyrrhura rupicola*), o periquito-da-amazônia (*Nannopsittaca dachilleae*), o formigueiro-do-bambu (*Myrmoborus lophotes*), o pinto-do-mato-defrente-ruiva (*Formicarius rufifrons*), o puruchém (*Synallaxis cherriei*), o vira-folha-de-garganta-cinza (*Sclerurus albogularis*), o limpa-folha-de-bico-virado (*Syndactyla uayalae*) e o tiê-preto-e-branco (*Conothraupis speculigera*). Duas espécies estão enquadradas na categoria vulnerável: a maracanã-de-cabeça-azul (*Primolius couloni*) e o flautim-rufo (*Cnipodectes superrufus*). Já o mutum-de-fava (*Crax globulosa*) e o japiim-da-selva (*Cacicus koepckeae*), se confirmadas para o estado do Acre¹, estão enquadradas na categoria “ameaçada de extinção” (BirdLife International, 2015). A lista de aves ameaçadas de extinção divulgada pelo Ministério do Meio Ambiente refere-se apenas às espécies consideradas ameaçadas em território brasileiro, enquanto que a lista da IUCN trata da ameaça global das espécies. Como o Acre faz fronteira com outros dois países (Peru e Bolívia) e juntos compartilham a maioria das espécies de aves do sudoeste amazônico, é preciso ficar atento para as duas listagens. É que pode haver casos em

¹ Estas espécies carecem de registro documental (foto, vocalização, espécime testemunho) em território acreano.

situação pode ser diferente ou vice-versa. Um caso típico é o da maracanã-de-cabeça-azul (*Primolius couloni*), que no Peru as populações têm sofrido baixa porque, além da perda de *habitat*, também são capturadas para a venda ilegal como *Pet* (BirdLife International, 2016), enquanto que no Acre (o lado brasileiro onde a espécie ocorre) ainda não há relatos de que esta espécie esteja sofrendo este mesmo tipo de pressão de caça e comércio ilegal.

Ambientes de ocorrência

Quanto aos ambientes de ocorrência, a maioria das aves do Acre (82%) habitam as florestas ombrófilas abertas ou densas de terra-firme, sejam elas dominadas por palmeiras e/ou bambus. Com exceção de uma pequena parcela da avifauna que é restrita às florestas dominadas por bambus (Tabela 5), todas as demais espécies florestais registradas no Acre estão associadas às florestas ombrófilas com predominância de palmeiras ou cipós. Uma parcela menor da avifauna (15%) está associada a ambientes aquáticos, tais como: florestas de várzeas, margens de rios, igarapés, açudes, lagos e praias arenosas formadas pelos rios meândricos da região (Guilherme, 2009; 2012).

Aves associadas às florestas dominadas por bambus: os tabocais

As florestas ombrófilas com domínio de bambus do gênero *Guadua*, são muito abundantes no leste do Acre. Algumas aves são conhecidas por sua associação íntima com estas florestas. Na maioria dos casos, a área global de ocorrência da espécie coincide com a região de domínio do bambu (taboca). Na Tabela 5, estão as espécies que são especialistas em explorar os tabocais no estado do Acre.

Tabela 5 – Aves associadas às florestas dominadas por bambus no estado do Acre.

Espécie	Nome em português
<i>Dromococcyx pavoninus</i>	peixe-frito-pavonino
<i>Nonnula sclateri</i>	freirinha-amarelada
<i>Nonnula ruficapilla</i>	freirinha-de-coroa-castanha
<i>Picumnus rufiventris</i>	pica-pau-anão-vermelho
<i>Picumnus subtilis</i>	pica-pau-anão-de-barras-sutis
<i>Celeus spectabilis</i>	pica-pau-lindo
<i>Nannopsittaca dachilleae</i>	periquito-da-amazônia
<i>Microrhopias quixensis</i>	papa-formiga-de-bando
<i>Epinecrophylla ornata</i>	choquinha-ornada
<i>Myrmotherula oreni</i>	choquinha-do-bambu
<i>Cymbilaimus sanctaemariae</i>	choca-do-bambu
<i>Myrmoborus lophotes</i>	formigueiro-do-bambu
<i>Akletus goeldii</i>	formigueiro-de-goeldi

Espécie	Nome em português
<i>Cercomacra manu</i>	chororó-de-manu
<i>Drymophila devillei</i>	trovoada-listrada
<i>Hypocnemis subflava</i>	cantador-galego
<i>Campylorhamphus trochilirostris</i>	arapaçu-beija-flor
<i>Clibanornis watkinsi</i>	barranqueiro-ferrugem-do-acre
<i>Automolus melanopezus</i>	barranqueiro-escuro
<i>Anabazenops dorsalis</i>	barranqueiro-de-topete
<i>Syndactyla ucayalae</i>	limpa-folha-de-bico-virado
<i>Synallaxis cherriei</i>	puruchém
<i>Cnipodectes superrufus</i>	flautim-rufo
<i>Poecilatriccus albifacies</i>	ferreirinho-de-cara-branca
<i>Hemitriccus cohnhafti</i>	maria-sebinha-do-acre
<i>Hemitriccus flammulatus</i>	maria-de-peito-machetado
<i>Lophotriccus eulophotes</i>	maria-topetuda
<i>Ramphotricon megacephalum</i>	maria-cabeçuda
<i>Ramphotricon fuscicauda</i>	maria-de-cauda-escura
<i>Sporophila schistacea</i>	cigarrinha-do-norte

Espécies associadas às campinas e campinaranas

Há também as aves associadas a um tipo de vegetação *sui generis* que cresce sobre solos arenosos na Amazônia. No Acre, este tipo de ambiente forma ilhas de vegetação aberta no meio da floresta e os moradores locais as chamam de campinas, no caso de vegetação rasteira, e campinaranas quando são formadas por vegetação arbustiva de porte médio. As campinas e campinaranas estão localizadas no extremo-oeste do Estado. De todas as aves associadas a este tipo de ambiente, dentro do Acre, ao menos seis podem ser consideradas como restritas: o beija-flor-verde (*Polytmus theresiae*), o papa-formiga-pardo (*Formicivora grisea*), o flautim-da-amazônia (*Schiffornis amazonum*), o pretinho (*Xenopipo atronitens*), o enferrujadinho (*Neopipo cinnamomea*) e o tem-tem-de-dragona-vermelha (*Tachyphonus phoenicius*). Algumas espécies são mais abundantes nas campinaranas do que em outros ambientes do Estado. Por isso, estou considerando-as como parcialmente associadas a este tipo de ambiente. São elas: o inhambu-relógio (*Crypturellus strigulosus*), a pomba-trocal (*Patagioenas speciosa*), o coroa-de-fogo (*Heterocercus linteatus*), o tangará-riscado (*Machaeropterus striolatus*), a rendeira (*Manacus manacus*), a maria-mirim (*Hemitriccus minimus*), a maria-de-barriga-branca (*Hemitriccus griseipectus*), o guaracavuçu (*Cnemotriccus fuscatus duidae*), o bico-chato-de-rabo-vermelho (*Ramphotricon ruficauda*) e o tinguauçu-de-barriga-amarela (*Attila citriniventris*) (Guilherme & Borges, 2011; Guilherme, 2012).

Espécies de ambientes abertos e urbanos

Algumas espécies se adaptaram bem aos ambientes alterados pelo homem. Os ambientes

antrópicos mais comuns no Acre são as áreas desmatadas: as pastagens, os roçados bem como as cidades e vilarejos (*e.g.*, quintais, praças, parques...). Entre as aves urbanas mais comuns estão o urubu-de-cabeça-preta (*Coragyps atratus*), a rolinha-roxa (*Columbina talpacoti*), o periquito-de-cabeça-suja (*Aratinga weddellii*), o benedito-de-testa-vermelha (*Melanerpes cruentatus*), a choca-barrada (*Thamnophilus doliatus*), o bem-te-vi (*Pitangus sulphuratus*), a pipira-vermelha (*Ramphocelus carbo*) e o sanhaçu-da-amazônia (*Tangara episcopus*). Nas pastagens da zona rural, é possível observar com frequência a garça-vaqueira (*Bubulcus ibis*), o quero-quero (*Vanellus chilensis*), a polícia-inglesa-do-norte (*Sturnella militaris*) e o caboclinho-de-peito-castanho (*Sporophila castaneiventris*), entre outras.

Distribuição geográfica

Padrão de distribuição das espécies no estado do Acre

A configuração espacial do estado do Acre lembra as asas de uma borboleta; comprido longitudinalmente e constricto no centro (Figura 27). O Acre tem sua maior extensão no sentido leste/oeste e não norte e sul. Por isso, ao se referir à distribuição geográfica das espécies dentro do Estado é melhor utilizar o termo leste ou oeste em detrimento de norte ou sul do Estado. O parâmetro para dividir o Estado em duas sub-regiões deve ser a localização do Rio Purus. Isto porque o Rio Purus está no centro do Estado e o divide em duas grandes porções: (a) leste, a partir da sua margem direita e (b) oeste, a partir da sua margem esquerda (Figura 27).




Figura 27 – Regiões Zoogeográficas do estado do Acre tendo como grupo de referência as aves.

A maioria das espécies de aves florestais residentes no Acre (mais de 80%) possui ampla distribuição dentro dos limites do Estado (Capítulo 4). Ou seja, elas estão presentes em todo o Acre (de leste a oeste). Este padrão é um reflexo do relevo de baixa elevação (exceto no extremo-oeste) e da pouca variação fitofisionômica existente ao longo do espaço territorial do Estado. O território acreano, antes da ocupação humana, era originalmente coberto por floresta. Como o Estado não

possui extensas barreiras físicas (rios ou montanhas) capazes de limitar a dispersão da maioria dos táxons, quase não há substituição de espécies congêneres ou de mesma função ecológica no sentido leste/oeste. Este é um padrão de distribuição biogeográfica esperado na ausência de barreiras. Não obstante, algumas espécies só ocorrem em uma das duas grandes sub-regiões do Estado, ou só no leste ou só na região oeste (Tabela 6 e 7). O interessante é que este padrão de distribuição não parece ser um reflexo de uma possível barreira geográfica provocada pelas margens dos dois grandes rios que cortam o Acre: o Rio Purus e o Rio Juruá. Como se trata de rios de água branca e meândricos (Toivonem *et al.*, 2007), nem o Purus nem o Juruá devem funcionar bem como barreiras efetivas para a avifauna da região. Os rios meândricos são sinuosos e formam inúmeras ilhas fluviais ao longo do seu percurso. Estas ilhas podem funcionar como uma ponte para que muitas espécies alcancem a margem oposta. Inúmeras pesquisas com vertebrados feitas na região dos rios Purus e Juruá têm corroborado esta ideia (Ayres & Clutton-Brock, 1992; Silva *et al.*, 1995; Gascon *et al.*, 2000; Aleixo, 2004). Estudos genéticos realizados com primatas (Peres *et al.*, 1996), roedores (Patton *et al.*, 1994; Patton & Silva, 1998), aves (Aleixo, 2004) e anfíbios (Gascon *et al.*, 1998) mostraram que o Rio Juruá não funciona como barreira geográfica para estes grupos.

Outros fatores, que não os rios, estão agindo na delimitação da distribuição dos táxons no sudoeste da Amazônia. É possível que a extensão das florestas de várzea seja um fator relevante que limite a distribuição de algumas espécies de aves de terra-firme. Certas espécies associadas às florestas de terra-firme podem não conseguir explorar a floresta de várzea e acabam evitando transpor tais ambientes. Daí o fato de só estarem presentes em uma das margens do Purus ou Juruá. A competição interespecífica, aliada às condições edáficas e fitoecológicas do sudoeste amazônico (Tuomisto *et al.*, 1995; Daly & Silveira, 2002; Roig & Martini, 2002; Silveira *et al.*, 2002; Tuomisto *et al.*, 2003) também são fatores que podem estar influenciando na manutenção do padrão de distribuição observado no estado do Acre. Uma análise das espécies com distribuição geográfica restrita a uma única sub-região do Estado (Tabela 7, Figura 28) revela que o padrão de distribuição encontrado no Acre também se repete do lado peruano. Espécies que só ocorrem no oeste do Acre (Tabela 6) como a mãe-de-taoca-avermelhada (*Phlegopsis erythroptera*), o uirapuru-selado (*Thamnomanes saturninus*), o tinguáçu-de-barriga-amarela (*Attila citriniventris*), o rabo-de-arame (*Pipra filicauda*) e a cabeça-branca (*Dicxiphia pipra*), só foram registradas no nordeste peruano (Schulenberg *et al.*, 2007). Da mesma forma, o ferreirinho-de-cara-branca (*Poecilatriccus albifacies*), o flautim-rufo (*Cnipodectes superrufus* – Figura 28) e a choquinha-do-bambu (*Myrmotherula oreni*) que são restritas às florestas do leste do Acre (Tabela 7), só ocorrem no sudeste da Amazônia peruana (Schulenberg *et al.*, 2007, Figura 28).



Figura 28 – Distribuição geográfica do flautim-rufo (*Cnipodectes superrufus*), espécie recém-descrita para a ciência e com distribuição geográfica conhecida apenas para o leste do Acre e regiões adjacentes do Peru e Bolívia. É possível que ocorra também no sul do Amazonas.

Chama atenção o fato de que este padrão de distribuição da avifauna também foi verificado em relação à distribuição de algumas espécies de uma família de plantas. Trata-se da família *Arecaceae* (palmeiras). Algumas espécies de palmeiras só são encontradas na sub-região oeste do Acre. Como exemplos deste padrão estão a paxiubinha-de-macaco (*Wettinia augusta*), a catolé (*Syagrus smithii*), a paxiubinha-lisa (*Socratea salazarii*), outra espécie de paxiubinha-de-macaco (*Iriartella stenocarpa*), a ubimrana (*Hyospathe elegans*), a pachiubarana (*Dictyocaryum ptarianum*), a marajá (*Bactris riparia*) e a murmuru (*Astrocaryum faranae*), entre outras (Lorenzi *et al.*, 2004). Já outras palmeiras, tais como: a tucumã (*Astrocaryum aculeatum*); a murumuru (*Astrocaryum murumuru*) e a marajá (*Bactris elegans*) estão restritas ao leste do Estado (Lorenzi *et al.*, 2004). Praticamente todas as espécies de palmeiras mencionadas acima ocorrem além dos limites do estado do Acre (Lorenzi *et al.*, 2004). Porém, no Acre, acabaram segregadas em uma das duas sub-regiões assim como no caso de algumas espécies de aves (Tabela 6 e 7). Certas palmeiras são claramente indicadoras de ambientes, como por exemplo os platôs, áreas alagadas, campinas e campinaranas. Desta forma, o padrão de distribuição das palmeiras no Acre é uma clara evidência da diferença fitoecológica das duas porções do Estado. Isso reforça a ideia de que fatores edáficos e climáticos possuem um papel importante na distribuição dos organismos nos limites do estado do Acre.

Para a maioria das espécies com distribuição geográfica restrita a uma das duas sub-regiões, o território do Acre e as adjacentes terras baixas peruanas representam o limite final de suas distribuições. Espécies como o uirapuru-selado (*Thamnomanes saturninus*), o rabo-de-aramé (*Pipra filicauda*) e a cabeça-branca (*Dixiphia pipra*), possuem ampla distribuição no norte da Amazônia. Já o limite final de suas distribuições é o extremo sudoeste deste bioma (Ridgely & Tudor, 2009). Entretanto, há exceções. A choca-do-acre (*Thamnophilus divisorius*), por exemplo, é de fato uma espécie restrita às florestas do extremo-oeste do Acre e nordeste do Peru. Esta espécie tem sua



Figura 29 – Árvores emergentes e caducifólias em floresta do leste do Acre.

distribuição associada a uma região de média altitude, ou seja, às florestas submontanas da Serra do Divisor. Em relação às espécies restritas à sub-região leste do Acre, algumas estão associadas às florestas dominadas por bambus (tabocais). Entre elas estão o pica-pau-anão-de-barras-sutis (*Picumnus subtilis*), o flautim-rufo (*Cnipodectes superrufus*), o ferreirinho-de-cara-branca (*Poecilatriccus albifacies*) e a choquinha-do-bambu (*Myrmotherula oreni*). No leste do Acre, há uma concentração maior de florestas com bambus em relação ao oeste do Estado (Figura 4). Esta grande concentração

de bambus pode estar relacionada ao fato de que, no leste do Acre, há um tipo de floresta estacional (semidecídua) onde algumas espécies arbóreas emergentes perdem as folhas na estação seca, tal qual as árvores caducifólias típicas de florestas secas do Brasil central (Ferreira, 2013, 2015). A perda das folhas pelas árvores emergentes, em uma estação do ano, favoreceria o crescimento rápido do bambu no sub-bosque. O bambu estaria se beneficiando da maior entrada de luz no interior da floresta. Esta é uma observação nova que contrapõe a ideia de que todo o Acre é coberto por floresta ombrófila (perenifólia) (Ferreira, 2013, 2015, Figura 29). Em contrapartida, no extremo-oeste do Acre parece haver um consenso de que a região é, de fato, coberta por uma floresta ombrófila (perenifólia) e que sofre influência da flora andina (Silveira *et al.*, 2008; Ferreira, 2015).

Este padrão de distribuição no Acre pode ser um reflexo da história sedimentar da Bacia do Acre durante os últimos 65 milhões de anos. Apesar da Formação Solimões cobrir quase todo o Acre, no oeste do Estado existem formações cenozoicas mais antigas, como é o caso da Formação Ramon, e até afloramentos do final da Era Mesozoica (Cretáceo - Maastrichtiano), de mais de 65 milhões de anos, pertencentes às formações Moa, Divisor e Rio Azul (Latrubesse *et al.*, 1994). Afloramentos pertencentes a formações mais antigas aparecem no oeste do Estado devido às intensas atividades tectônicas relacionadas com o soerguimento da cordilheira Andina (Latrubesse & Ranzi, 2000; Latrubesse *et al.*, 2010). Sobre estes afloramentos mais antigos, foi desenvolvida a rede de drenagem do extremo sudoeste Amazônico, responsável pela formação, *a posteriori*, dos terraços quaternários que são encontrados hoje no oeste do Acre (Latrubesse & Ranzi, 1998, 2000, Latrubesse, 2000, Milani & Thomaz Filho, 2000). Em contraste, no leste do Estado há apenas as formações cenozoicas mais recentes como, por exemplo, a *Fm.* Solimões (Mioceno-Superior¹) e os depósitos quaternários formados pela rede de drenagem atual (Latrubesse *et al.*, 2010, Latrubesse, 2000). Os afloramentos de formações geológicas de diferentes idades no oeste do Estado se refletem em condições edáficas peculiares, diferentes daquelas encontradas no leste do Acre. Estas características ajudam a explicar as diferenças fitofisionômicas e zoogeográficas atuais encontradas nos dois extremos do Acre.

Na região centro-oeste do Acre, a topografia, as diferenças no solo e a alta pluviosidade desempenham um papel importante na formação de diferentes ambientes ecológicos. Estas características, em conjunto, explicam o maior número de espécies de palmeiras e aves (e provavelmente de outros grupos biológicos) restritas a esta porção do Estado quando comparadas com aquelas encontradas somente na porção leste (Lorenzi *et al.*, 2004, Guilherme, 2012, Tabelas 6 e 7). Por tudo isso, parece não haver dúvidas de que são os gradientes ambientais (fitofisionômicos) que exercem um papel decisivo na definição dos limites de distribuição das espécies no Acre, ao contrário de uma barreira física propriamente dita, como por exemplo, os rios Purus e Juruá.

¹ A idade geológica denominada Mioceno abrange o intervalo de tempo entre 24 e 5 milhões de anos antes do presente.

Tabela 6 – Aves registradas apenas na porção oeste do estado do Acre¹

Espécie	Nome em português	Sub-Região biogeográfica
<i>Crypturellus undulatus yapura</i>	macucau	centro e extremo-oeste
<i>Amazilia fimbriata</i>	beija-flor-de-garganta-verde	centro e extremo-oeste
<i>Nonnula rubecula</i>	macuru	extremo-oeste
<i>Capito auratus orosae</i>	capitão-de-fronte-dourada	centro e extremo-oeste
<i>Capito aurovirens</i>	capitão-de-coroa	centro e extremo-oeste
<i>Touit purpuratus</i>	apuim-de-costas-azuis	extremo-oeste
<i>Epinecrophylla haematonota</i>	choquinha-de-garganta-carijó	centro e extremo-oeste
<i>Myrmotherula ignota</i>	choquinha-de-bico-curto	extremo-oeste
<i>Myrmotherula heteroptera</i>	choquinha-do-purus	centro e extremo-oeste
<i>Formicivora grisea</i>	papa-formiga-pardo	extremo-oeste
<i>Thamnomanes saturninus</i>	uirapuru-selado	centro e extremo-oeste
<i>Thamnophilus divisorius</i>	choca-do-acre	extremo-oeste
<i>Akeltus melanoceps</i>	formigueiro-grande	extremo-oeste
<i>Hypocnemis hypoxantha</i>	cantador-amarelo	centro e extremo-oeste
<i>Phegopsis erythroptera</i>	mãe-de-taoca-avermelhada	centro e extremo-oeste
<i>Conopophaga aurita</i>	chupa-dente-de-cinta	centro e extremo-oeste
<i>Dendrocincla fuliginosa neglecta</i>	arapaçu-pardo	extremo-oeste
<i>Pipra filicauda</i>	rabo-de-aramé	extremo-oeste
<i>Lepidothrix coronata coronata</i>	uirapuru-de-chapéu-azul	centro e extremo-oeste
<i>Dixiphia pipra</i>	cabeça-branca	centro e extremo-oeste
<i>Xenopipo atronitens</i>	pretinho	centro e extremo-oeste
<i>Myiobius barbatus</i>	assanhadinho	centro e extremo-oeste
<i>Lophotriccus vitiensis</i>	maria-fiteira	centro e extremo-oeste
<i>Attila cinnamomeus</i>	tinguaçu-ferrugem	centro e extremo-oeste
<i>Attila citriniventris</i>	tinguaçu-de-barriga-amarela	centro e extremo-oeste
<i>Hylophilus semicinereus</i>	verdinho-da-várzea	extremo-oeste
<i>Psarocolius viridis</i>	japu-verde	centro e extremo-oeste
<i>Cacicus latirostris</i>	japu-de-rabo-verde	centro e extremo-oeste
<i>Tachyphonus phoenicius</i>	tem-tem-de-dragona-vermelha	extremo-oeste
<i>Sporophila murallae</i>	papa-capim-de-caquetá	centro e extremo-oeste

1 O conteúdo desta tabela reflete o conhecimento atual. Não descartamos a possibilidade de que no futuro algumas destas espécies sejam registradas na porção leste do Estado.

Tabela 7 – Aves registradas apenas na porção leste do estado do Acre¹

Espécie	Nome em português
<i>Crypturellus undulatus undulatus</i>	macucau
<i>Anrostomus sericeicaudatus</i>	bacurau-rabo-de-seda
<i>Capito auratus insperatus</i>	capitão-de-fronte-dourada
<i>Picumnus subtilis</i>	pica-pau-anão-de-barras-sutis
<i>Epinecrophylla amazonica</i>	choquinha-do-madeira
<i>Myrmotherula oreni</i>	choquinha-do-bambu
<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i>	chorozinho-de-asa-vermelha
<i>Thamnophilus aethiops injunctus</i>	choca-lisa
<i>Hypocnemis subflava</i>	cantador-galego
<i>Glyphorhynchus spirurus albigularis</i>	arapaçu-bico-de-cunha
<i>Xiphorhynchus chunchotambo</i>	arapaçu-de-tschudi
<i>Lepidothrix coronata exquisita</i>	uirapuru-de-chapéu
<i>Cnipodectes superrufus</i>	flautim-rufo
<i>Poecilatriccus albifacies</i>	ferreirinho-de-cara-branca ²
<i>Hemitriccus cobnasti</i>	maria-sebinha-do-acre
<i>Hemitriccus aff. minor</i>	maria-sebinha
<i>Cacicus koepckeae</i>	japim-da-selva

1 O conteúdo desta tabela reflete o conhecimento atual. Não descartamos a possibilidade de que no futuro algumas destas espécies sejam registradas na porção oeste do Estado.

2 O suposto registro desta espécie feito na Reserva Extrativista do Alto Juruá, no oeste do Estado, não está confirmado (Ver Capítulo 4 página 636).



Aves do Acre

Por que reunir a lista de todas as espécies que ocorrem no estado do Acre?

O Brasil possui atualmente 1.901 espécies de aves (CBRO, 2014). É um país megadiverso que figura junto com a Colômbia e o Peru entre os três mais ricos em espécies de aves do mundo. Apesar de tamanha riqueza avifaunística e da história ornitológica brasileira remontar ao século XVI, a primeira listagem de aves do Brasil só apareceu no final do século XIX (Goeldi, 1894, 1900). Em meados do século XX, o ornitólogo paulista Olivério Mário de Oliveira Pinto realizou uma minuciosa catalogação das aves brasileiras (Pinto, 1938; 1944; 1978). Já no final do século passado, o ornitólogo alemão radicado no Brasil, Dr. Helmut Sick, apresenta, em um livro síntese, informações históricas, ecológicas, comportamentais e biogeográficas de todas as espécies conhecidas, à época, em território brasileiro (Sick 1985, 1997). Hoje, temos o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO) que atualiza regularmente o número de espécies de aves que ocorre no Brasil.

As listas de aves estaduais se constituem em uma importante ferramenta para estudos comparativos sobre a riqueza, distribuição e grau de conservação das espécies em diferentes espaços e territórios subnacionais submetidos a distintos níveis de pressão antrópica (Carlos *et al.*, 2010). Estas listas e seus produtos podem se tornar a base para a definição de políticas públicas concretas, que visem à proteção dos recursos naturais na escala de Estado. No Brasil, esforços de síntese sobre avifaunas estaduais já foram feitos para o Acre (Guilherme, 2009, 2012); Amapá (Novaes, 1974); Bahia (Machado & Borges, 2013); Ceará (Silva & Albano 2002); Espírito Santo (Ruschi, 1967; Simon 2009); Goiás (Hidasi, 1983); Maranhão (Oren, 1991); Minas Gerais (Mattos *et al.*, 1993); Paraná (Scherer-Neto & Straube, 1995; Scherer-Neto *et al.*, 2011); Pernambuco (Farias *et al.*, 2008); Paraíba (Schulz-Neto, 1995); Santa Catarina (Naka & Rodrigues, 2000); São Paulo (Silveira *et al.*, 2010); Rio de Janeiro (Gagliardi, 2011); Rio Grande do Norte (IDEMA, 1999); Rio Grande do Sul (Belton, 1994; Bencke 2001) e Roraima (Santos, 2005; Naka *et al.*, 2006). Mais detalhes sobre os critérios que devem ser observados para a composição das listas de aves dos estados brasileiros podem ser encontrados em Carlos *et al.* (2010).

Neste capítulo, é apresentado um catálogo contendo todas as aves registradas nos limites territoriais do estado do Acre entre 1950 e dezembro de 2015. Este catálogo contém informações detalhadas sobre os 10.687 registros de aves compilados para o Estado, distribuídos por espécie,

local do registro, ambiente de ocorrência, *status* e a sua distribuição espacial dentro do território acreano. Estes dados poderão ser utilizados por professores, estudantes de nível fundamental e médio, além de estudantes universitários, para pesquisa e confecção de trabalhos escolares; por cientistas interessados em estudar as aves da Amazônia ocidental; por gestores ligados ao meio ambiente, para a confecção de relatórios, documentos temáticos, entre outros, e pela comunidade em geral. Principalmente pelos observadores amadores de aves, que poderão saber onde as espécies que eles pretendem observar e fotografar são encontradas dentro do estado do Acre.

Critérios para composição do catálogo

Para cada ave catalogada, são apresentados: a Ordem da Classe Aves (na lateral da página); a Família; o nome científico da espécie, seguido do autor; o nome popular (de acordo com CBRO, 2014) e, em alguns casos, o nome regional (de acordo com o autor) e o nome em inglês.

Os nomes populares, a nomenclatura científica e o nome em inglês aparecem nesta ordem e estão de acordo com o CBRO (2014).

Registros

Para cada espécie registrada no Estado são apresentadas as seguintes informações:

a) Localidades – indica o nome do local onde a espécie foi vista. Neste caso, as localidades serão apresentadas em sequência cronológica, da mais antiga visitada (ou publicada) para a mais recente. Entretanto, essa regra não será aplicada em casos de espécies que apresentam duas ou mais subespécies e cujas distribuições geográficas sejam claramente separadas. Nestas situações, julgou-se mais didático que as respectivas localidades fossem agrupadas por subespécies.

b) Autoria do registro – o(s) autor(es) de cada registro aparecem entre parênteses. Nos casos de registros publicados, é citada a referência acompanhada do ano da publicação. Já nos casos de registros não publicados (*e.g.*, relatórios técnicos), serão apresentados os nomes abreviados dos autores seguidos das iniciais n. p. e o ano em que o relatório foi produzido. A citação completa dos relatórios não publicados encontra-se logo abaixo das Referências Bibliográficas (Capítulo 5).

c) Espécimes testemunho - quando o registro é seguido de um espécime coletado, é citado o nome abreviado dos coletores (ou autores da publicação), seguido da sigla da instituição depositária e o número de tombo dos espécimes.

d) Ao lado dos registros, é apresentado um mapa com a distribuição espacial das localidades citadas.

e) Para 722 dos 730 registros (incluindo os confirmados e não confirmados) é apresentada a foto do espécime com a indicação do sexo (quando há dimorfismo), idade no caso de foto de indivíduo jovem e autor do registro fotográfico.

f) Táxons com citação na literatura científica, mas que ainda não possuem registro documental (espécime coletado, foto ou vocalização), aparecem grafados em vermelho.

Habitat

Todas as espécies foram associadas aos seus principais *habitats* de ocorrência dentro do Estado. Há dois grandes grupos de *habitats* no Acre: os florestais (com Florestas Ombrófilas Densas, Florestas Ombrófilas Abertas e as campinaranas) e os abertos (margem de rios, áreas desmatadas, ambientes urbanos, entre outros). Visando uma padronização, os dois grupos ficaram assim divididos:

Ambientes florestais: Floresta Ombrófila Aberta das terras baixas com palmeiras (FOA com palmeiras);

Floresta Ombrófila Aberta das terras baixas com bambus (FOA com bambus);
Floresta Ombrófila Aberta das terras baixas com palmeiras e bambus (FOA com palmeiras/bambus);
Floresta Ombrófila Aberta/Densa aluvial (várzea) (FOA/FOD aluvial);
Floresta Ombrófila Densa das terras baixas (FOD);
Floresta Ombrófila Densa submontana (FOD submontana);
Campinas e campinaranas; ambientes abertos: área aberta com cultivares (roçados e plantações);
Área aberta com pastagens (fazendas, chácaras e sítios);
Ambientes urbanos (cidades e vilarejos);
Praias fluviais arenosas e margens de rios, lagos e açudes.

A classificação de cada espécie dentro das categorias acima foi baseada nas informações contidas nas etiquetas dos espécimes coletados, na literatura específica sobre as aves do Acre e nas minhas observações feitas em campo.

Distribuição

Apresenta-se, aqui, a distribuição global conhecida de cada espécie. Para tanto, utilizou-se obras de referência sobre a avifauna (Hoyo *et al.*, 1992-2013; Ridgely & Tudor 1994, 2009; Isler & Isler, 1999). Em alguns casos, indica-se também, nesta seção, se a espécie é endêmica, ou restrita a algum tipo específico de *habitat* (*e.g.*, campinas, florestas com bambus, etc.).

Taxonomia

Nesta seção, é apresentado o número total de subespécies descritas para o referido táxon e a(s) forma(s) que eventualmente podem estar presentes no estado do Acre. Isto foi feito com base na distribuição geográfica das subespécies indicadas na literatura (*e.g.*, Hoyo *et al.*, 1992-2013). Neste caso, recomenda-se, aos que pretendem estudar a avifauna do Acre em relação à taxonomia, uma análise acurada dos espécimes testemunhos (depositados nas coleções científicas) para checar se eles apresentam os caracteres diagnósticos, descritos na literatura, para cada subespécie referida como de potencial ocorrência no Estado.

Status das espécies

As aves registradas no Acre foram classificadas como residentes ou migrantes. Foram consideradas como residentes aquelas espécies que se reproduzem dentro dos limites territoriais do estado do Acre. Dentre as residentes, foram identificados três grupos: o das nativas (originárias da Amazônia), das invasoras (originárias de outros biomas sul-americanos) e as introduzidas (trazidas e soltas deliberadamente pelo homem). Como invasoras, foram consideradas todas aquelas espécies que historicamente não ocorriam na região e que só chegaram após a modificação do meio ambiente pela ação do homem (*e.g.*, desmatamento, formação de pastagem, etc.).

As aves consideradas aqui como migratórias são aquelas cujos sítios de reprodução localizam-se, reconhecidamente, fora do Bioma Amazônia. Segundo a definição de Hayes (1995), reconhecemos três grupos de aves migratórias no Acre: as migrantes neárticas, as migrantes intratropicais e as migrantes austrais. As aves migrantes neárticas são aquelas que se reproduzem na América do Norte (*e.g.*, EUA e Canadá) e migram para a América do Sul durante o inverno boreal. Já as migrantes intratropicais são aquelas espécies que se reproduzem nos trópicos (no nosso caso a América do Sul) e regularmente fazem deslocamentos regionais dentro do mesmo continente (Jahn *et al.*, 2006; Hayes, 1995). Neste caso, estou considerando como migrante intratropical as

espécies que chegam ao Acre através de deslocamentos de longa e média distância dentro da região Neotropical, entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. A migração regional é uma variação da migração intratropical para deslocamentos de média e curta distância. Classifiquei como migrante regional as espécies que migram dentro do próprio Bioma Amazônia ou que fazem deslocamentos de média e curta distância a partir de biomas próximos (*e.g.*, Cerrado, Pantanal, Chaco). Quanto às migrantes austrais, estou considerando aquelas espécies que se reproduzem no sul da América do Sul e se deslocam para o norte do continente durante o inverno austral (Sick, 1984; Stotz *et al.*, 1996; Chesser, 1997; Schulenberg *et al.*, 2007). A classificação das espécies nas categorias acima foi feita com base em observações pessoais realizadas em campo e também em obras referenciais sobre a avifauna da América do Sul, tais como: Ridgely & Tudor (1994, 2009); Stotz *et al.* (1996); Sick (1997); Chesser (1997); Restall *et al.* (2006); Perlo (2009); Schulenberg *et al.* (2007).

No caso de registros não confirmados não são apresentados nem o *status* nem a taxonomia da espécie.

Comentários

Nesta seção, são apresentados os detalhes sobre a natureza dos registros (no caso de registros não confirmados), bem como os diferentes nomes com que o táxon foi citado em publicações anteriores. Apresenta-se também, sucintas informações de espécies muito comuns, ou de táxons, que merecem ser investigados com mais detalhes no futuro.

Critérios para citação de registros publicados no site www.wikiaves.com.br

O site Wikiaves foi utilizado como fonte de pesquisa para este livro, tendo como base as aves registradas no estado do Acre, de acordo com os seguintes critérios:

- a) quando a vocalização ou imagem da ave representou o primeiro registro da espécie dentro dos limites territoriais do estado do Acre;
- b) quando a vocalização ou imagem da ave representou importante extensão de distribuição geográfica da espécie dentro dos limites territoriais do estado do Acre;
- c) quando a vocalização ou imagem da ave representou importante registro da espécie para os fragmentos florestais pertencentes à Universidade Federal do Acre, a saber: o complexo *Campus* e Parque Zoobotânico, a Fazenda Experimental Catuaba e a Reserva Humaitá. E ainda, para os fragmentos públicos urbanos da cidade de Rio Branco: Horto Florestal; Parque Capitão Ciriaco e Parque Chico Mendes.

A escolha da mídia para a citação foi baseada no autor que primeiro postou a foto ou som no site. A referência completa da mídia oriunda do site Wikiaves está diretamente na seção REGISTROS, com o sobrenome e as iniciais do autor, ano da publicação no site e código de referência da mídia com as iniciais do site WA e o respectivo número de identificação. Por este motivo, elas não constam das Referências Bibliográficas.

Abreviações utilizadas

Quanto aos registros:

As localidades de coletas foram assim abreviadas:

PNSD – Parque Nacional da Serra do Divisor

REAJ – Reserva Extrativista do Alto Juruá

ESEC Rio Acre – Estação Ecológica Rio Acre

PZ – Parque Zoobotânico da Universidade Federal do Acre

Quanto ao número de tomo dos espécimes testemunho:

AC – Laboratório de Ornitologia/Universidade Federal do Acre

AMNH – American Museum of Natural History

CPJH – Coleção Particular do Sr. José Hidasí/Museu de Ornitologia de Goiânia

FMNH – Florida Museum of Natural History

LSUMZ – Louisiana State University Museum of Natural Science

MNRJ – Museu Nacional/Universidade Federal do Rio de Janeiro

MPEG – Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém

MZUSP – Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo

ZUEC – Coleção Ornitológica do Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Campinas, São Paulo

Quanto às citações bibliográficas:

n. p. - Não publicado

Catálogo das aves




marianinha-de-cabeça-amarela – *Pionites leucogaster* (Kuhl, 1820)

Celso B. Almeida

azulona – *Tinamus tao* Temminck, 1815
Gray Tinamou



Robson Czaban



Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Município de Santa Rosa do Purus, Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Ocorre em quase toda a Amazônia, das Guianas até a Bolívia. No Brasil, ocorre no norte (Amazônia legal) e no centro-oeste, nos estados de Mato Grosso e Goiás (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1992; Sick, 1997).

Taxonomia

São reconhecidas quatro subespécies. A forma que ocorre no Acre, tendo como base a distribuição geográfica, é, possivelmente, a *T. t. kleei* (Hoyo *et al.*, 1992).

Status

Residente.

inhambu-de-cabeça-vermelha – *Tinamus major* (Gmelin, 1789)
Great Tinamou



Tomaz Melo



Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, 1958, MPEG 13992); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Rio Paratari, margem sul, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 58819); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63461); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63671); Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Jurupari, localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD.

Distribuição Geográfica

Espécie de ampla distribuição, desde o México até a Bolívia. Ocorre em toda a Amazônia brasileira (Hoyo *et al.*, 1992; Sick, 1997).

Taxonomia

São reconhecidas 12 subespécies. A forma que ocorre no estado do Acre é a *Tinamus m. peruvianus* (Novaes, 1957; Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1992).


Status

Residente.

inhambu-galinha – *Tinamus guttatus* Pelzeln, 1863
White-throated Tinamou



Whaldener Endo



Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, 1958, MPEG 13993); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Baixo Rio Paratari, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004, MPEG 58355); Ramal Nabor Júnior, Km 26 (Guilherme, E., MPEG 60421); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 61972); Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Jurupari, Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Mâncio Lima, campinarana no Alto Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Ocorre nas terras baixas da Amazônia (Hoyo *et al.*, 1992; Sick, 1997).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1992).


Status

Residente.

inhambu-preto – *Crypturellus cinereus* (Gmelin, 1789)
Cinereous Tinamou



Mathias Singer



Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, 1958, MPEG 13995, 13996); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52704); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 76350); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004, MPEG 58357); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada Transacreana (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61213); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Jurupari, Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Jurupari, Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, localidades Távora, Pará, Manaus e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); ARIE Japiim/ Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com bambus/palmeiras, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Ocorre em toda a Amazônia (Hoyo *et al.*, 1992; Sick, 1997).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1992).

Status

Residente.



Léila Esteves



Sílvia Faustino Linhares

**Registros**

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MZUSP 42178); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 63854); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Jurupari, Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, localidades Távora, Pará, Manaus e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Município de Mâncio Lima, campinarana no Alto Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com palmeiras, FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD.

Distribuição Geográfica

Espécie de ampla distribuição, desde o México até a Bolívia. Ocorre desde a Amazônia brasileira até o Espírito Santo e o Rio de Janeiro (Pinto, 1978; Sick, 1997).

Taxonomia

São reconhecidas 14 subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *C. s. inconspicuus* (Guilherme, 2009; Hoyo *et al.*, 1992).

Status

Residente.

Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2008; 2010); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010).

Habitat

FOA com palmeiras, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Ocorre no sudeste do Brasil, do sul da Bahia até o Rio Grande do Sul. Possui populações isoladas na Amazônia (Rondônia, Mato Grosso e Pará) e também no sopé dos Andes (Bolívia, Peru, Equador) (Hoyo *et al.*, 1992; Sick 1997).

Taxonomia

São reconhecidas nove subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *C. o. ochraceiventris* (Aleixo & Guilherme, 2008; Hoyo *et al.*, 1992).

Status

Residente.

jaó • macucau – *Crypturellus undulatus* (Temminck, 1815)
Undulated Tinamou



Rodrigo D'Alessandro



inhambu-relógio – *Crypturellus strigulosus* (Temminck, 1815)
Brazilian Tinamou



Whaldener Endo



Registros

C. u. yapura - Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004, MPEG 58356); Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 61973); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

C. u. undulatus – Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 76351); Parque Zoobotânico e *Campus* da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; MPEG 60422); Alto Rio Acre, margem esquerda, Localidade Cachoeira do Bandeira (Guilherme, E. AC 035); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 59764); Igarapé Cruzeiro do Vale, Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63460); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Jurupari, Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

Ocorre no norte da América do Sul (Amazônia), em direção ao sul do continente (Bolívia, Brasil, Paraguai e Argentina) (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1992; Sick, 1997).

Taxonomia

São reconhecidas seis subespécies (Hoyo *et al.*, 1992). Duas formas ocorrem no estado do Acre: *C. u. yapura*, registrada na Bacia do Rio Juruá – região centro-oeste e *C. u. undulatus*, registrada na Bacia do Rio Purus, região centro-leste (Guilherme, 2009; 2012).

Status

Residente.

Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

Ocorre na margem sul do Solimões/Amazonas, do sopé dos Andes no Peru ao norte da Bolívia e do Brasil. Ocorre, também, nas faixas litorâneas do nordeste brasileiro (Hoyo *et al.*, 1992; Sick, 1997).

Taxonomia

Espécie monotípica. A raça *C. s. tambopatae* foi recentemente descrita. No entanto, a validade científica deste táxon tem sido questionada (Hoyo *et al.*, 1992).

Status


Residente.

inhambu-de-coroa-preta – *Crypturellus atrocapillus* (Tschudi, 1844)


Black-capped Tinamou



Luiz Borges

**inhambu-anhangá** – *Crypturellus variegatus* (Gmelin, 1789)

Variagated Tinamou



João Quental

**Registros**

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker & Oren, 1999, Whittaker *et al.*, 2002); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2008; 2010); BR-364, Seringal Sardinha (Guilherme, E, obs. pess.); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Aleixo & Guilherme, 2010); Estrada Transacreaana (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2008a; 2011); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão (Dantas, n. p. - 2010); Rio Jurupari, Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010).

Habitat

FOA com bambus/palmeiras, FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Restrita ao extremo-oeste amazônico (Peru, Bolívia e Brasil). No Brasil, esta espécie só foi registrada no estado do Acre (Sick, 1997; Whittaker & Oren, 1999).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies (*C. a. atrocapillus* e *C. a. garleppi*). Não se sabe ainda qual delas ocorre no Acre porque, até o momento, nenhum espécime de *C. atrocapillus* foi coletado para estudo taxonômico em território brasileiro.

Status

Residente.

Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 28225); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52537); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Rio Jurupari, Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, localidades Távora, Pará, Manaus e Veneza (Dantas, n. p. - 2010).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, campinarana.

Distribuição Geográfica

Em toda a Amazônia. Ocorre, também, no Brasil oriental, sul da Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e leste de Minas Gerais (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1992; Sick, 1997).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1992)

Status


Residente.

inhambu-carijó – *Crypturellus cf. brevirostris* (Pelzeln, 1863)

Rusty Tinamou



Vincent Rufay

**Registros**

Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Oren, D. C. e equipe, MPEG 52538); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus.

Distribuição Geográfica

Centro-oeste amazônico. Ocorre, também, no estado do Amapá e na Guiana Francesa (Hoyo *et al.*, 1992; Sick, 1997).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1992).

Status

Residente.

Comentários

É possível que o espécime coletado no Acre (MPEG 52538) seja um táxon novo para a ciência (Guilherme, 2009).

inhambu-anhangai – *Crypturellus bartletti* (Sclater & Salvin, 1873)

Bartlett's Tinamou



Edson Guilherme

Jovem

**Registros**

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, 1958; MZUSP 42176, 42177); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker & Oren, 1999, Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 48028); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2008, 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2008a, 2011, MPEG 63243, 63244); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2008a; 2011, MPEG 63242); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63672); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Jurupari, Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, localidades Távora, Pará, Manaus e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Parque Zoológico da Ufac (Guilherme, E. e equipe, anilhado).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Restrita à Amazônia sul-ocidental (Hoyo *et al.*, 1992). Espécie pertencente ao centro de endemismo Inambari (Haffer, 1978; Crafft, 1985).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1992).

Status

Residente.

Nome anterior

Crypturellus brevirostris bartletti (Novaes, 1957; Pinto, 1978; Sick, 1997).

Comentários

Segundo Stotz *et al.* (1996), esta é uma espécie típica das florestas inundadas periodicamente (FOAs aluviais).

inhambu-chintã – *Crypturellus tataupa* (Temminck, 1815)

Tataupa Tinamou



Silvia Faustino Linhares




anhuma • alencó – *Anhima cornuta* (Linnaeus, 1766)

Horned Screamer



Henrique Moreira



Registros

Município de Assis Brasil, Estrada da Pedreira, Localidade Museu (Aleixo, A. & Whittaker, A., *in litt*; ver lista secundária em Guilherme (2012); Município de Sena Madureira, Resex Cazumbá-Iracema (Carvalho, G. com. pess.).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, área aberta com pastagens e roçados.

Distribuição Geográfica

Ocorre na região centro-sul da América do Sul (Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Brasil e Argentina). No Brasil, é muito comum nas regiões Sudeste e Nordeste (Hoyo *et al.*, 1992).

Taxonomia

São reconhecidas quatro subespécies. De acordo com a distribuição geográfica, duas formas podem estar presentes no Acre: *C. t. peruvianus* e *C. t. tataupa* (Hoyo *et al.*, 1992).

Status

Residente.

Comentários

Esta espécie pode estar ampliando sua distribuição geográfica, colonizando áreas abertas criadas pelo desmatamento.

Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002, Suplemento); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2007; 2011); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008).

Habitat

Praias fluviais arenosas, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

América do Sul, da Colômbia ao norte da Argentina (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1992; Sick, 1997).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1992).


Status

Residente.


Anatidae Sub-Família Dendrocygninae
irerê – *Dendrocygna viduata* (Linnaeus, 1766)
White-faced Whistling-Duck



Edson Guilherme



Anatidae Sub-Família Dendrocygninae
asa-branca – *Dendrocygna autumnalis* (Linnaeus, 1758)
Black-bellied Whistling-Duck




Edson Guilherme



Registros
Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002, Suplemento); Município de Rio Branco, zona urbana (Guilherme, E., AC 0158); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 61515); Estrada Transacreaana (AC-090) Km 60, margem esquerda (Guilherme, E., MPEG 61516); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., obs. pess.); Rio Branco, <i>Campus</i> da Ufac (Guilherme, E. e equipe, anilhado); arredores da cidade de Xapuri (Guilherme, E., obs. pess.).
Habitat
Rios, açudes, lagos e poças de água de chuva.
Distribuição Geográfica
América Central e América do Sul, da Costa Rica ao Uruguai. Ocorre, também, em quase toda a África (Hoyo <i>et al.</i> , 1992; Sick, 1997).
Taxonomia
Espécie monotípica (Hoyo <i>et al.</i> , 1992).
Status
Residente, migrante regional.

Registros
Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002, Suplemento); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Rio Branco, <i>Campus</i> da Ufac (Guilherme, E., obs. pess.).
Habitat
Rios, açudes, lagos e poças de água de chuva.
Distribuição Geográfica
Desde o Texas (EUA), até o norte da Argentina (Hoyo <i>et al.</i> , 1992; Sick, 1997).
Taxonomia
São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a <i>D. a. discolor</i> (Hoyo <i>et al.</i> , 1992).
Status
Residente, migrante regional.

pato-do-mato – *Cairina moschata* (Linnaeus, 1758)
Muscovy Duck



Margi Moss



Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010).

Habitat

Rios, açudes e lagos.

Distribuição Geográfica

América tropical, desde o México até o norte do Uruguai (Hoyo *et al.*, 1992).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1992).

Status

Residente.

pé-vermelho – *Amazonetta brasiliensis* (Gmelin, 1789)
Brazilian Teal

Edson Guilherme



Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002, Suplemento); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., obs. pess.); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Rio Branco, *Campus* da Ufac (Guilherme, E., obs. pess).

Habitat

Açudes e lagos e poças de água de chuva.

Distribuição Geográfica

Desde as Guianas até a Argentina e em todo o Brasil (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1992; Sick, 1997).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *A. b. brasiliensis* (Hoyo *et al.*, 1992).

Status

Residente, migrante regional.



Silvia Faustino Linhares



Henrique Moreira



Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002, Suplemento); região central do estado do Acre (Mestre *et al.*, 2010b).

Habitat

Rios, açudes e lagos (provável), estado do Acre, Município de Feijó (Mestre *et al.*, 2010b).

Distribuição Geográfica

Durante as incursões migratórias, pode ser registrada com mais frequência no norte da América do Sul, podendo chegar até o Chile e Uruguai (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1992; Sick, 1997).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1992).

Status

Migrante neártica.

Comentários

Um anel metálico numerado foi recuperado no estado do Acre em 1 de fevereiro de 1982, proveniente de uma marreca-de-asa-azul abatida a tiros em uma localidade (não nominada) da região central do Estado. Este indivíduo, um macho jovem, havia sido anilhado em Alberta no Canadá no dia 23 de agosto de 1974 (Mestre *et al.*, 2010b).

Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002, Suplemento); arredores da cidade de Feijó (Guilherme, E. obs. pess.).

Habitat

Açudes e lagos.

Distribuição Geográfica

Desde o sul dos Estados Unidos (Texas) até o norte da Argentina (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1992; Sick, 1997).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1992).

Status

Residente, migrante regional.

Cracidae **aracuã-pintado** – *Ortalis guttata* (Spix, 1825)
Speckled Chachalaca




Edson Guilherme



Cracidae **jacu-de-spix** – *Penelope jacquacu* Spix, 1825
Spix's Guan

Marco Guedes



Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 28033); Rio Juruá, Estirão do Carmo, próximo à Foz do Rio Grajaú (Novaes, 1957, MPEG 28034, 28035); Rio Juruá, margem direita, Localidade Pedra Preta (Novaes, 1957, MPEG 28036, 28032); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A., MPEG 48033); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 76352, 76353, 76354, 76355); Parque Zoológico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; ver comentários); Alto Rio Acre, Foz do Igarapé dos Patos (Guilherme, E. AC 0033); arredores da cidade de Assis Brasil (Guilherme, 2004); BR-364, Seringal Sardinha (Guilherme, E., AC 0070); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); BR-364 a 40 Km da ponte sobre o Rio Liberdade, margem direita (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60423); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada Transacrea (AC-090) Km 60, margem direita (Guilherme, E., MPEG 61386); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63245); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63462); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 63855); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Jurupari, Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, localidades Távora e Manaus (Dantas, n. p. - 2010); arredores da cidade de Jordão (Dantas, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Porção amazônica da Colômbia, do Equador, da Bolívia e do Brasil. Ocorre, também, no nordeste e sudeste do Brasil (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1994).

Taxonomia

São reconhecidas cinco subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *O. g. guttata* (Novaes, 1957; Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1994).

Status

Residente.

Comentários

Citado como *O. motmot* em Guilherme (2001).

Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 40677, 40676); Rio Ouro Preto, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52940); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A., MPEG 48034; Whittaker *et al.* 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 63856); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63673); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Jurupari, Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, Localidade Távora (Dantas, n. p. - 2010); Município de Mâncio Lima, Comunidade Santa Bárbara (Lemos, T.; Marques, E., AC 616).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD.

Distribuição Geográfica

Centro-oeste amazônico, desde a Guiana Inglesa e Venezuela até a Bolívia (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1994).

Taxonomia

São reconhecidas quatro subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *P. j. jacquacu* (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1994).

Status

Residente.



Margi Moss



Eduardo Maciel



Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Alto Rio Acre, Foz do Igarapé dos Patos (Guilherme, E. AC 0034); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 76359, 76360, 76361); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Ocorre no centro-oeste amazônico, desde as Guianas até o Peru, na Bolívia e no Paraguai. No Brasil, esta espécie ocorre desde a margem norte do Solimões até o pantanal mato-grossense (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1994).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *A. c. cumanensis* (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1994).

Status

Residente.

Nome anterior

Pipile cumanensis.

Comentários

Em Whittaker *et al.* (2002) esta espécie foi nominada como *Pipile cumanensis*, sua antiga denominação.

Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002, Suplemento).

Habitat

FOA com palmeiras (provável).

Distribuição Geográfica

Porção amazônica do Equador, do Peru e da Bolívia. Ocorre na Amazônia ocidental brasileira (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1994; Sick, 1997).

Taxonomia

Ver Comentários.

Status

Ver Comentários.

Comentários

(*) Este registro precisa de confirmação (Guilherme, 2009; 2012).



Whaldener Endo



Ricardo Gentil



Registros
Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002, Suplemento).
Habitat
FOA aluvial (provável).
Distribuição Geográfica
Ocorre no centro-oeste amazônico (Hoyo <i>et al.</i> , 1994; Sick, 1997).
Taxonomia
Ver Comentários.
Status
Ver Comentários.
Comentários
(*) Este registro precisa de confirmação (Guilherme, 2009; 2012).

Registros
Alto Rio Moa, Igarapé Ramon, PNSD (Whitney <i>et al.</i> , n. p. - 1997, MPEG 52818, 52819); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002, Suplemento); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 76356, 76357, 76358); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre <i>et al.</i> 2010).
Habitat
FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD submontana.
Distribuição Geográfica
Ocorre no extremo sudeste da Colômbia, no leste do Peru e da Bolívia. No Brasil, ocorre da calha sul do Rio Amazonas até o Mato Grosso (Pinto, 1978; Hoyo <i>et al.</i> , 1994; Sick, 1997).
Taxonomia
Espécie monotípica (Hoyo <i>et al.</i> , 1994).
Status
Residente.
Nome anterior
Tratado em artigos anteriores como <i>Mitu tuberosum</i> .

uru-corcovado – *Odontophorus gujanensis* (Gmelin, 1789)
Marbled Wood-Quail



Tomaz Melo



uru-de-topete – *Odontophorus stellatus* (Gould, 1843)
Starred Wood-Quail



Whaldener Endo

Jovem



Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Rio Jurupari, Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010).

Habitat

FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Ocorre na porção norte da América do Sul cisandina (Pinto, 1978; Sick, 1997).

Taxonomia

São reconhecidas oito subespécies. A forma que ocorre no Acre parece ser, de acordo com a distribuição geográfica, a *O. g. pachyrhynchus* (Hoyo *et al.*, 1994).

Status

Residente.

Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, 1958, MPEG 28042, 28043); Igarapé Preto, afluente do Rio Juruá-mirim, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52879); BR-364, Seringal Sardinha (Guilherme, E. AC 0127); Floresta Estadual do Antimary, Ramal Uirapuru (Guilherme, E., MPEG 60424); Estrada Transacreaana (AC-090) Km 60, margem esquerda (Guilherme, E., MPEG 61514); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 58822); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Município de Jordão, localidades Távora, Pará, Manaus e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com bambus, FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD.

Distribuição Geográfica

Amazônia sul-ocidental brasileira. Ocorre, também, no extremo leste do Equador, leste do Peru e no noroeste da Bolívia (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1994).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1994).

Status

Residente.

mergulhão-pequeno – *Tachybaptus dominicus* (Linnaeus, 1766)

Least Grebe



Ciro Albano



Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002, Suplemento); Estrada Transacriana (AC-090); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 63857); BR-364, entre os municípios de Manuel Urbano e Feijó (Guilherme, E. obs. pess.).

Habitat

Açudes e lagos.

Distribuição Geográfica

Ocorre do sul dos Estados Unidos ao norte da Argentina (Hoyo *et al.*, 1992; Sick, 1997).

Taxonomia


São reconhecidas quatro subespécies. A forma que ocorre na América do Sul é a *T. d. speciosus* (Hoyo *et al.*, 1992).

Status

Residente.

mergulhão-caçador – *Podilymbus podiceps* (Linnaeus, 1758)

Pied-billed Grebe *



Celso B. Almeida



Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002, Suplemento).

Habitat

Açudes e lagos.

Distribuição Geográfica

Ocorre da América do Norte até o Chile e Argentina (Patagônia). Possui distribuição esparsa no Brasil oriental (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1992; Sick, 1997).

Taxonomia

Ver Comentários.

Status

Ver Comentários.

Comentários

(*) Este registro precisa de confirmação (Guilherme, 2009; 2012).

flamingo-da-puna – *Phoenicoparrus jamesi* (Sclater, 1886)

James's Flamingo



João Batista Cardozo



Registros
Arredores do Aeroporto Internacional de Rio Branco (Guilherme <i>et al.</i> , 2005, MPEG 58950).
Habitat
Lagos salgados em grande altitude (apenas em sua área de ocorrência natural) (Hoyo <i>et al.</i> , 1992).
Distribuição Geográfica
Ocorre em uma área limitada na cordilheira andina peruana, boliviana, chilena e argentina (Hoyo <i>et al.</i> , 1992).
Taxonomia
Espécie monotípica (Hoyo <i>et al.</i> , 1992).
Status
Vagante (Guilherme <i>et al.</i> , 2005, 2012).

maguari – *Ciconia maguari* (Gmelin, 1789)

Maguari Stork



Emerson Kaseker



Registros
Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002, Suplemento); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen <i>et al.</i> , 2005); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008).
Habitat
Margens de rios e lagos.
Distribuição Geográfica
Ocorre na América do Sul cisandina, da Venezuela até a Argentina (Hoyo <i>et al.</i> , 1992).
Taxonomia
Espécie monotípica (Hoyo <i>et al.</i> , 1992).
Status
Migrante intratropical.



Henrique Moreira



Edson Guilherme



Jovem

Registros
Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002, Suplemento); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre <i>et al.</i> 2010).
Habitat
Margens de rios, açudes e lagos.
Distribuição Geográfica
Ocorre do México ao norte da Argentina e Uruguai (Pinto, 1978; Hoyo <i>et al.</i> , 1992; Sick, 1997). Espécie considerada migrante intratropical no estado do Acre.
Taxonomia
Espécie monotípica (Hoyo <i>et al.</i> , 1992).
Status
Migrante intratropical.

Registros
Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney <i>et al.</i> , n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002, Suplemento); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E. AC 0041); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme <i>et al.</i> , n. p. - 2013).
Habitat
Margens de rios, açudes e lagos.
Distribuição Geográfica
Ocorre no sudeste dos Estados Unidos, na América Central e na América do Sul cisandina (Hoyo <i>et al.</i> , 1992).
Taxonomia
Espécie monotípica (Hoyo <i>et al.</i> , 1992)
Status
Migrante intratropical.

Phalacrocoracidae **biguá** – *Phalacrocorax brasiliannus* (Gmelin, 1789)
Neotropic Cormorant



Edson Guilherme



Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Alto Rio Acre, Foz do Igarapé dos Patos (Guilherme, E. obs. pess.); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010).

Habitat

Margens de rios, açudes e lagos.

Distribuição Geográfica

Ocorre no sul dos Estados Unidos, na América Central e em toda a América do Sul (Hoyo *et al.*, 1992; Sick, 1997).

Taxonomia

Duas subespécies são reconhecidas. A forma sul americana é a *P. b. olivaceus* (Hoyo *et al.*, 1992).

Status

Residente.

Nome anterior

Phalacrocorax olivaceus.

biguatinga – *Anbinga anbinga* (Linnaeus, 1766)
Anhinga

Anhinga



Edson Guilherme



Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 76368); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., AC 0052); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Parque Zoológico e *Campus* da Ufac, Rio Branco (Guilherme, E. Obs. Pess.); Município de Xapuri, Ramal Pinheiro Barreto (Guilherme, E., obs. pess.).

Habitat

Margens de rios, açudes e lagos.

Distribuição Geográfica

Ocorre no sul dos Estados Unidos, na América Central e em toda a América do Sul cisandina (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1992; Sick, 1997).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma Sul Americana é a *A. a. anbinga* (Hoyo *et al.*, 1992).

Status

Residente.

Ardeidae **socó-boi** – *Tigrisoma lineatum* (Boddaert, 1783)
Rufescent Tiger-Heron



Edson Guilherme



Ardeidae **garça-da-mata** – *Agamia agami* (Gmelin, 1789)
Agami Heron



Emerson Kaseker



Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 76367); Floresta Estadual do Antimary, Ramal Uirapuru (Guilherme, E., MPEG 60425); *Campus* e Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, E., obs. Pers.; Lima J. & Portela, R. AC – 660; Lima *et al.*, 2014); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63463); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Município de Jordão, Localidade Manaus (Dantas, n. p. - 2010); Rio Jurupari, Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010).

Habitat

Rios, açudes e lagos.

Distribuição Geográfica

Ocorre na América Central e América do Sul cisandina (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1992; Sick, 1997).

Taxonomia

Duas subespécies são reconhecidas. A forma que ocorre no Acre é *T. l. lineatum* (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1992).

Status

Residente.

Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002).

Habitat

Rios, açudes e lagos.

Distribuição Geográfica

Ocorre América Central e norte da América do Sul cisandina (Amazônia) (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1992).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1992).

Status

Residente.

Comentários

Os dois únicos registros desta espécie no Acre foram visuais.

Ardeidae **arapapá** – *Cochlearius cochlearius* (Linnaeus, 1766)
Boat-billet Heron



Henrique Moreira



socoi-zigue-zague – *Zebrilus undulatus* (Gmelin, 1789)
Zigzag Heron *



Ciro Albano



Jovem

Registros
Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002); Alto Rio Acre, Foz do Igarapé dos Patos (Guilherme, E. obs. pess.); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63464); Rio Jurupari, Localidade Humaitá (Aleixo <i>et al.</i> , n. p. - 2010. MPEG 69983); Município de Rio Branco, Estrada Dias Martins (Aiache, W. A., AC 617).
Habitat
Margens de rios e lagos, FOA aluvial.
Distribuição Geográfica
Ocorre na América Central e na América do Sul cisandina, da Colômbia ao nordeste da Argentina (Pinto, 1978; Hoyo <i>et al.</i> , 1992; Sick, 1997).
Taxonomia
Cinco subespécies são reconhecidas. A forma que ocorre no Acre é a <i>C. c. cochlearius</i> (Hoyo <i>et al.</i> , 1992).
Status
Residente.

Registros
Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002, Suplemento).
Habitat
Margens de rios, açudes e lagos.
Distribuição Geográfica
Ocorre na Amazônia oriental. Foi registrada também no leste do Peru e no nordeste da Bolívia (Pinto, 1978; Hoyo <i>et al.</i> , 1992; Sick, 1997).
Taxonomia
Ver Comentários.
Status
Ver Comentários.
Comentários
(*) Este registro precisa de confirmação (Guilherme, 2009; 2012).


Ardeidae **socoí-vermelho** – *Ixobrychus exilis* (Gmelin, 1789)
Least Bittern



Bertrando Campos



Ardeidae **savacu** – *Nycticorax nycticorax* (Linnaeus, 1758)
Black-crowned-Night-Heron



Emerson Kaseker



Registros

Município de Rio Branco, *Campus* da Ufac (Guilherme, E., AC 745).

Habitat

Área alagada, charcos.

Distribuição Geográfica

Da América do Norte até a Argentina. Possui distribuição dispersa e pontual em território brasileiro (Hoyo *et al.*, 1992).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1992).

Status

Incerto.

Comentários

O único registro desta espécie no estado do Acre é baseado em um espécime encontrado debilitado (possivelmente foi atropelado) no *Campus* da Ufac. O indivíduo não resistiu aos ferimentos e morreu. A pele foi preparada e incorporada à coleção científica do Laboratório de Ornitologia da Ufac.

Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002, Suplemento); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 63465); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008).

Habitat

Margens de rios, açudes e lagos.

Distribuição Geográfica

Ocorre do Canadá à Terra do Fogo na Argentina. Ocorre, também, em parte da Europa, da Ásia e da África (Hoyo *et al.*, 1992; Sick, 1997).

Taxonomia

São reconhecidas quatro subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *N. n. boactli* (Hoyo *et al.*, 1992).

Status

Residente.



Robson Czaban



Margi Moss



Registros

Rio Abunã, margem esquerda (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35562); Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 40665); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Parque Zoobotânico e *Campus* da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001, AC 0777, 0786); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Estrada Transacrea (AC-090) Km 60, margem esquerda (Guilherme, E., MPEG 61518); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 61981); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Rio Jurupari, Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Jurupari, Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

Margens de rios, açudes e lagos, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Ocorre no sul da América do Norte, em quase toda a América do Sul, inclusive em todo o Brasil. Distribui-se também pela África, Ásia e Oceania (Hoyo *et al.*, 1992; Sick, 1997).

Taxonomia

São reconhecidas trinta subespécies em todo o mundo. A forma sul-americana é a *B. s. striatus* (Hoyo *et al.*, 1992).

Status

Residente.

Registros

Arredores da cidade de Rio Branco (Silva & Bocquentin, 1994); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Estrada Transacrea (AC-090) Km 60, margem direita (Guilherme, obs. pess.); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., obs. pess.) Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

Área aberta com pastagem e margens de rios.

Distribuição Geográfica

Ocorre no sul da América do Norte, em quase toda a América do Sul, incluindo todo o Brasil. Distribui-se também pela África, parte da Europa, Ásia e Oceania (Hoyo *et al.*, 1992; Sick, 1997).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Brasil é a *B. i. ibis* (Hoyo *et al.*, 1992).

Status

Residente (invasora).

Comentários


Esta espécie é originária do Velho Mundo e é de fácil identificação (Sick, 1997). Pode ser encontrada em quase todo o Estado, comumente nas pastagens, acompanhando o gado. Agrupam-se, ao entardecer, em dormitórios localizados próximos a açudes e áreas alagadiças. É vista também, em companhia de *Egretta thula* e *Ardea alba*, nas praias arenosas dos principais rios (*e.g.*, Rio Purus).



Robson Czaban



Edson Guilherme



Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E. AC 0050, 0051); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63674); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

Rios, açudes e lagos, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Ocorre em toda a América do Sul, com exceção da cordilheira andina (Hoyo *et al.*, 1992).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1992)

Status

Residente.

Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 61980); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Jurupari, Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, Localidade Manaus (Dantas, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

Rios, açudes e lagos.

Distribuição Geográfica

Ocorre no sul dos Estados Unidos, na América Central e em quase toda a América do Sul. Distribui-se também em parte da Europa, Ásia e Oceania (Hoyo *et al.*, 1992).

Taxonomia

São reconhecidas quatro subespécies. A forma que ocorre no Brasil é a *A. a. egretta* (Hoyo *et al.*, 1992).

Status

Residente.

Comentários

Espécie muito comum em todo o Estado. É vista, geralmente, forrageando sozinha na calha dos rios e igarapés (na época de estiagem). Durante a estação chuvosa, pode ser encontrada em companhia de *Bubulcus ibis* e *Egretta thula*, forrageando em pastagens e outras áreas desmatadas que tenham corpos d'água.



Edson Guilherme



Edson Guilherme



Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., obs. pess); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Jurupari, Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); *Campus* e Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, E., obs. pess); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

Rios, açudes e lagos, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Ocorre desde o Panamá até o Paraguai e em quase todo o Brasil (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1992; Sick, 1997).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1992).

Status

Residente.

Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., obs. pess.); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Jurupari, Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010).

Habitat

Rios, açudes e lagos.

Distribuição Geográfica

Ocorre no sul dos Estados Unidos e em quase toda a América do Sul (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1992; Sick, 1997).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1992).

Status

Residente.

Comentários

Esta espécie ocorre em todo o estado do Acre e, a exemplo de *Bubulcus ibis* e *Ardea alba*, pode ser vista tanto nas margens dos rios quanto em pastagens e em áreas desmatadas que tenham corpos d'água.

Ardeidae **garça-azul** – *Egretta caerulea* (Linnaeus, 1758)
Little Blue Heron



Robson Czaban



Registros
Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002, Suplemento); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 63466); Município de Manoel Urbano, Rio Purus (Kaseker, E. P. 2011 [Wikiaves - WA455346]).
Habitat
Rios, açudes e lagos.
Distribuição Geográfica
Ocorre do sul dos Estados Unidos até o Peru, a Bolívia e o Uruguai (Pinto, 1978; Hoyo <i>et al.</i> , 1992; Sick, 1997).
Taxonomia
Espécie monotípica (Hoyo <i>et al.</i> , 1992).
Status
Residente.

trombeteiro – *Ceribis oxycerca* (Spix, 1825)
Sharp-tailed Ibis *



Fernando Pacheco



Registros
Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002, Suplemento).
Habitat
Margens de rios e lagos.
Distribuição Geográfica
Leste da Colômbia, Venezuela, Guiana. É encontrado na Amazônia brasileira em Roraima e também Rondônia e noroeste de Mato Grosso (Pinto, 1978; Hoyo <i>et al.</i> , 1992; Sick, 1997).
Taxonomia
Ver Comentários.
Status
Ver Comentários.
Comentários
(*) Este registro precisa de confirmação (Guilherme, 2009; 2012).

Threskiornithidae


coró-coró – *Mesembrinibis cayennensis* (Gmelin, 1789)
Green Ibis



Bertrando Campos



tapicuru-de-cara-pelada – *Phimosus infuscatus* (Lichtenstein, 1823)
Bare-faced Ibis *



Celso B. Almeida



Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Santos, 2011, MPEG 63241); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63611); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64340); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Jurupari, Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Jurupari, Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010).

Habitat

Margens de rios, açudes e lagos, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Ocorre no leste da Costa Rica, no Panamá e na América do Sul cisandina (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1992; Sick, 1997).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1992).

Status

Residente.

Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002, Suplemento).

Habitat

Margens de rios, açudes e lagos.

Distribuição Geográfica

Ocorre da Venezuela ao Uruguai e em quase todo o Brasil (Hoyo *et al.*, 1992; Sick, 1997).

Taxonomia

Ver Comentários.

Status

Ver Comentários.

Comentários

(*) Este registro precisa de confirmação (Guilherme, 2009; 2012).

colhereiro – *Platalea ajaja* Linnaeus, 1758
Roseate Spoonbill



Edson Guilherme



Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002, Suplemento); arredores da cidade de Rio Branco, Estrada do Panorama, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E. 2015 [Wikiaves - WA1743346]).

Habitat

Rios, açudes e lagos.

Distribuição Geográfica

Ocorre do sudeste dos EUA até a Argentina. Quase todo o Brasil (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1992; Sick, 1997).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1992).

Status

Migrante intratropical.

urubu-de-cabeça-vermelha – *Cathartes aura* (Linnaeus, 1758)
Turkey Vulture



Edson Guilherme



Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Parque Zoológico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Jurupari, Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

Dossel e borda de FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD submontana, FOD, área aberta (desmatada), pastagens.

Distribuição Geográfica

Ocorre do Canadá até a Argentina e em todo o Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 1994).

Taxonomia

São reconhecidas quatro subespécies. A forma que ocorre no Acre, pela distribuição geográfica, deve ser a *C. a. ruficollis* (Hoyo *et al.*, 1994).

Status

Residente.

Comentários

Espécie de fácil identificação, é encontrada em todo o estado do Acre.

urubu-de-cabeça-amarela – *Cathartes burrovianus* Cassin, 1845
Lesser Yellow-headed Vulture *



Margi Moss




Registros
Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002, Suplemento).
Habitat
FOA com palmeiras, FOA aluvial (provável).
Distribuição Geográfica
Ocorre do México ao norte da Argentina. Esta espécie é encontrada localmente em diversas regiões do Brasil (Hoyo <i>et al.</i> , 1994; Sick, 1997).
Taxonomia
Ver Comentários.
Status
Ver Comentários.
Comentários
(*) A presença desta espécie na lista suplementar divulgada por Whittaker <i>et al.</i> , (2002) pode ter sido um erro de identificação. O autor do registro pode ter confundido um jovem urubu-da-mata (<i>Cathartes melambrotus</i>) com o urubu-de-cabeça-amarela. Este registro precisa de confirmação (Guilherme, 2009; 2012).

urubu-da-mata – *Cathartes melambrotus* Wetmore, 1964
Greater Yellow-headed Vulture



Edson Guilherme



Registros
Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney <i>et al.</i> , n. p. - 1997); Parque Zoológico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002, MPEG 48029); Município de Mâncio Lima, Campina (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen <i>et al.</i> , 2005); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre <i>et al.</i> 2010); Município de Jordão, localidades Távora, Pará, Manaus e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Foz do Rio Jurupari (Aleixo <i>et al.</i> , n. p. - 2010); Rio Jurupari, Localidade Humaitá (Aleixo <i>et al.</i> , n. p. - 2010); Rio Jurupari, Localidade Novo Oriente (Aleixo <i>et al.</i> , n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme <i>et al.</i> , n. p. - 2013).
Habitat
Dossel e borda de FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD submontana, FOD, campinarana.
Distribuição Geográfica
Espécie de ocorrência amazônica (Pinto, 1978; Hoyo <i>et al.</i> , 1994; Sick, 1997).
Taxonomia
Espécie monotípica (Hoyo <i>et al.</i> , 1994).
Status
Residente.
Comentários
Trata-se de uma espécie de fácil identificação. É comumente vista às margens dos principais rios que cortam o estado do Acre.

urubu-de-cabeça-preta – *Coragyps atratus* (Bechstein, 1793)


Black Vulture




Edson Guilherme

**urubu-rei** – *Sarcorampbus papa* (Linnaeus, 1758)

King Vulture



João Quental

**Registros**

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada Transacreeana (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61214); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Município de Jordão, localidades Távora, Pará, Manaus e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Jurupari, Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Jurupari, Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Cruzeiro do Sul, BR-307, Estrada da Variante (Pinheiro & Turci, 2013).

Habitat

FOA aluvial, área aberta, pastagens, margens de rios, ambientes urbanos.

Distribuição Geográfica

Ocorre no sul dos Estados Unidos, na América Central e em quase toda a América do Sul cisandina (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1994; Sick, 1997).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é *C. a. brasiliensis* (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1994).

Status

Residente.

Comentários

Espécie bem adaptada a ambientes urbanos. Ocorre em todo o estado do Acre.

Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); arredores da cidade de Assis Brasil (Guilherme, 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme 2010); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Município de Jordão, localidades Pará, Manaus e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011).

Habitat

FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, área aberta.

Distribuição Geográfica

Ocorre na América Central e na América do Sul, do México ao norte da Argentina (Hoyo *et al.*, 1994; Sick, 1997).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1994).

Status

Residente.

condor-dos-andes – *Vultur gryphus* Linnaeus, 1758
Andean condor *



Jovem

João Quental



águia-pescadora – *Pandion haliaetus* (Linnaeus, 1758)
Osprey



Emerson Kaseker



Registros
Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002, Suplemento).
Habitat
Terras altas, nas proximidades da cordilheira andina (provável).
Distribuição Geográfica
Ocorre em toda a cordilheira andina (Hoyo <i>et al.</i> , 1994; Sick, 1997).
Taxonomia
Ver Comentários.
Status
Ver Comentários.
Comentários
(*) A ocorrência desta espécie no Acre foi citada apenas na lista suplementar divulgada por Whittaker <i>et al.</i> (2002). Acredito que o registro desta espécie no Juruá, feito por moradores locais, seja um provável erro de identificação. Mesmo assim, inclui esta espécie na lista secundária das aves do Acre (Guilherme, 2012), até que haja algum registro documental de sua presença no estado do Acre.

Registros
Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., & Santos, M. P. D., MPEG 61216); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre <i>et al.</i> 2010); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011).
Habitat
Margens de rios, açudes e lagos, FOA aluvial.
Distribuição Geográfica
Ocorre em todos os continentes (Hoyo <i>et al.</i> , 1994).
Taxonomia
São reconhecidas quatro subespécies. A forma que ocorre no Acre é <i>P. h. carolinensis</i> (Pinto, 1978; Hoyo <i>et al.</i> , 1994).
Status
Migrante boreal.
Comentários
Um anel metálico numerado foi recuperado no estado do Acre em 15 de dezembro de 1982 proveniente de uma águia pescadora abatida a tiros em uma localidade (não nominada) do oeste do Estado. Este indivíduo, um jovem, havia sido anilhado no estado americano do Wisconsin no dia 3 de julho daquele mesmo ano (Mestre & Bierregaard 2009).

gavião-de-cabeça-cinza – *Leptodon cayanensis* (Latham, 1790)

Gray-headed Kite



Robson Czaban

**caracoleiro** – *Chondrohierax uncinatus* (Temminck, 1822)

Hooh-billed Kite



Ciro Albano

**Registros**

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Município de Jordão, localidades Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Parque Zoobotânico da Universidade Federal do Acre, Rio Branco (Xavier, R. S., 2013 [Wikiaves - WA1182120]).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Ocorre na América Central e na América do Sul cisandina (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1994).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *L. c. cayanensis* (Hoyo *et al.*, 1994).

Status

Residente.

Comentários

Todos os registros desta espécie no estado do Acre foram visuais.

Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Município de Mâncio Lima (Biancalana, R. N., 2014 [Wikiaves - WA1392995]); Parque Zoobotânico da Universidade Federal do Acre (Silva, G. C. 2015 [Wikiaves - WA1704104]).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus.

Distribuição Geográfica

Ocorre na América Central e na América do Sul cisandina (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1994).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre, segundo a distribuição geográfica, é a *C. u. uncinatus* (Hoyo *et al.*, 1994).

Status

Residente.

gavião-tesoura – *Elanoides forficatus* (Linnaeus, 1758)
Swallow-tailed Kite



Emerson Kaseker



gaviãozinho – *Gampsonyx swainsonii* Vigors, 1825
Parl Kite



Bertrando Campos



Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011); Município de Jordão, Localidade Manaus (Dantas, n. p. - 2010); Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010).

Habitat

Dossel de FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, área aberta com pastagens, campinarana.

Distribuição Geográfica

Ocorre da América do Norte até a Argentina e em todo o Brasil (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1994).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. É possível que ambas *E. f. forficatus* e *E. f. yetapa* passem pelo Acre durante o período de migração.

Status

Migrante intratropical. É de fácil reconhecimento e pode ser encontrada em todo o estado do Acre.

Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002, Suplemento); arredores da cidade de Assis Brasil (Guilherme, 2004, AC 0077); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 61388); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, borda de FOD, áreas abertas com pastagens.

Distribuição Geográfica

Ocorre na América Central e na América do Sul cisandina até o Paraguai e o norte da Argentina (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1994).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *G. s. swainsonii* (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1994).


Status

Residente.

gavião-ripina – *Harpagus bidentatus* (Latham, 1790)
Double-toothed Kite



Marco Guedes



Registros

Rio Juruá, margem direita, cidade de Cruzeiro do Sul (Novaes, 1957; 1958, MPEG 34438); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 48030, Whittaker *et al.*, 2002); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 59765); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010; Plácido, R. A., 2015 [Wikiaves - WA1888499]); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 61974); Município de Jordão, localidades Pará, Veneza e arredores da cidade de Jordão (Dantas, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Ocorre na América Central e no norte da América do Sul (Hoyo *et al.*, 1994; Sick, 1997).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *H. b. bidentatus* (Novaes, 1957, Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1994).

Status

Residente.

tauató-pintado – *Accipiter poliogaster* (Temminck, 1824)
Gray-bellied Hawk



Emerson Kaseker



Registros

Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker & Oren, 1999), registro inválido (ver comentários); Município de Xapuri (Melo, M. A., 2013 [Wikiaves - WA104527]).

Habitat

FOA com palmeiras.

Distribuição Geográfica

Ocorre do norte da América do Sul até a Bolívia e Argentina (Hoyo *et al.*, 1994; Sick, 1997).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1994).

Status

Residente.

Comentários

O suposto primeiro registro desta espécie para o Acre, feito por Whittaker & Oren (1999), havia sido baseado na pele de uma fêmea jovem (MPEG 48030) proveniente do Alto Rio Juruá. Esta pele foi descrita por Whittaker & Oren (1999) como um tipo de plumagem ainda não reportado para *Accipiter poliogaster*. No entanto, uma análise do espécime feita *a posteriori* pela equipe do Museu Goeldi, mostrou tratar-se de *Harpagus bidentatus*.

Em 2013, os biólogos Marcos Melo e Fernando Igor De Godoy divulgaram no site Wikiaves duas gravações da vocalização de *Accipiter poliogaster* feitas no Município de Xapuri. Estes registros confirmaram, em definitivo, a presença desta espécie em território acreano.

gavião-miudinho – *Accipiter supervilosus* (Linnaeus, 1766)

Tiny Hawk



Robson Czaban

**gavião-miúdo** – *Accipiter striatus* Vieillot, 1808

Sharp-shinned Hawk



Eduardo Fernandes

**Registros**

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); BR-364 a 40 Km da ponte sobre o Rio Liberdade, margem direita (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60426); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008).

Habitat

FOA com palmeiras, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Ocorre da América Central até a Argentina (Hoyo *et al.*, 1994; Sick, 1997).

Taxonomia

Duas subespécies são reconhecidas. A forma que ocorre no Acre é a *A. s. supervilosus* (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1994).

Status

Residente.

Registros

Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus.

Distribuição Geográfica

Da América do Norte até a Argentina (Sick, 1997).

Taxonomia

São reconhecidas dez subespécies (Hoyo *et al.*, 1994). A forma que migra para a Região Sudeste do Brasil é a *A. s. erythronemius* (Hoyo *et al.*, 1994).

Status

Migrante neártica.

Comentários

No ano de 2000, observei um pequeno gavião de dorso cinza e que possuía a plumagem do calção castanha-avermelhada. O indivíduo estava pousado no sub-bosque de uma mata secundária no Parque Zoobotânico da Universidade Federal do Acre (Guilherme, 2001). Por algum tempo, fiquei em dúvida se a espécie daquele avistamento era o gavião miúdo (*Accipiter striatus*) ou o gavião-bombachinha-grande (*Accipiter bicolor*). Hoje estou convencido de que fiz a identificação correta, porque aquele indivíduo era pequeno em relação ao seu congêner e, de fato, estava de passagem pelo parque (descansando). Tanto, que nunca mais foi visto. O gavião-bombachinha-grande é residente na região e, se fosse ela a espécie avistada, certamente já teríamos feito outros registros dela no próprio Parque Zoobotânico ou nas regiões circunvizinhas. Como se trata de uma espécie migratória, a presença de *Accipiter striatus* no Acre será sempre transitória e pontual. Isto pode explicar o fato de não ter sido vista novamente no Parque Zoobotânico da Ufac desde que foi avistada, pela única vez, há 15 anos.

gavião-bombachinha-grande – *Accipiter bicolor* (Vieillot, 1817)

Bicolored Hawk



Tancredo Maia Filho

**Registros**

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão (Dantas, n. p. - 2010).

Habitat

FOA com palmeiras, FOD submontana, FOD.

Distribuição Geográfica

Ocorre na América Central e em quase toda a América do Sul cisandina (Hoyo *et al.*, 1994; Sick, 1997).

Taxonomia

Cinco subespécies são reconhecidas. A forma que ocorre no Acre, segundo a distribuição geográfica, é a *A. b. bicolor* (Hoyo *et al.*, 1994).

Status


Residente (provável).

sovi – *Ictinia plumbea* (Gmelin, 1788)

Plumbeous Kite



Emerson Kaseker

**Registros**

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Parque Zoológico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada Transacrea (AC-090) Km 60, margem esquerda e Ramal Jarinal (Guilherme, E., MPEG 61387, 64529; Guilherme & Santos, 2009); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63675); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão (Dantas, n. p. - 2010); Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD submontana, área aberta com pastagem.

Distribuição Geográfica

Ocorre na América Central (México) e na América do Sul cisandina até o norte da Argentina (Hoyo *et al.*, 1994).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1994).


Status

Residente.

gavião-belo – *Busarellus nigricollis* (Latham, 1790)
Black-collared Hawk



Bertrando Campos



Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 63467); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010).

Habitat

FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD submontana, área aberta com pastagem.

Distribuição Geográfica

Ocorre no sul da América Central e na América do Sul cisandina (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1994; Sick, 1997).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *B. n. nigricollis* (Hoyo *et al.*, 1994).

Status

Residente.

gavião-caramujeiro – *Rostrhamus sociabilis* (Vieillot, 1817)
Snail Kite



Bertrando Campos



Registros

Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E. AC 0042).

Habitat

Rios, açudes e lagos, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Ocorre na América Central e em quase toda a América do Sul cisandina (Hoyo *et al.*, 1994; Sick, 1997).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *R. s. sociabilis* (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1994).

Status

Residente.

gavião-do-igapó – *Helicolestes hamatus* (Temminck, 1821)
Slender-billed Kite



Ciro Albano



Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); BR-364, Seringal Sardinha (Guilherme, E. AC 0112); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63676); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Jurupari, Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Ocorre no leste do Panamá e na porção oeste da América do Sul cisandina (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1994; Sick, 1997).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1994).

Status

Residente.

gavião-pernilongo – *Geranospiza caerulescens* (Vieillot, 1817)
Crane Hawk



Henrique Moreira



Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 63468); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Machado, 2015; Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015).

Habitat

FOA com palmeiras, FOD submontana, área aberta com pastagem.

Distribuição Geográfica

Ocorre na América Central e na América do Sul cisandina (Hoyo *et al.*, 1994; Sick, 1997).

Taxonomia

São reconhecidas seis subespécies. A forma que ocorre no Acre, segundo a distribuição geográfica, é a *G. c. caerulescens* (Hoyo *et al.*, 1994).


Status

Residente.

gavião-azul – *Buteogallus schistaceus* (Sundevall, 1851)
Slate-colored Hawk



Edson Guilherme



Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 76364); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Estrada Transacreana (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61215); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Rio Jurupari, Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, E., 2013 [Wikiaves - WA1033648]).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD submontana, área aberta com pastagem.

Distribuição Geográfica

Ocorre na Amazônia, da Venezuela até a Bolívia (Hoyo *et al.*, 1994; Sick, 1997).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1994).

Status

Residente.

Nome anterior

Leucopternis schistaceus.

gavião-caboclo – *Heterospizias meridionalis* (Latham, 1790)
Savanna Hawk



Bertrando Campos



Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002).

Habitat

FOA com palmeiras.

Distribuição Geográfica

Ocorre do Panamá até a Argentina e em todo o Brasil (Hoyo *et al.*, 1994; Sick, 1997).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1994).

Status

Residente.



Bertrando Campos



Edson Guilherme



Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010; MPEG 59831); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Município de Jordão, Localidade Manaus (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011).

Habitat

FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Ocorre do México até a Argentina e em todo o Brasil (Hoyo *et al.*, 1994; Sick, 1997).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *B.u. urubitinga* (Hoyo *et al.*, 1994).

Status

Residente.

Nome anterior

Buteogallus urubitinga.

Comentários

Pinheiro & Turci (2013) atribuem a *Buteogallus urubitinga*, uma ave encontrada atropelada na Estrada da Variante, em Cruzeiro do Sul (ver Figura 9b em Pinheiro & Turci, 2013). A ave mostrada na foto, com certeza, não pertence à espécie referida. Trata-se de um caracará jovem (*Caracara plancus*).

Apesar de Pinheiro & Turci (2013) me agradecerem neste artigo pela “...ajuda na identificação das aves” (no plural), esclareço que só recebi do segundo autor (por *e-mail*), uma única foto de um beija-flor morto por atropelamento. A partir desta foto, identifiquei a ave como *Phaethornis hispidus* (Pinheiro & Turci, 2013 – figura 9f). Com relação às demais aves figuradas nesta publicação, não fui instado pelos autores a me manifestar quanto as respectivas identificações.

Registros

Arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35563); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Parque Zoobotânico e *Campus* da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; AC 0270); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Município de Mâncio Lima, Campina (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Ramal Nabor Júnior, Km 26 (Guilherme, E., MPEG 60429); Rio Liberdade, margem direita, próximo à Foz do Igarapé Novena (Guilherme, 2007, MPEG 60430, 60431); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 63469, 63470); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63471); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Município de Jordão, localidades Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., obs. pess.); Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Jurupari localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo e Guilherme, n. p.); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, área aberta com pastagens, campinarana.

Distribuição Geográfica

Ocorre na América Central e na América do Sul cisandina, do México até a Argentina e em todo o Brasil (Hoyo *et al.*, 1994; Sick, 1997).

Taxonomia

São reconhecidas 12 subespécies (Hoyo *et al.*, 1994). Ao comparar os seis espécimes coletados no Acre com as formas de provável ocorrência na região, notei que, no Estado, ocorrem ao menos duas formas: *R. m. occiduus* e *R. m. cf. magnirostris* (Guilherme, 2009, 2012).

Status

Residente.

gavião-de-sobre-branco – *Parabuteo leucorrhous* (Quoy & Gaimard, 1824)
White-rumped Hawk



Ciro Albano



Registros

ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010).

Habitat

FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Aparentemente disjunta. Ocorre ao longo da cordilheira andina, da Venezuela ao noroeste da Bolívia e também no sudeste do Brasil até o Paraguai e norte da Argentina (Hoyo *et al.*, 1994).

Taxonomia

Espécie monotípica.

Status

Vagante.

Nome anterior

Pernohierax leucorrhous.

Comentários

O único registro desta espécie no Acre foi visual.

gavião-de-rabo-branco – *Geranoaetus albicaudatus* Vieillot, 1816
White-tailed Hawk



Edson Guilherme



Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002, Suplemento); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60432); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64341, 64342); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., obs. pess.); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, área aberta com pastagens.

Distribuição Geográfica

Ocorre do México até a Argentina. Na Amazônia, sua ocorrência é local, geralmente em áreas campestres ou desmatadas (Hoyo *et al.*, 1994; Sick, 1997).

Taxonomia

Três subespécies são reconhecidas. A forma que ocorre no Acre é *B. a. albicaudatus* (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1994).

Status

Residente.

Nome anterior

Buteo albicaudatus.


Comentários

Trata-se de uma espécie recém-chegada e que tem aumentado sua área de ocorrência na região, aproveitando-se, sobretudo, das áreas desmatadas que foram transformadas em pastagens para a criação bovina (Guilherme & Czaban, 2015).

gavião-branco – *Pseudastur albicollis* (Latham, 1790)
White Hawk



Robson Czaban



Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002, Suplemento); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Bujari, Floresta Estadual do Antimary (Guilherme, E. obs. pess.); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010).

Habitat

FOA com palmeiras, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Ocorre na América Central e na Amazônia cisandina (Hoyo *et al.*, 1994; Sick, 1997).

Taxonomia

Quatro subespécies são reconhecidas. A forma que ocorre no Acre é a *P. a. albicollis* (Hoyo *et al.*, 1994).


Status

Residente.

Nome anterior

Leucopternis albicollis.

gavião-vaqueiro – *Leucopternis kublí* (Bonaparte, 1850)
White-browed Hawk



Ricardo Plácido



Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 28112); Alto Rio Moa, Igarapé Amil, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52705); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Ramal Nabor Júnior, Km 26 (Guilherme, E., MPEG 60427, 60428); Município de Jordão, localidades Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010).

Habitat

FOA com palmeiras, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Ocorre na margem sul do Rio Solimões/ Amazonas, desde o leste do Peru e norte da Bolívia até o estado do Pará (Brasil) (Hoyo *et al.*, 1994; Sick, 1997).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1994).


Status

Residente.

gavião-pedrês – *Buteo nitidus* (Latham, 1790)
Gray Hawk



Margi Moss



Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60433, 61389); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011); Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Jurupari localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, área aberta com pastagens.

Distribuição Geográfica

Ocorre do sul dos Estados Unidos até a América do Sul cisandina (Hoyo *et al.*, 1994; Sick, 1997).

Taxonomia

São reconhecidas quatro subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *B. n. nitidus* (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1994).

Status

Residente.

Comentários

Em Whittaker *et al.* (2002), este táxon foi nominado como *Asturina nitida*.

gavião-de-asa-larga – *Buteo platypterus* (Vieillot, 1823)
Broad-winged Hawk



Bertrando Campos



Registros

Município de Sena Madureira (Caruta, J. N., 2014 [Wikiaves - WA1498997]).

Habitat

Borda de FOA com bambus, área aberta.

Distribuição Geográfica

Nordeste da América do Norte. Migra para a América Central e norte da América do Sul durante o inverno boreal.

Taxonomia

Seis subespécies são reconhecidas. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *B. p. platypterus* (Hoyo *et al.*, 1994).

Status

Migratória neártica.

gavião-de-cauda-curta – *Buteo brachyurus* Vieillot, 1816
Short-tailed Hawk



Emerson Kaseker



gavião-papa-gafanhoto – *Buteo swainsoni* Bonaparte, 1838
Swainsoni Hawk



Sílvia Faustino Linhares



Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão (Dantas, n. p. - 2010); Município de Jordão, Localidade Manaus (Dantas, n. p. - 2010); Município de Senador Guiomard, Localidade Bonal (Guilherme, E., 2011 [Wikiaves - WA445982]); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com palmeiras, FOD submontana aberta com pastagem.

Distribuição Geográfica

Ocorre do México até a Argentina e em todo o Brasil (Hoyo *et al.*, 1994; Sick, 1997).

Taxonomia

Duas subespécies são reconhecidas. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *B. b. brachyurus* (Hoyo *et al.*, 1994).

Status

Residente.

Comentários

Guilherme (2004) cita a ocorrência desta espécie nos arredores de Assis Brasil, sudeste do Acre. Entretanto, após uma análise dos dois espécimes coletados à época, concluiu-se que eles pertenciam à espécie *B. albonotatus*, tornando inválido o registro de *B. brachyurus* para aquela localidade.

Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras.

Distribuição Geográfica

Ocorre na América do Norte, do Alaska ao sul dos Estados Unidos. Migra para a América do Sul durante o inverno setentrional (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1994; Sick, 1997).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1994).

Status

Espécie migrante setentrional.


Comentários

Dois anéis metálicos numerados foram recuperados em indivíduos desta espécie no estado do Acre: (a) em 5 de fevereiro de 1962, proveniente de um indivíduo anilhado em 17 de junho de 1959, no estado americano de Oklahoma e (b) em 2 de novembro de 1981 proveniente de um indivíduo anilhado em 11 de julho daquele ano, no estado americano de Utah (Mestre *et al.*, 2010b).

gavião-de-rabo-barrado – *Buteo albonotatus* Kaup, 1847
Zone-tailed Hawk



Emerson Kaseker



uirapu-falso – *Morphnus guianensis* (Daudin, 1800)
Crested Eagle



Isabela Epifani



Registros

Rio Juruá, arredores da cidade de Cruzeiro do Sul (Whittaker & Oren, 1999); Rio Juruá, arredores da cidade de Porto Walter (Whittaker & Oren, 1999); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); arredores da cidade de Assis Brasil (Guilherme, E.; MPEG 58951, 58952); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60434); Rio Jurupari Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); *Campus* e Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, E., 2014 [Wikiaves - WA1330680]).

Habitat

FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD, área aberta com pastagens.

Distribuição Geográfica

Ocorre do sul dos Estados Unidos ao Paraguai. No Brasil, esta espécie ocorre localmente (Hoyo *et al.*, 1994; Sick, 1997).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1994).

Status

Residente.

Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Fazenda Experimental Catuaba (Rasmussen *et al.*, 2005).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus.

Distribuição Geográfica

Ocorre na América Central e na América do Sul, desde a Guatemala até o nordeste da Argentina (Hoyo *et al.*, 1994; Sick, 1997).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1994)

Status

Residente.

gavião-real – *Harpia harpyja* (Linnaeus, 1758)
Harpy Eagle



Jovem

Sílvia Faustino Linhares



gavião-pega-macaco – *Spizaetus tyrannus* (Wied, 1820)
Black Hawk-Eagle



Leandro Espino



Registros

Município de Sena Madureira, Igarapé Xiburema (Peres, 1990); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002, Suplemento); Município de Senador Guiomard, Ramal Nabor Jr. (Guilherme, E. obs. pess.); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Rio Jurupari, Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Floresta Estadual do Antimary (AC 619); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Kaseker, E. P., 2013, [Wikiaves - WA 944868]).

Habitat

FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Ocorre na América Central e na América do Sul cisandina, do México até o nordeste da Argentina (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1994).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1994).

Status

Residente.

Comentários

Em 2006, um indivíduo jovem desta espécie foi resgatado vivo pelo IBAMA, em um assentamento do INCRA localizado na BR-364, a aproximadamente 70 Km de Rio Branco (próximo à Localidade Bonal). Este animal foi entregue ao Parque Ambiental Chico Mendes (Zoológico Municipal) onde se encontra até hoje.

Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 76363); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Município de Jordão, localidades Távora, Pará, Manaus e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Ocorre na América Central e na América do Sul cisandina, do México até a Argentina (Hoyo *et al.*, 1994; Sick, 1997).

Taxonomia

Duas subespécies são reconhecidas. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *S. t. serus* (Hoyo *et al.*, 1994).

Status

Residente.

Comentários

Todos os registros desta espécie no estado do Acre foram visuais.

gavião-pato – *Spizaetus melanoleucus* (Vieillot, 1816)
Black-and-white Hawk-Eagle



Justiniano Magnago



Registros

Arredores da cidade de Rio Branco (Silva & Bocquentin, 1993); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); arredores da cidade de Senador Guiomard (Guilherme, E.; AC 0096); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, área aberta com pastagem.

Distribuição Geográfica

Ocorre na América Central e na América do Sul, do México até a Argentina, com ocorrências esparsas em território brasileiro (Hoyo *et al.*, 1994; Sick, 1997).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1994).

Status

Residente.


Nome anterior

Spizastur melanoleucus.

gavião-de-penacho – *Spizaetus ornatus* (Daudin, 1800)
Ornate Hawk-Eagle



Gabriel Mello



Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Município de Mâncio Lima, campinana (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Município de Jordão, localidades Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

Ocorre na América Central e América do Sul cisandina, do México até a Argentina e em todo o Brasil (Hoyo *et al.*, 1994; Sick, 1997).

Taxonomia

Duas subespécies são reconhecidas. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *S. o. ornatus* (Hoyo *et al.*, 1994).

Status

Residente.

pavãozinho-do-pará – *Eurypyga belias* (Pallas, 1781)
Sunbittern



Celso B. Almeida



Registros
Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 40722); Rio Juruá, Seringal Flora (Novaes, 1957, MPEG 40721); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney <i>et al.</i> , n. p. - 1997); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A., MPEG 48036); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre <i>et al.</i> , 2010); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 61977); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011).
Habitat
FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.
Distribuição Geográfica
Do México até a Bolívia e em toda a Amazônia (Hoyo <i>et al.</i> , 1996).
Taxonomia
São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é <i>E. b. belias</i> (Novaes, 1957, Pinto, 1978; Hoyo <i>et al.</i> , 1996).
Status
Residente.

carão – *Aramus guarauna* (Linnaeus, 1766)
Limpkin




Edson Guilherme



Registros
Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002, Suplemento); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E. AC 0095); <i>Campus</i> da Ufac, Rio Branco (Guilherme, E., AC - 757).
Habitat
Rios, açudes e lagos.
Distribuição Geográfica
Do sul dos Estados Unidos (Flórida) até a Bolívia e em todo o Brasil (Sick, 1997, Hoyo <i>et al.</i> , 1996).
Taxonomia
São reconhecidas quatro subespécies. A forma que ocorre no Acre é a <i>A. g. guarauna</i> (Hoyo <i>et al.</i> , 1996).
Status
Residente.



Robson Czaban



Peru

Bolivia

Registros

Rio Juruá-Mirim, margem direita, Porto Walter, Santo Antônio do Comprido, Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 53966); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 76362); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 58820, 58821); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 61975) Município de Jordão, localidades Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2008a; 2011); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63246); Rio Jurupari, Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Margem sul do Solimões, do leste do Peru e norte da Bolívia até a margem esquerda do Rio Madeira no Brasil (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1996).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *P. l. leucoptera* (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1996).

Status

Residente.



Henrique Moreira



Peru

Bolivia

Registros

Rio Juruá, Localidade São Salvador, próximo à Foz do Rio Grajaú (Novaes, 1957, MPEG 40726, 40725); Rio Juruá, margem esquerda, Cruzeiro do Sul, Porongaba (Whittaker, A. MPEG 48035); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); BR-364, Seringal Sardinha (Guilherme, E. AC 0124); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Ramal Nabor Júnior, Km 26 (Guilherme, E., MPEG 60440); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 61976); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão (Dantas, n. p. - 2010); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., obs.pess.); Rio Jurupari, localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/ Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, margens de rios e lagos.

Distribuição Geográfica

Do México até a Argentina e em todo o Brasil (Hoyo *et al.*, 1996; Sick, 1997).

Taxonomia

São reconhecidas oito subespécies. A forma que ocorre no Acre é *A. c. cajanea* (Novaes, 1957; Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1996).

Status

Residente.

Nome anterior

Aramides cajanea.




Registros
Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002).
Habitat
FOA aluvial, margens de rios e lagos (provável).
Distribuição Geográfica
Espécie monotípica (Hoyo <i>et al.</i> , 1996).
Taxonomia
Ver Comentários.
Status
Ver Comentários.
Comentários
(*) O único registro desta espécie para o Acre está na lista principal divulgada por Whittaker <i>et al.</i> (2002). No entanto, o autor me informou (<i>in litt.</i>) que não tinha certeza se o espécime registrado na época se tratava mesmo da saracura-de-asa-vermelha (<i>A. calopterus</i>). Diante disso, incluí esta espécie na lista secundária das aves do Acre (Guilherme, 2012), até que surja algum registro documental da sua presença no Estado.



Jonatas Rocha



Registros
Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002, Suplemento).
Habitat
FOA aluvial, margem de rios e lagos (provável).
Distribuição Geográfica
Do México ao Equador, na Amazônia e leste do Brasil (Hoyo <i>et al.</i> , 1996; Sick, 1997).
Taxonomia
Ver Comentários.
Status
Ver Comentários.
Comentários
(*) Este registro precisa de confirmação (Guilherme, 2009; 2012).



Luiz Borges



Emerson Kaseker



Registros

Rio das Minas, margem direita, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52884); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008; Borges, L. H., 2013 [Wikiaves - WA1036245]); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Município de Rio Branco, Estrada Transacreaana, Ramal Jarinal (Leite, G., 2013 [Wikiaves - WA1123038]).

Habitat

FOA aluvial, margens de rios e lagos.

Distribuição Geográfica

Amazônia ocidental, do sul da Colômbia até o norte do Peru (Hoyo *et al.*, 1996).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *A. c. castaneiceps* (Hoyo *et al.*, 1996).

Status

Residente.

Registros

Rio Juruá, arredores de Cruzeiro do Sul (Novaes, 1957, MPEG 40735, 40736, 40737); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002, Suplemento); Cidade de Rio Branco, Bairro Estação Experimental (Guilherme, E., MPEG 59834); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64344); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

Área pantanosa, margens de lagos, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica


Região central e norte da América do Sul cisandina (Hoyo *et al.*, 1996).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *L. v. viridis* (Novaes, 1957; Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1996).

Status

Residente.



Fabrice Schmitt



Bertrando Campos



Registros
Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MZUSP 42175); Rio Juruá, Localidade Nossa Senhora Aparecida (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52882, 52883); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008).
Habitat
Margens de açudes e lagos, FOA aluvial.
Distribuição Geográfica
Na Amazônia, da Colômbia até o Peru e no noroeste do Brasil (Pinto, 1978; Hoyo <i>et al.</i> , 1996; Sick, 1997).
Taxonomia
Espécie monotípica (Hoyo <i>et al.</i> , 1996).
Status
Residente.

Registros
Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney <i>et al.</i> , n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002); BR-364 a 40 Km da ponte sobre o Rio Liberdade, margem direita (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60441); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 61390); Estrada Transacreaana (AC-090) Km 60, margem direita (Guilherme, E., MPEG 61391); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64417); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63678); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão (Dantas, n. p. - 2010); Foz do Rio Jurupari (Aleixo <i>et al.</i> , n. p. - 2010); Rio Jurupari, localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo <i>et al.</i> , n. p. - 2010); Município de Assis Brasil, Estrada da Pedreira, Localidade Museu (Aleixo, A.; Guilherme, E. & Whittaker, A., MPEG 70049); Município de Rio Branco, <i>Campus</i> da Ufac (Guilherme, E., AC 658).
Habitat
Margens de rios, açudes e lagos, FOA aluvial.
Distribuição Geográfica
América do Sul cisandina, desde o Suriname até o Uruguai (Hoyo <i>et al.</i> , 1996).
Taxonomia
São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é, provavelmente, a <i>Laterallus m. oenops</i> (Hoyo <i>et al.</i> , 1996).
Status
Residente.



Silvia Faustino Linhares



Registros

Rio Juruá, Localidade Nossa Senhora Aparecida (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52880, 52881); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); *Campus* da Ufac, Rio Branco (Guilherme, E., AC 141, 429); Floresta Estadual do Rio Gregório, próximo à ponte sobre o Rio Acuraua (Guilherme, 2007, MPEG 60442); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63612); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008).

Habitat

América Central (Guatemala) e norte da América do Sul. No Brasil, ocorre na Amazônia e em alguns estados do Nordeste (Pernambuco) (Hoyo *et al.*, 1996; Sick, 1997).

Distribuição Geográfica

Do México até a Bolívia e em toda a Amazônia (Hoyo *et al.*, 1996).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1996).

Status

Residente.



Ciro Albano



Registros

Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002).

Habitat

Margens de lagos e açudes, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Da Colômbia até a Argentina. Esta espécie é encontrada pontualmente no Brasil (Hoyo *et al.*, 1996; Sick, 1997).

Taxonomia

Duas subespécies são reconhecidas. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *N. e. olivascens* (Hoyo *et al.*, 1996).

Status

Residente.



Bertrando Campos



Celso B. Almeida

**Registros**Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002, Suplemento).**Habitat**

Margens de rios, açudes e lagos (provável).

Distribuição GeográficaDo sudoeste da Colômbia até o norte da Bolívia. Ocorre, também, no Brasil, Paraguai e nordeste da Argentina (Hoyo *et al.*, 1996).**Taxonomia**

Ver Comentários.

Status

Ver Comentários.

Comentários

(*) Este registro precisa de confirmação (Guilherme, 2009; 2012).

RegistrosReserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002, Suplemento); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão (Dantas, n. p. - 2010); arredores do Aeroporto de Rio Branco (Kaseker, E. P, 2011 [Wikiaves - WA432389]); Município de Xapuri (Nemetz, U., 2013 [Wikiaves - WA933847]).**Habitat**

Margens de rios, açudes e lagos.

Distribuição GeográficaParte da América do Norte, América Central e América do Sul (Hoyo *et al.*, 1996; Sick, 1997).**Taxonomia**Sete subespécies são reconhecidas. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *G. g. galeata* (Hoyo *et al.*, 1996).**Status**

Residente.

ComentáriosEm Whittaker *et al.*, (2002, Suplemento) esta espécie é citada como *Gallinula chloropus*.



Edson Guilherme



Ciro Albano



Registros

Parque Zoobotânico e *Campus* da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; MPEG 59902, 59903, 59904, 59905; AC 0027, 0048, 0155, 0168, 0181, 0418, 0678); Reserva Humaitá – Ufac (Guilherme, E., MPEG 59901); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., obs. pess.); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., obs. pess.); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

Margens de rios, açudes e lagos, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Dos sul dos Estados Unidos à Argentina e em todo o Brasil (Hoyo *et al.*, 1996; Sick, 1997).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1996).

Status

Residente.

Nome anterior

Porphyrio martinica.

Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002, Suplemento).

Habitat

Margens de rios, açudes e lagos (provável).

Distribuição Geográfica

Das Guianas até a Argentina e, em quase toda a Amazônia brasileira (Hoyo *et al.*, 1996; Sick, 1997).

Taxonomia

Ver Comentários.


Status

Ver Comentários.


Comentários

(*) Este registro precisa de confirmação (Guilherme, 2009; 2012).


picaparra – *Heliornis fulica* (Boddaert, 1783)
Sungrebe



Margi Moss



batuira-de-esporão – *Vanellus cayanus* (Latham, 1790)
Pied Lapwing



Edson Guilherme



Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., obs. pess.); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011); *Campus* e Parque Zoológico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, E. obs. Pess.; Mesquita, R. P., 2012 [Wikiaves - WA782562]); arredores da cidade de Senador Guimard (Guilherme, E., 2014 [Wikiaves -WA1460446]).

Habitat

Rios, açudes e lagos, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Do sudeste do México ao nordeste da Argentina (Hoyo *et al.*, 1996).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1996).

Status

Residente.

Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 14064); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Rio Liberdade, margem direita, próximo à Foz do Igarapé Novena (Guilherme, 2007, MPEG 60443); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63613); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63248); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63679, 63680); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão (Dantas, n. p. - 2010); Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Jurupari, localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010).

Habitat

Praias arenosas de rios, margens de açudes e lagos.

Distribuição Geográfica

América do Sul cisandina, desde a Colômbia até o nordeste da Argentina.

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1996).

Status

Residente.


Comentários

Espécie bastante comum em todo o estado do Acre. Durante a época seca, pode ser vista nas praias arenosas de praticamente todos os rios do Estado. Na época chuvosa, quando as margens dos rios estão submersas, migra para áreas mais altas, podendo ser vista nas pastagens e nas margens de açudes das fazendas e colônias da região.

quero-quero – *Vanellus chilensis* (Molina, 1782)
Southern Lapwing



Edson Guilherme



batuiruçu – *Pluvialis dominica* (Statius Muller, 1776)
American Golden-Plover



Robson Czaban



Registros

BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 61513); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., & Santos, M. P. D., MPEG 61225); Floresta Estadual do Antimary, Localidade Limoeiro (Guilherme, E., obs. pess.); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., obs. pess.); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Jurupari, Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); *Campus* da Ufac, Rio Branco (Lima, J. M., 2012 [Wikiaves - WA851260]); arredores de Cruzeiro do Sul (Rodrigues, E. T., 2014 [Wikiaves - WA1454108]).

Habitat

Área aberta com pastagem, margens de açudes e lagos, praias arenosas de rios.

Distribuição Geográfica

Da América Central ao sul da Argentina e, em todo o Brasil (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1996; Sick, 1997).

Taxonomia

São reconhecidas quatro subespécies. A forma que ocorre no Acre parece ser a *V. c. lampronotus* (Hoyo *et al.*, 1996).

Status

Residente.

Comentários

Trata-se de uma espécie recém-chegada à região e que, aos poucos, vem colonizando as áreas abertas (*e.g.*, as pastagens) e as margens dos rios do Estado (Guilherme & Czaban, 2015).

Registros

Município de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954 MZUSP 35569); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Freitas, M. A., 2011 [Wikiaves - WA663312]).

Habitat

Praias arenosas de rios.

Distribuição Geográfica

No Alasca e no Canadá (no Ártico). Migra para América do Sul durante o inverno setentrional (Hoyo *et al.*, 1996; Sick, 1997).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1996).

Status

Residente.

batuíra-de-coleira – *Charadrius collaris* Vieillot, 1818
Collared Plover



Robson Czaban



Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 14016); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); *Campus* da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63249, 63250); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão (Dantas, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

Praias arenosas de rios, margens de açudes e lagos, poças d'água em terra-firme.

Distribuição Geográfica

Do México ao Chile e Argentina (Hoyo *et al.*, 1996; Sick, 1997).

Taxonomia

São reconhecidas quatro subespécies. A forma que ocorre no Acre parece ser a *V. c. lampronotus* (Hoyo *et al.*, 1996).

Status

Residente.

pernilongo-de-costas-negras – *Himantopus mexicanus* (Statius Muller, 1776)
Black-necked Stilt

Henrique Moreira



Registros

Arredores da cidade de Rio Branco, Estrada do Panorama, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E. 2015 [Wikiaves - WA1743344]).

Habitat

Praias arenosas de rios, margens de açudes e lagos.

Distribuição Geográfica

América do Norte (USA), América Central, e norte da América do Sul na Colômbia, Venezuela, Equador (inclusive Ilhas Galápagos) sudoeste do Peru e norte do Brasil. Ocorre em quase todo Norte, Nordeste e Sudeste do Brasil com exceção da Região Sul, onde é substituída pela congênera *H. melanurus*.

Taxonomia

É considerada por alguns autores como subespécies de *H. himantopus* (Hoyo *et al.*, 1996).

Status

Migrante intratropical (provável).

narceja – *Gallinago paraguayiae* (Vieillot, 1816)
South American Snipe



Tancredo Maia Filho



Registros

Campus da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002, Suplemento); arredores do Aeroporto Internacional de Rio Branco (Mendizabal, S. I., 2014 [Wikiaves - WA1471636]); arredores da cidade de Rio Branco, Estrada do Panorama, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E. 2015 [Wikiaves - WA1745258]).

Habitat

Praias arenosas de rios, poças d'água em terra-firme, margens de açudes e lagos.

Distribuição Geográfica

Em quase toda a América do Sul (Hoyo *et al.*, 1996; Sick, 1997). Esta é uma espécie vinda do sul do continente e só aparece no Acre, sazonalmente, durante o inverno austral.

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *G. p. paraguayiae* (Hoyo *et al.*, 1996).

Status

Migrante austral.

maçarico-do-campo – *Bartramia longicauda* (Bechstein, 1812)
Upland Sandpiper



Emerson Kaseker



Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002, Suplemento); Cruzeiro do Sul, Rio Juruá (Rodrigues, M. A., 2014 [Wikiaves - WA1537287]).

Habitat

Área aberta com pastagem (provável), praias arenosas de rios.

Distribuição Geográfica

América do Norte. Migra para América do Sul durante o inverno setentrional (Hoyo *et al.*, 1996; Sick, 1997).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1996).


Status

Migrante neártica.

maçarico-pintado – *Actitis macularius* (Linnaeus, 1766)
Spotted Sandpiper



Robson Czaban



maçarico-solitário – *Tringa solitaria* Wilson, 1813
Solitary Sandpiper



Edson Guilherme



Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 14028); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 48037); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010; Guilherme & Aleixo, 2011; MPEG 59770); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63681).

Habitat

Praias arenosas de rios, margens de açudes e lagos.

Distribuição Geográfica

Centro-norte da América do Norte. Migra para o sul dos EUA, América Central e América do Sul durante o inverno setentrional (Hoyo *et al.*, 1996; Sick, 1997).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1996).

Status

Migrante neártica.

Registros

Arredores da cidade de Rio Branco (Pinto & Camargo, 1954); Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 14025, 14026); *Campus* da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); BR-364, Seringal Sardinha (Guilherme, E., MPEG 61475); Estrada Transacraana (AC-090) Km 60, margem esquerda (Guilherme, E., MPEG 61392); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 61979); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63252); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64418).

Habitat

Praias arenosas de rios, margens de lagos e açudes, poças d'água em terra-firme.

Distribuição Geográfica

Norte da América do Norte (Alaska, Canadá e EUA). Migra para o sul dos EUA, América Central e América do Sul durante o inverno setentrional (Hoyo *et al.*, 1996; Sick, 1997).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma coletada no Acre é a *T. s. solitaria* (Pinto & Camargo, 1954; Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 1996).

Status

Migrante neártica.

maçarico-grande-de-perna-amarela – *Tringa melanoleuca* (Gmelin, 1789)

Greater Yellowlegs



Robson Czaban



Peru

Bolivia

RegistrosReserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002).**Habitat**

Praias arenosas de rios.

Distribuição GeográficaNorte da América do Norte (Alaska, Canadá e nordeste dos EUA). Migra para a América Central e América do Sul durante o inverno setentrional (Hoyo *et al.*, 1996; Sick, 1997).**Taxonomia**Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1996).**Status**

Migrante neártica.

maçarico-de-perna-amarela – *Tringa flavipes* (Gmelin, 1789)

Lesser Yellowlegs



Robson Czaban



Peru

Bolivia

RegistrosArredores da cidade de Rio Branco (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35577, 35578); Município de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35579); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Estrada Transacreaana (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61222); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2007; 2011); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); *Campus* da Ufac, Rio Branco (Guilherme, E., 2015 [Wikiaves - WA1811867]).**Habitat**

Praias arenosas de rios, margens de lagos e açudes, poças d'água em terra-firme.

Distribuição GeográficaNorte da América do Norte (Alaska, Canadá e EUA). Migra para o sul dos EUA, América Central e América do Sul durante o inverno setentrional (Hoyo *et al.*, 1996; Sick, 1997).**Taxonomia**Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1996).**Status**

Migrante neártica.

maçariquinho – *Calidris minutilla* (Vieillot, 1819)
Least Sandpiper



Robson Czaban



maçarico-de-sobre-branco – *Calidris fuscicollis* (Vieillot, 1819)
White-rumped Sandpiper



Emerson Kaseker



Registros
Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002).
Habitat
Praias arenosas de rios, margens de açudes e lagos.
Distribuição Geográfica
Centro-norte da América do Norte. Migra para o sul dos EUA, América Central e centro-norte da América do Sul durante o inverno setentrional (Hoyo <i>et al.</i> , 1996; Sick, 1997).
Taxonomia
Espécie monotípica (Hoyo <i>et al.</i> , 1996).
Status
Migrante neártica.

Registros
Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002, Suplemento); Município de Manoel Urbano, Rio Purus (Guilherme, E. 2013 [Wikiaves - WA1081598]); Crozariol, M. A., Melo, T. N. e Leite, G., MNRJ 49520, 49521).
Habitat
Praias arenosas de rios, margens de açudes e lagos.
Distribuição Geográfica
Extremo norte da América do Norte. Migra para a América do Sul durante o inverno setentrional (Hoyo <i>et al.</i> , 1996).
Taxonomia
Espécie monotípica (Hoyo <i>et al.</i> , 1996).
Status
Migrante neártica.

maçarico-de-bico-fino – *Calidris bairdii* (Coues, 1861)

Baird's Sandpiper



Celso B. Almeida



Registros
Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002).
Habitat
Praias arenosas de rios.
Distribuição Geográfica
Extremo norte da América do Norte. Migra para o oeste da América do Sul durante o inverno setentrional (Hoyo <i>et al.</i> , 1996).
Taxonomia
Espécie monotípica (Hoyo <i>et al.</i> , 1996).
Status
Migrante neártica.

maçarico-de-colete – *Calidris melanotos* (Vieillot, 1819)

Pectoral Sandpiper



Robson Czaban



Registros
Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35576); arredores da cidade de Rio Branco (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35573, 35574, 35575); arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35570, 35571, 35572); Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG {14058 = MZUSP 42198}, 14059, 14060, 14061); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., & Santos, M. P. D., MPEG 61223, 61224); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63251).
Habitat
Praias arenosas de rios, margens de açudes e lagos.
Distribuição Geográfica
Extremo norte da América do Norte e nordeste da Ásia (Sibéria). Migra para a América do Sul, Austrália e Nova Zelândia durante o inverno setentrional (Hoyo <i>et al.</i> , 1996).
Taxonomia
Espécie monotípica (Hoyo <i>et al.</i> , 1996).
Status
Migrante neártica.
Comentários
Em publicações mais antigas como, por exemplo, em Pinto & Camargo (1954) e Novaes (1957) esta espécie foi atribuída ao Gênero <i>Erolia</i> .

maçarico-pernilongo – *Calidris himantopus* (Bonaparte, 1826)
Stilt Sandpiper



Emerson Kaseker



maçarico-acanelado – *Calidris subruficollis* (Vieillot, 1819)
Buff-breasted Sandpiper



Robson Czaban



Registros
Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002).
Habitat
Praias arenosas de rios, margens de açudes e lagos.
Distribuição Geográfica
Extremo norte da América do Norte (Alaska). Migra para América do Sul durante o inverno setentrional (Hoyo <i>et al.</i> , 1996).
Taxonomia
Espécie monotípica (Hoyo <i>et al.</i> , 1996).
Status
Migrante neártica.

Registros
Arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35580); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002).
Habitat
Praias arenosas de rios, margens de açudes e lagos.
Distribuição Geográfica
Extremo norte da América do Norte e nordeste da Ásia (Sibéria). Migra para a América do Sul durante o inverno setentrional (Hoyo <i>et al.</i> , 1996).
Taxonomia
Espécie monotípica (Hoyo <i>et al.</i> , 1996).
Status
Migrante neártica.
Nome anterior
<i>Tryngites subruficollis</i> .


pisa-n'água – *Phalaropus tricolor* (Vieillot, 1819)
Wilson's Phalarope




Emerson Kaseker



jaçanã – *Jacana jacana* (Linnaeus, 1766)
Wattel Jacana



Edson Guilherme



Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002).

Habitat

Praias arenosas de rios, margens de açudes e lagos.

Distribuição Geográfica

Centro-norte da América do Norte. Migra para América do Sul durante o inverno setentrional (Hoyo *et al.*, 1996).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1996).

Status

Migrante neártica.

Registros

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35565, 35566, 35567, 35568); Parque Zoobotânico e *Campus* da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 61978); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63621); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64345); Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Jurupari, Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

Margens de rios, açudes e lagos; FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

América do Sul cisandina e em todo o Brasil (Hoyo *et al.*, 1996; Sick, 1997).

Taxonomia

São reconhecidas seis subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *J. j. jacana* (Pinto & Camargo, 1954; Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1996).

Status

Residente.

Comentários

Em Pinto & Camargo (1954) este táxon foi nominado como *Jacana spinosa jacana*.



Robson Czaban



Robson Czaban



Registros
Arredores da cidade de Cruzeiro do Sul (Whittaker & Oren, 1999).
Habitat
Praias arenosas de rios.
Distribuição Geográfica
Ocorre no litoral sul da América do Norte, na América Central e na América do Sul (Hoyo <i>et al.</i> , 1996).
Taxonomia
Dois subespécies são reconhecidas. A forma que foi registrada no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a <i>L. a. atricilla</i> (Hoyo <i>et al.</i> , 1996).
Status
Migrante neártica.
Nome anterior
<i>Larus atricilla</i> .

Registros
Rio Juruá, Localidade São Salvador, próximo à Foz do Rio Grajaú (Novaes, 1957, MPEG 27404); Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 27403); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011).
Habitat
Rios e praias fluviais arenosas.
Distribuição Geográfica
América do Sul cisandina (Hoyo <i>et al.</i> , 1996).
Taxonomia
Espécie monotípica (Hoyo <i>et al.</i> , 1996).
Status
Residente.

Sternidae **trinta-réis-grande** – *Phaetusa simplex* (Gmelin, 1789)
Larg-billed Tern



Robson Czaban



Rynchopidae **talha-mar** – *Rynchops niger* Linnaeus, 1758
Black Skimmer



Marco Guedes



Registros
Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011).
Habitat
Rios e praias fluviais arenosas.
Distribuição Geográfica
América do Sul cisandina (Hoyo <i>et al.</i> , 1996).
Taxonomia
Duas subespécies são reconhecidas. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a <i>P. s. simplex</i> (Hoyo <i>et al.</i> , 1996).
Status
Residente.

Registros
Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63247).
Habitat
Rios e praias fluviais arenosas.
Distribuição Geográfica
Sul da América do Norte e, em toda a América Central e América do Sul (Hoyo <i>et al.</i> , 1996).
Taxonomia
São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é a <i>R. n. cinerascens</i> (Pinto, 1978; Hoyo <i>et al.</i> , 1996).
Status
Residente.

rolinha-de-asa-canela – *Columbina minuta* (Linnaeus, 1766)

Plain-breasted Ground-Dove



Bertrando Campos

Macho



Registros
<i>Campus</i> da Ufac, Rio Branco (Santos, F. G. A., AC 0755).
Habitat
Área aberta.
Distribuição Geográfica
Da América Central (México) até a Argentina. Ocorre em quase todo o Brasil (Hoyo <i>et al.</i> , 1997).
Taxonomia
São reconhecidas quatro subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a <i>C. m. minuta</i> (Hoyo <i>et al.</i> , 1997).
Status
Residente (provável). É possível que esteja ampliando sua área de ocorrência na Amazônia a partir da colonização de áreas desmatadas (<i>e.g.</i> , pastagens, roçados, ambientes urbanos).


rolinha-roxa – *Columbina talpacoti* (Temminck, 1811)

Ruddy Ground-Dove



Edson Guilherme

Macho



Registros
Arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954); Parque Zoobotânico e <i>Campus</i> da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; AC 0261, 0767, 0784, 0805); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney <i>et al.</i> , n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen <i>et al.</i> , 2005); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60444, 60908; Silva <i>et al.</i> , 2015; Marques, 2015); Estrada Transacrea (AC-090) Km 60, margem esquerda (Guilherme, E., MPEG 61393); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61219); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre <i>et al.</i> 2010); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63682); Município de Jordão, Localidade Manaus e arredores da cidade de Jordão (Dantas, n. p. - 2010); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 61982); Foz do Rio Jurupari (Aleixo <i>et al.</i> , n. p. - 2010); Rio Jurupari localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo e Guilherme, n. p.); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme <i>et al.</i> , n. p. - 2013); Cruzeiro do Sul, BR-307, Estrada da Variante (Pinheiro & Turci, 2013); Rio Branco, Bairro Joafra (Doação IBAMA/CETAS; AC 798).
Habitat
Área aberta com cultivares ou pastagens, borda de FOA com palmeiras, borda de FOA aluvial, ambientes urbanos.
Distribuição Geográfica
Do México até a Argentina e em todo o Brasil (Hoyo <i>et al.</i> , 1997; Sick, 1997).
Taxonomia
São reconhecidas quatro subespécies. A forma que ocorre no Acre é <i>C. t. talpacoti</i> (Pinto & Camargo, 1954; Pinto, 1978; Hoyo <i>et al.</i> , 1997).
Status
Residente.
Comentários
Espécie muito comum em todo o estado do Acre. Pode ser encontrada em qualquer área aberta, em roçados, inclusive em ambientes urbanos. Espécie nominada em Pinto & Camargo (1954) como <i>Columbigallina talpacoti</i> .

rolinha-picuí – *Columbina picui* (Temminck, 1813)
Picui Ground-Dove



Bertrando Campos



Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002, Suplemento); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., obs. pess.); Município de Xapuri (Melo, M. A., 2013 [Wikiaves - WA1006463]).

Habitat

Área aberta com pastagens ou cultivares, borda de FOA com palmeiras.

Distribuição Geográfica

Do nordeste do Brasil ao Chile e Argentina (Hoyo *et al.*, 1997).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *C. p. picui* (Hoyo *et al.*, 1997).

Status

Migrante intratropical (vinda do sul).

pararu-azul – *Claravis pretiosa* (Ferrari-Perez, 1886)
Blue Ground-Dove



Margi Moss



Registros

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35582, 35583, 35584); arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35585); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002, Suplemento); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras, FOD.

Distribuição Geográfica

Do México até a Argentina e em todo o Brasil (Hoyo *et al.*, 1997; Sick, 1997).


Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1997).

Status

Residente.

pomba-trocal – *Patagioenas speciosa* (Gmelin, 1789)
Scaled Pigeon



Robson Czaban



Registros

Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Município de Xapuri (Melo, M. A, 2013 [Wikiaves - WA1004882]); Município de Mâncio Lima, campinarana no Alto Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

Campinaranas, campinas, borda de mata de terra-firme.

Distribuição Geográfica

Do México até a Argentina e em quase todo o Brasil (Hoyo *et al.*, 1997; Sick, 1997).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1997).

Status

Residente.

pomba-galega – *Patagioenas cayennensis* (Bonaparte, 1792)
Pale-vented Pigeon



Emerson Kaseker



Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 53966); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Do México ao Uruguai e em todo o Brasil (Hoyo *et al.*, 1997; Sick, 1997).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *P. c. sylvestris* (Hoyo *et al.*, 1997).

Status

Residente.

pomba-amargosa – *Patagioenas plumbea* (Vieillot, 1818)
Plumbeous Pigeon




Henrique Moreira



pomba-botafogo – *Patagioenas subvinacea* (Lawrence, 1868)
Ruddy Pigeon



Sílvia Faustino Linhares



Registros

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35581); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 48038); arredores da cidade de Assis Brasil (Guilherme, 2004); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 58823); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 61983); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63473); Município de Jordão, localidades Távora, Pará, Manaus e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63253); Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Jurupari, localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo e Guilherme, n. p.); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

Desde a Colômbia até o Paraguai e em quase todo o Brasil (Hoyo *et al.*, 1997; Sick, 1997).

Taxonomia

São reconhecidas cinco subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *P. p. pallescens* (Pinto & Camargo, 1954; Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1997).

Status

Residente.

Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); arredores da cidade de Assis Brasil (Guilherme, E., MPEG 61486); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Rio Branco; ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Jordão, localidades Távora, Pará, Manaus e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Jurupari localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo e Guilherme, n. p.); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

Do Panamá até a Bolívia e, em toda a Amazônia brasileira (Hoyo *et al.*, 1997; Sick, 1997).

Taxonomia

São reconhecidas seis subespécies. A forma que ocorre no Acre é *P. s. bogotensis* (Hoyo *et al.*, 1997).


Status

Residente.

juriti-pupu – *Leptotila verreauxi* Bonaparte, 1855
White-tipped Dove



Emerson Kaseker



juriti-gemeadeira – *Leptotila rufaxilla* (Richard & Bernard, 1792)
Gray-frontal Dove



Edson Guilherme



Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 76385, 76386); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Município de Jordão, localidades Távora, Pará, Manaus e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 61987); Município de Mâncio Lima, Estrada do Barão, Comunidade São Domingos (Guilherme, E., MPEG 61986); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64407); Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Assis Brasil, Estrada da Pedreira, Localidade Museu (Guilherme, E., MPEG 70899); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Parque Zoológico e *Campus* da Ufac, Rio Branco (Guilherme, E. obs. pess.); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, campinas, campinaranas, área aberta com cultivares.

Distribuição Geográfica

Do sul dos Estados Unidos até a Argentina e em quase todo o Brasil (Hoyo *et al.*, 1997; Sick, 1997).

Taxonomia

São reconhecidas 14 subespécies. A forma que ocorre no Acre e a *L. v. decipiens* (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1997).

Status

Residente.

Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 14141, 14142); Município de Porto Walter, Igarapé São Luiz (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52539); Parque Zoológico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; AC 275, 378, 772); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60445, 60446; Silva *et al.*, 2015); Floresta Estadual do Antimary, Localidade Limoeiro e Ramal Uirapuru (Guilherme, E., MPEG 60449); Rio Liberdade, margem direita, próximo à Foz do Igarapé Novena (Guilherme, 2007, MPEG 60447, 60450); BR-364 a 40 Km da ponte sobre o Rio Liberdade, margem direita (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, E., MPEG 60448); Estrada Transacrea (AC-090) Km 60, margem esquerda (Guilherme, E., MPEG 61394); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61220, 61221); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010 MPEG 58824, 59766, 59767); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 61985); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63622; 63623); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme, & Dantas, 2011, MPEG 63254); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63683); Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Jurupari Localidade Humaitá (Aleixo e Guilherme, n. p.); Município de Assis Brasil, Estrada da Pedreira, Localidade Museu (Guilherme, E., MPEG 70900); Município de Senador Guiomard, Localidade Bonal (Guilherme, E. & Marques, E. L., AC 317); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Município de Plácido de Castro, BR-364, Ramal do 45 (Marques, 2015).

juriti-gemeadeira – *Leptotila rufaxilla* (Richard & Bernard, 1792)

Gray-frontal Dove

Habitat
FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, campinarana, área aberta com cultivares.
Distribuição Geográfica
Da Venezuela ao Uruguai e em quase todo o Brasil (Hoyo <i>et al.</i> , 1997; Sick, 1997).
Taxonomia
São reconhecidas seis subespécies. A forma que ocorre no Acre é a <i>L. r. dubusi</i> (Pinto, 1978; Hoyo <i>et al.</i> , 1997).
Status
Residente.

pariri – *Geotrygon montana* (Linnaeus, 1758)

Ruddy Quail-Dove



Sílvia Faustino Linhares



Fêmea

Registros

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35586); Rio Juruá, arredores de Cruzeiro do Sul (Novaes, 1957, 1958, MPEG 27507); Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, 1958, MPEG 27509); Rio Tejo, margem esquerda, a aproximadamente 5 Km da foz (Whittaker *et al.*, 2002; MPEG 52017); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52018); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48042, 48043); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A., MPEG 48039, 48040, 48041); Parque Zoobotânico e *Campus* da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; AC 025, 0125, 0166, 0178, 0329); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005, Guilherme, E., MPEG 59910, 61523); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010 MPEG 59768, 59769); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal (Guilherme, E., MPEG 59906, 59907, 59908, 59909); Floresta Estadual do Antimary, Ramal Uirapuru (Guilherme, E., MPEG 60451); Rio Liberdade, margem direita, próximo à Foz do Igarapé Novena (Guilherme, 2007, MPEG 60453); BR-364 a 40 Km da ponte sobre o Rio Liberdade, margem direita (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, E., MPEG 60452); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 61984); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63255); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64346); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63684); Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, campinarana.

Distribuição GeográficaDo México e Ilhas do Caribe até a Argentina. Ocorre em quase todo o Brasil (Hoyo *et al.*, 1997; Sick, 1997).**Taxonomia**São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *G. m. montana* (Pinto & Camargo, 1954; Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1997).**Status**


Residente.

ComentáriosEm Pinto & Camargo (1954) e Novaes (1957) esta espécie foi nominada como *Oreopeleia montana*.

cigana – *Opisthocomus hoazin* (Statius Muller, 1776)
Hoatzin



Margi Moss



Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); arredores da cidade de Assis Brasil (Guilherme, 2004, AC 0071); BR-364, Seringal Sardinha (Guilherme, E., obs. pess.); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 59832); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Floresta Estadual do Antimary, Localidade Limoeiro (Guilherme, E., obs. pess.); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63697, 63698); Município de Santa Rosa do Purus, Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); arredores da cidade de Xapurii, Ramal do Beleza (Guilheme, E. obs. pess.).

Habitat

FOA aluvial, margem de rios, açudes e lagos.

Distribuição Geográfica

Em toda a Amazônia. No Brasil, pode ser encontrada também no Tocantins, em parte do Piauí e no Maranhão (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1997; Sick, 1997).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1997).


Status

Residente.

chincoã-pequeno – *Coccyua minuta* (Vieillot, 1817)
Little Cuckoo



Bertrando Campos



Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; AC 433); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 63630, 63482); Município de Santa Rosa do Purus, Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas 2011, MPEG 63286); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64518); Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Assis Brasil, Estrada da Pedreira, Localidade Museu (Guilherme, E., MPEG 70898); Município de Senador Guimard, Localidade Bonal (Guilherme, E. & Souza, G. AC 545); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Silva *et al.*, 2015); Município de Plácido de Castro, BR-364, Ramal do 45 (Marques, 2015); Município de Rio Branco, Estrada da Piçarreira (Marques, 2015).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

América do Sul cisandina, da Colômbia ao Peru. Ocorre no Brasil amazônico e central (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1997; Sick, 1997).

Taxonomia

São reconhecidas quatro subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *C. m. minuta* (Hoyo *et al.*, 1997).

Status

Residente.

Nome anterior

Piaya minuta.

papa-lagarta-cinzento – *Micrococcyx cinereus* (Vieillot, 1817)
Ash-colored Cuckoo




Silvia Faustino Linhares



alma-de-gato – *Piaya cayana* (Linnaeus, 1766)
Squirrel Cuckoo

Edson Guilherme



Registros

Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63485).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Do norte da Argentina até a Bolívia. Ocorre nas regiões Sul e Central do Brasil. Na Amazônia é considerada como migrante austral e só foi registrada pontualmente (Hoyo *et al.*, 1997; Sick, 1997).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1997).

Status

Migrante austral.

Registros

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35587); arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35588, 35589); Rio Juruá, margem direita, arredores de Cruzeiro do Sul (Novaes, 1957, MPEG 40694); Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 40693); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whittaker *et al.*, n. p. - 1997); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 52023); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 48048); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 76383); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005, Guilherme, E., MPEG 59911); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Município de Santa Rosa do Purus, Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Floresta Estadual do Antimary, Localidade Limoeiro (Guilherme, E., MPEG 60461); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 63483); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., AC, 186; MPEG 63484, 64562); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64531); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64433); Rio Jurupari, localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, localidades Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD.

Distribuição Geográfica

Do México até a Argentina e em todo o Brasil (Hoyo *et al.*, 1997; Sick, 1997).

Taxonomia

São reconhecidas 14 subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *P. c. obscura* (Pinto & Camargo, 1954; Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1997).


Status

Residente.

chincoã-de-bico-vermelho – *Piaya melanogaster* (Vieillot, 1817)
Black-bellied Cucko



Celso B. Almeida



Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, 1958, MPEG 35828); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Rio Juruá, margem direita, Localidade Mato Grosso (Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 52024); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60462); Município de Santa Rosa do Purus, Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63258); Rio Jurupari, foz e Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, Localidade Manaus (Dantas, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Em toda a Amazônia (Hoyo *et al.*, 1997; Sick, 1997).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1997).

Status

Residente.

papa-lagarta-acanelado – *Coccyzus melacoryphus* Vieillot, 1817
Dark-biller Cucko



Robson Czaban



Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 40689); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Floresta Estadual do Rio Gregório, próximo à ponte sobre o Rio Acuraua (Guilherme, 2007, MPEG 60460); Município de Santa Rosa do Purus, Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Município de Assis Brasil, Estrada da Pedreira, Localidade Museu (Guilherme, E., MPEG 70903); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão (Dantas, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); *Campus* da Universidade Federal do Acre (Guilherme, E. 2015 [Wikiaves - WA1730817]).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Do norte da América do Sul até a Argentina e em todo o Brasil (Hoyo *et al.*, 1997; Sick, 1997).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1997).

Status

Residente.

papa-lagarta-de-asa-vermelha – *Coccyzus americanus* (Linnaeus, 1758)
Yellow-billed Cuckoo



Ciro Albano



Registros
Município de Rio Branco, área rural (Melo-Sampaio, P. R. 2013. [Wikiaves - WA1149979]).
Habitat
Área aberta com pastagem.
Distribuição Geográfica
Sudeste do Canadá e dos Estados Unidos. Ocorre, também, no México e nas Antilhas. Migram para a América do Sul durante o inverno boreal (Hoyo <i>et al.</i> , 1997).
Taxonomia
Espécie monotípica (Hoyo <i>et al.</i> , 1997).
Status
Migrante neártica.

papa-lagarta-de-euler – *Coccyzus euleri* Cabanis, 1873
Pearly-breasted Cuckoo



Robson Czaban



Registros
Município de Rio Branco, Estrada Transacreeana, Ramal do Noca (Carvalho, G. 2015. [Wikiaves - WA1938249]).
Habitat
FOA com palmeiras, área aberta (provável).
Distribuição Geográfica
Ocorre do Panamá (América Central) em direção ao sudeste da América do Sul, incluindo a Colômbia, Venezuela, Guianas, Suriname, Brasil, nordeste da Bolívia, leste do Paraguai e nordeste da Argentina (Hoyo <i>et al.</i> , 1997).
Taxonomia
Espécie monotípica (Hoyo <i>et al.</i> , 1997).
Status
O <i>status</i> desta espécie no Acre é incerto. O único indivíduo registrado pode ser um migrante intratropical ou pode estar ampliando a sua distribuição geográfica em direção ao oeste da América do Sul.

papa-lagarta-de-bico-preto – *Coccyzus erythrophthalmus* (Wilson, 1811)

Black-billed Cuckoo



Laura Erickson

**anu-coroça** – *Crotophaga major* Gmelin, 1788

Greater Ani



Celso B. Almeida

**Registros**

Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker & Oren, 1999, MPEG 48047).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus.

Distribuição GeográficaAmérica do Norte. Migra para a América do Sul durante o inverno setentrional (Hoyo *et al.*, 1997; Sick, 1997).**Taxonomia**Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1997).**Status**

Migrante neártica.

Registros

Rio Juruá, arredores de Cruzeiro do Sul (Novaes, 1957, 1958, MPEG 27661, 27665); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001, AC 383); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Município de Santa Rosa do Purus, Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62019, 62020); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63690); Rio Jurupari, foz e Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA aluvial, margem de lagos e açudes.


Distribuição GeográficaDo Panamá ao norte da Argentina (Hoyo *et al.*, 1997).**Taxonomia**Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1997).**Status**

Residente.

anu-preto – *Crotophaga ani* Linnaeus, 1758
Smooth-billed Ani



Edson Guilherme



saci – *Tapera naevia* (Linnaeus, 1766)
Striped Cuckoo



Robson Czaban



Registros

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35591); arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35590); Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 27536, 27539); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 76382); Parque Zoológico e *Campus* da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; AC 0097, 0412, 0431); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Município do Bujari, BR-364, Km 50 (Guilherme, E.; Rocha, H. N., AC 044); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Floresta Estadual do Antimary, Localidade Limoeiro (Guilherme, E., obs. pess.); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Município de Santa Rosa do Purus, Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62018); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 63481); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64410); Rio Jurupari, foz e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, arredores da cidade e Localidade Távora (Dantas, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Cruzeiro do Sul, BR-307, Estrada da Variante (Pinheiro & Turci, 2013).

Habitat

Área aberta com pastagem, borda de FOA com palmeiras, borda de FOA aluvial, margem de rios e igarapés, ambientes urbanos.

Distribuição Geográfica

Do sul da Flórida até a Argentina e em todo o Brasil (Hoyo *et al.*, 1997; Sick, 1997).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1997).

Status

Residente.

Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010).

Habitat

FOA com palmeiras, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Do México até a Argentina e em todo o Brasil (Hoyo *et al.*, 1997; Sick, 1997).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1997).

Status

Residente.

peixe-frito-verdadeiro – *Dromococcyx phasianellus* (Spix, 1824)


Pheasant Cuckoo



Emerson Kaseker

**peixe-frito-pavonino** – *Dromococcyx pavoninus* Pelzeln, 1870

Pavonine Cuckoo



Ciro Albano

**Registros**

Arredores da cidade de Plácido de Castro (Forrester, 1993, observada); Igarapé Preto, afluente do Rio Juruá-Mirim (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52941-penas); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61236, 61237).

Habitat

FOA com bambus, FOA aluvial com bambus.

Distribuição Geográfica

Do México até a Bolívia e Argentina. Ocorre localmente em todo o Brasil (Hoyo *et al.*, 1997; Sick, 1997).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1997).

Status

Residente.

Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002, Suplemento); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61235); Município de Santa Rosa do Purus, Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008).

Habitat

FOA com bambus, FOA aluvial com bambus.

Distribuição Geográfica

Desde as Guianas ao noroeste da Argentina. No Brasil, é encontrada desde a Amazônia até o estado do Paraná (Hoyo *et al.*, 1997; Sick, 1997); espécie associada às florestas com bambus no sudoeste amazônico (Stotz *et al.*, 1996).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1997).

Status

Residente.

jacu-estalo – *Neomorphus geoffroyi* (Temminck, 1820)
Rufous-vented Ground-Cuckoo



Tomaz Melo



Jovem

Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002). Parque Estadual Chandless (Borges, L. H., 2013 [Wikiaves - WA1036243]); Município de Feijó, Rio Jurupari (Melo, T. N., 2014 [Wikiaves - WA1380356]; Melo *et al.*, no prelo); Resex Alto Tarauacá (Melo *et al.*, no prelo).

Habitat

FOA com palmeiras.

Distribuição Geográfica

Da América Central até a Bolívia. No Brasil, ocorre em toda Amazônia, no Nordeste, no sudeste de Minas Gerais e no Espírito Santo (Hoyo *et al.*, 1997; Sick, 1997).

Taxonomia

São reconhecidas sete subespécies. A forma que ocorre no Acre deve ser, segundo a distribuição geográfica, a *N. g. australis* (Hoyo *et al.*, 1997).

Status

Residente.

coruja-da-igreja – *Tyto furcata* (Temminck, 1827)
American Barn Owl



Bertrando Campos



Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002, Suplemento); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); BR-317, próximo ao entroncamento que dá acesso à cidade de Xapuri (Guilherme, E., & Santos, M. P. D., MPEG 61245); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64430, 64431); Município de Santa Rosa do Purus, Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); arredores da cidade de Rio Branco (Doação IBAMA/CETAS; AC 782).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras, FOD, área aberta com pastagem, ambientes urbanos.

Distribuição Geográfica

Na região central da América do Norte, em toda a América Central e América do Sul, na Europa, na África, no sul da Ásia e na Oceania (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 1999).

Taxonomia

Táxon desmembrado do grupo *Tyto alba* do velho mundo devido às diferenças genéticas em relação às formas do novo mundo – clado *furcata* (Wink *et al.*, 2008; Nijman & Aliabadian, 2013; CBRO, 2014).

Status

Residente.

Nome anterior

Tyto alba.



Robson Czaban



Edson Guilherme

**Registros**

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Parque Zoobotânico e *Campus* da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; AC 0047); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Município de Santa Rosa do Purus, Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63259); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64353 BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64425); Rio Jurupari, foz e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, Localidade Manaus (Dantas, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, ambientes urbanos.

Distribuição Geográfica

Da Costa Rica até a Argentina e em todo o Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 1999).

Taxonomia

São reconhecidas nove subespécies (Hoyo *et al.*, 1999). A forma que ocorre no Acre é a *M. c. crucigerus* (Gyldenstolpe 1945b, 1951; Pinto 1978; Hoyo *et al.* 1999).

Status

Residente.

Nome anterior

Otus choliba.

Registros

Rio Juruá, Localidade São Salvador, próximo à Foz do Rio Grajaú (Novaes, 1957, MPEG 15998); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Parque Zoobotânico e *Campus* da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; Souza & Guilherme, 2013); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Floresta Estadual do Antimary, Localidade Limoeiro (Guilherme, E., MPEG 60463); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 61521); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Município de Jordão, localidades Távora, Manaus e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Município de Jordão, Localidade Belém (Dantas, n. p. - 2010, MPEG 71374, 71375, 71376, 71377, 71378); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 61994); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64426, 64427, 64587); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63691); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63692); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, campinarana, ambientes urbanos.

Distribuição Geográfica

Leste do Peru, norte da Bolívia e no Brasil oeste-setentrional (Hoyo *et al.*, 1999).

Taxonomia

Esta espécie foi, por algum tempo, considerada como uma subespécie de *M. watsonii* (Novaes, 1957; Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1999). No entanto, Heidrich *et al.* (1995), com base em estudos genéticos (gene citocromo b), recomendaram o reconhecimento de *M. usta* como espécie válida (CBRO, 2014).

Status



Residente.

Nome anterior


Otus watsonii.



Robson Czaban



Robson Czaban

**Registros**

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 15978); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Jordão, localidades Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Rio Jurupari, Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010).

Habitat

FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Da Venezuela até a Bolívia. No Brasil pode ser encontrada em toda a Amazônia (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 1999).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *L. c. cristata* (Novaes, 1957; Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1999).

Status

Residente.

Registros

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35610); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 76387); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Município de Jordão, localidades Pará, Veneza e Távora (Dantas, n. p. - 2010); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Rio Jurupari, Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Do México ao norte da Argentina e, em todo o Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 1999).

Taxonomia

São reconhecidas seis subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *P. p. perspicillata* (Pinto & Camargo, 1954; Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1999).

Status

Residente.



Ciro Albano



Jonatas Rocha





Registros
Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney <i>et al.</i> , n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Jordão, Localidade Pará (Dantas, n. p. - 2010, MPEG 71372); Município de Jordão, Localidade Veneza (Dantas, n. p. - 2010);
Habitat
FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD submontana.
Distribuição Geográfica
Do México ao norte da Argentina e em quase todo o Brasil (Hoyo <i>et al.</i> , 1999).
Taxonomia
São reconhecidas sete subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a <i>S. v. superviliaris</i> (Hoyo <i>et al.</i> , 1999).
Status
Residente.
Nome anterior
<i>Ciccaba virgata</i> (ver Hoyo <i>et al.</i> , 1999).


Registros
Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney <i>et al.</i> , n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002); Município de Jordão, Localidade Pará (Dantas, n. p. - 2010, MPEG 71373); Município de Jordão, Localidade Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Parque Capitão Ciriaco, cidade de Rio Branco (Peixoto, D. V., 2012 [Wikiaves – WA696380]); Reserva Humaitá – Ufac (Rondini, L. C., 2013 [Wikiaves - WA960060]); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rosa, R. D., 2013 [Wikiaves - WA1019737]).
Habitat
FOA com palmeiras, FOA aluvial.
Distribuição Geográfica
Da Venezuela até a Argentina e em todo o Brasil (Hoyo <i>et al.</i> , 1999).
Taxonomia
São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a <i>C. b. hubula</i> (Hoyo <i>et al.</i> , 1999).
Status
Residente.
Nome anterior
<i>Ciccaba hubula</i> (ver Hoyo <i>et al.</i> , 1999).



Robson Czaban



Robson Czaban



Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Município de Jordão, localidades Pará, Veneza e Távora (Dantas, n. p. - 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Melo, T. N., 2013 [Wikiaves - WA961132]); Município de Xapuri (Melo, M. A., 2013 [Wikiaves - WA1002731]); Reserva Humaitá – Ufac, setor norte (Silva *et al.*, 2015).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

América do Sul setentrional. Das Guianas até a Bolívia. No Brasil, ocorre na Amazônia (Hoyo *et al.*, 1999).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1999).

Status

Residente.

Registros

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35611); arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35612); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52542, 52543); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52025; Whittaker *et al.*, 2002); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 76388); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Floresta Estadual do Rio Gregório, próximo à ponte sobre o Rio Acuraua (Guilherme, 2007, MPEG 60464); Floresta Estadual do Antimary, Ramal Uirapuru (Guilherme, E., obs. pess.); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Município de Jordão, Localidade Manaus (Dantas, n. p. - 2010, MPEG 71379); Rio Jurupari, Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD.

Distribuição Geográfica

Do sul dos Estados Unidos ao norte do Chile e Argentina. Ocorre em todo o Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 1999).

Taxonomia

São reconhecidas 12 subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *G. b. ucayalae* (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1999). É possível que os espécimes MZUSP 35611, 35612, referidos em Pinto & Camargo (1954), como sendo *G. b. brasilianum*, também pertençam à forma *G. b. ucayalae*.

Status

Residente.



Robson Czaban



Sílvia Faustino Linhares

**Registros**

Floresta Estadual do Antimary, Localidade Limoeiro (Guilherme, E., MPEG 60465); Estrada Transacrea (AC-090) Km 60, margem esquerda (Guilherme, E., MPEG 61517); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 63496); BR-364, Km 55, próximo à Vila Campinas (Guilherme, E., MPEG 64364); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., Obs. Pess.); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64432); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); arredores de Cruzeiro do Sul, próximo a boca da Alemanha (Guilherme, E. obs. pess.; Guilherme & Czaban, 2015).

Habitat

Área aberta com pastagens.

Distribuição Geográfica

Do Canadá ao sul da Argentina e, em todo o Brasil. Ocorre localmente na Amazônia (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 1999).

Taxonomia

São reconhecidas 19 subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *A. c. grallaria* (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1999).

Status

Residente (invasora).

Comentários

Espécie recém-registrada no Acre. Certamente tem aumentado sua área de distribuição no oeste amazônico acompanhando o desmatamento e a formação de pastagens (Guilherme & Czaban, 2015).

Pinheiro & Turci (2013) citam a presença desta espécie nos arredores de Cruzeiro do Sul baseado em um indivíduo encontrado atropelado na Estrada da Variante (BR-307). No entanto, o espécime fotografado e identificado como *Athene cunicularia* (Figura 10a em Pinheiro & Turci, 2013) parece ser, na verdade, uma *Megascops sp.* (Ver Comentários em *Urubitinga urubitinga*).

Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002, Suplemento); arredores da cidade de Rio Branco (Guilherme, E., AC 0029, 0175); BR-364, Seringal Sardinha (Guilherme, E., AC 0128); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Cruzeiro do Sul, BR-307, Estrada da Variante (Pinheiro & Turci, 2013, citado como *Bubo virginianus*, ver comentário abaixo).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, área aberta com pastagens.

Distribuição Geográfica

Do México até a Argentina e em todo o Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 1999).

Taxonomia

São reconhecidas quatro subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *A. c. clamator* (Hoyo *et al.*, 1999).

Status

Residente.

Nome anterior

Rhinophlynx clamator.

Comentários

Em Pinheiro & Turci (2013) a Figura 9a mostra uma coruja da espécie *Asio clamator* atropelada e identificada erroneamente pelos autores como *Bubo virginianus*. (Ver Comentários em *Urubitinga urubitinga*).

Strigidae **mocho-diabo** – *Asio stygius* (Wagler, 1832)
Stygian Owl




João Quental



Nyctibiidae **mãe-da-lua-gigante** – *Nyctibius grandis* (Gmelin, 1789)
Great Potoo



Edson Guilherme



Registros
Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002).
Habitat
FOA com palmeiras.
Distribuição Geográfica
Do México até a Argentina. Ocorre localmente em diversas regiões do Brasil (Sick, 1997; Hoyo <i>et al.</i> , 1999).
Taxonomia
São reconhecidas seis subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a <i>A. s. stygius</i> (Hoyo <i>et al.</i> , 1999).
Status
Residente (provável).

Registros
Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney <i>et al.</i> , n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Jordão, localidades Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011). <i>Campus</i> e Parque Zoobotânico da Ufac (Silva, E. L., 2012 [Wikiaves - WA674728]); Guilherme, E., 2014 [Wikiaves - WA1434451]; arredores da cidade de Assis Brasil (Godoy, F. I., 2013 [Wikiaves - WA1019950]); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Xavier, R. S., 2013 [Wikiaves - WA1184520])
Habitat
FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD submontana.
Distribuição Geográfica
América Central e norte da América do Sul (Amazônia). Ocorre, também, no leste do Brasil (Bahia, Minas Gerais) (Sick, 1997; Hoyo <i>et al.</i> , 1999).
Taxonomia
São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a <i>N. g. grandis</i> (Hoyo <i>et al.</i> , 1999).
Status
Residente.

mãe-da-lua-parda – *Nyctibius aethereus* (Wied, 1820)

Long-tailed Potoo




Edson Guilherme

**mãe-da-lua** – *Nyctibius griseus* (Gmelin, 1789)

Common Potoo



Tancredo Maia Filho

**Registros**

Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker & Oren, 1999; Whittaker *et al.*, 2002); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Município de Jordão, localidades Pará, Veneza e Távora (Dantas, n. p. - 2010); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Kaseker, E. P., 2013 [Wikiaves - WA944898]); Parque Zoobotânico da Ufac (Guilherme, E., 2014 [Wikiaves - WA1447880], AC 0800).

Habitat

FOA com palmeiras, campinarana.

Distribuição Geográfica

Da Venezuela ao Paraguai. Ocorre no norte e leste do Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 1999).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *N. a. longicaudatus* (Hoyo *et al.*, 1999).

Status

Residente.

Registros

Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 48049, 48050); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60466); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Município de Jordão, localidades Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Campus e Parque Zoobotânico da Ufac (Kaseker, E. P. 2013 [Wikiaves - WA1379163]).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD.

Distribuição Geográfica

Da Nicarágua ao Uruguai e em todo o Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 1999).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *N. g. griseus* (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1999).

Status

Residente.

urutau-de-asa-branca – *Nyctibius leucopterus* (Wied, 1821)


White-winged Potoo



Douglas Fernando

**urutau-ferrugem** – *Nyctibius bracteatus* Gould, 1846

Rufous Potoo *



Robson Czaban

**Registros**

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002, Suplemento); Município de Mâncio Lima, Parque Nacional da Serra do Divisor, setor norte (Alvarez-Alonso & Whitney, 2003).

Habitat

FOD submontana; FOA aluvial (provável).

Distribuição Geográfica

Sul da Guiana Inglesa e norte do Brasil (Amazônia) (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 1999).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1999).

Status

Residente.

Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002, Suplemento).

Habitat

FOA com palmeiras, FOA aluvial (provável).

Distribuição Geográfica

Em toda a Amazônia (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 1999).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1999).

Status

Residente (provável).


Comentários

(*) Este registro precisa de confirmação (Guilherme, 2009; 2012).

Caprimulgidae **bacurau-ocelado** – *Nyctiphrynus ocellatus* (Tschudi, 1844)
Ocellated Poorwill



Bertrando Campos



Registros

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35614); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Jordão, localidades Pará, Veneza e Távora (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Reserva Florestal Humaitá (Linhares, S. F., 2014 [Wikiaves - WA1435565]); Parque Zoobotânico da Ufac (Linhares, S. F., 2014 [Wikiaves - WA1434729]).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Da Colômbia até a Argentina e em quase todo o Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 1999).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre e a *N. o. ocellatus* (Pinto & Camargo, 1954; Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1999).

Status

Residente.

joão-corta-pau – *Antrostomus rufus* (Boddaert, 1783)
Rufous Nightjar

Caprimulgidae



Ciro Albano



Registros

Alto Rio Moa, margem esquerda, Serra da Jaquirana (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52714).

Habitat

FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Da Costa Rica até a Argentina. Ocorre pontualmente no Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 1999).

Taxonomia

São reconhecidas cinco subespécies (Hoyo *et al.*, 1999). A forma que ocorre no Acre é, provavelmente, a *A. r. rufus* (ver Hoyo *et al.*, 1999; Guilherme, 2009).

Status

Residente.

Nome anterior

Caprimulgus rufus.

bacurau-rabo-de-seda – *Antrostomus sericocaudatus* (Cassin, 1849)

Silky-tailed Nighthawk



Ricardo Plácido

**tuju** – *Lurocalis semitorquatus* (Gmelin, 1789)

Short-tailed Nighthawk



Margi Moss

**Registros**

Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Fazenda Experimental Catuaba (Pereira, A. A., 2012 [Wikiaves WA790138]); Município de Xapuri (Melo, M. A., 2013 [Wikiaves - WA1021913]).

Habitat

FOA aluvial, FOA com palmeiras/bambus.

Distribuição Geográfica

Ocorre pontualmente no Brasil e também na Argentina, no Paraguai, na Bolívia e no Peru (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 1999).

Taxonomia

Dois subespécies são reconhecidas. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *A. s. mengeli* (Hoyo *et al.*, 1999).

Status

Residente.

Nome anterior

Caprimulgus sericocaudatus.

Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Rio Jurupari Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010).

Habitat

FOA com palmeiras, FOA aluvial, campinarana.

Distribuição Geográfica

Do Panamá até a Argentina e em quase todo o Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 1999).

Taxonomia

Quatro subespécies são reconhecidas. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *L. s. nattereri* (Hoyo *et al.*, 1999).

Status

Residente.



Robson Czaban



Registros
Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney <i>et al.</i> , n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003).
Habitat
FOA com palmeiras, FOD submontana, campinarana.
Distribuição Geográfica
Da Colômbia até a Bolívia e no norte do Brasil (Sick, 1997; Hoyo <i>et al.</i> , 1999).
Taxonomia
Espécie monotípica (Hoyo <i>et al.</i> , 1999).
Status
Residente.
Nome anterior
<i>Caprimulgus nigrescens</i> .
Comentários
Todos os registros desta espécie no Acre foram feitos a partir do reconhecimento de sua vocalização ou através de visualização.



Bertrando Campos




Registros
Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48051); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney <i>et al.</i> , n. p. - 1997); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 76390, 76391); BR-317, próximo a cidade de Assis Brasil (Guilherme, E., AC 0062); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Município de Rio Branco, <i>Campus</i> da Ufac, Rio Branco (Guilherme, E., MPEG 59918); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen <i>et al.</i> , 2005); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre <i>et al.</i> 2010); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60468); Floresta Estadual do Antimary, Localidade Limoeiro (Guilherme, E., MPEG 60469); Floresta Estadual do Rio Gregório, próximo à ponte sobre o Rio Acuraua (Guilherme, 2007, MPEG 60470); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Município de Jordão, localidades Pará, Veneza e Távora (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63693); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo <i>et al.</i> , n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme <i>et al.</i> , n. p. - 2013).
Habitat
FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, área aberta com pastagens ou cultivares, margens de rios e lagos.
Distribuição Geográfica
Do sul dos Estados Unidos até a Argentina e em todo o Brasil (Sick, 1997; Hoyo <i>et al.</i> , 1999).
Taxonomia
São reconhecidas cinco subespécies (Hoyo <i>et al.</i> , 1999). A forma que ocorre no Acre é, provavelmente, a <i>A. r. rufus</i> (ver Hoyo <i>et al.</i> , 1999; Guilherme, 2009).
Status
Residente.
Nome anterior
<i>Nyctidromus albicollis</i> .

bacurau-chintã – *Hydropsalis parvula* (Gould, 1837)

Little Nightjar



Rodrigo D'Alessandro

**bacurau-de-rabo-maculado** – *Hydropsalis maculicauda* (Lawrence, 1862)

Spot-tailed Nightjar



Tancredo Maia Filho



Registros
Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008), BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60467); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., 64354); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63493); Município de Rio Branco, Centro da capital (Guilherme, E., MPEG 63494); Município de Cruzeiro do Sul, Fazenda Esperança (Gomes, G. C., 2013 [Wikiaves - WA1002972]); <i>Campus</i> da Ufac, Rio Branco (Pinto, R. R., 2015 [Wikiaves - WA1683977]).
Habitat
FOA com palmeiras/bambus, FOD, área aberta com pastagens ou cultivares, zona urbana.
Distribuição Geográfica
Da Venezuela até a Argentina e em quase todo o Brasil (Sick, 1997; Hoyo <i>et al.</i> , 1999).
Taxonomia
Espécie monotípica (Hoyo <i>et al.</i> , 1999, ver a versão atualizada no site http://www.bbm.com/).
Status
Migrante austral.
Nome anterior
<i>Caprimulgus parvulus</i> ; <i>Setopagis parvula</i> (Hoyo <i>et al.</i> , 1999).

Registros
Município de Rio Branco, Parque Zoobotânico e <i>Campus</i> da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Floresta Estadual do Rio Gregório, próximo à ponte sobre o Rio Acuraua (Guilherme, 2007, MPEG 60471); arredores da cidade de Rio Branco (Doação IBAMA/CETAS, AC 792).
Habitat
FOA aluvial, borda de açudes e lagos.
Distribuição Geográfica
Do México ao Paraguai. Ocorre pontualmente em quase todo o Brasil (Sick, 1997; Hoyo <i>et al.</i> , 1999).
Taxonomia
Espécie monotípica (Hoyo <i>et al.</i> , 1999).
Status
Residente.
Nome anterior
<i>Caprimulgus maculicaudus</i> .

acurana – *Hydropsalis climacocerca* (Tschudi, 1844)
Ladder-tailed Nightjar



Emerson Kaseker



Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 15984, 27365, 27366, 27367); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 76389); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 58829); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme, & Dantas, 2011, MPEG 63260); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63614); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63694, 63695, 63696); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

Borda de FOA aluvial, margens de rios, igarapés, lagos e açudes.

Distribuição Geográfica

Da Venezuela até a Bolívia e norte do Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 1999).

Taxonomia

São reconhecidas cinco subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *H. c. climacocerca* (Novaes, 1957; Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1999).

Status

Residente.

bacurau-tesoura – *Hydropsalis torquata* (Gmelin, 1789)
Scissor-tailed Nightjar



Robson Czaban



Registros

Arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35613).

Habitat

Margens de rios e igarapés.

Distribuição Geográfica

Da margem sul do Rio Amazonas até o Uruguai (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 1999).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *H. t. furcifer* (Pinto & Camargo, 1954; Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1999).

Status

Migrante austral.

Comentários

Em Pinto & Camargo (1954) esta espécie foi nominada como *Hydropsalis brasiliana*.

coruçã – *Chordeiles nacunda* (Vieillot, 1817)
Nacunda Nighthawk



Tancredo Maia Filho



Registros

Campus da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 63615, 63616).

Habitat

Área aberta com pastagens, margens de açudes e lagos.

Distribuição Geográfica

Da Venezuela até a Argentina e em todo o Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 1999).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *C. n. nacunda* (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1999).

Status

Migrante austral.

Nome anterior

Podager nacunda.

bacurau-da-praia – *Chordeiles rupestris* (Spix, 1825)
Sand-colored Nighthawk



Emerson Kaseker



Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 15987, 15988, 15989, 15990); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Município de Manoel Urbano, Rio Purus (Kaseker, E. P. 2011 [Wikiaves - WA453610]).

Habitat

FOA aluvial, margens de rios e igarapés.

Distribuição Geográfica

Da Venezuela até a Bolívia e em toda Amazônia brasileira (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 1999).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *C. r. rupestris* (Novaes, 1957; Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1999).

Status

Residente.

taperuçu-de-mento-branco – *Cypseloides cryptus* Zimmer, 1945
White-chinned Swift



Robson Czaban



Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor, Rio Môa Cachoeira do Ar Condicionado; Igarapé do Amor – Cachoeira do Amor e Cachoeira Estátua (Biancalana & Magalhães, no prelo).

Habitat

FOD submontana, FOD aluvial.

Distribuição Geográfica

América central desde Belize até a Costa Rica. Distribuição pontual no norte da América do Sul, do Suriname ao Peru. No Brasil, só há registros na Amazônia central (Presidente Figueredo e Rio Preto da Eva) e no Acre (Hoyo *et al.*, 1999; Biancalana & Magalhães, no prelo).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1999).

Status

Residente.

taperuçu-de-coleira-branca – *Streptoprocne zonaris* (Shaw, 1796)
White-collared Swift



Robson Czaban



Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002, Suplemento); Município de Mâncio Lima, PNSD (Biancalana, R. N., 2014 [Wikiaves - WA1393015]); Biancalana, 2015).

Habitat

FOA com palmeiras, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Do México até a Argentina e em todo o Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 1999).

Taxonomia

São reconhecidas nove subespécies. A forma que ocorre no Acre deve ser, segundo a distribuição geográfica, a *S. z. subtropicalis* (Hoyo *et al.*, 1999).

Status

Residente.

andorinhão-de-sobre-branco – *Chaetura spinicaudus* (Temminck, 1839)
Band-rumped Swift *



Robson Czaban



andorinhão-de-sobre-cinzent – *Chaetura cinereiventris* Sclater, 1862
Gray-rumped Swift




Sílvia Faustino Linhares



Registros
Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen <i>et al.</i> , 2005); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Jordão, localidades Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010).
Habitat
FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial.
Distribuição Geográfica
Sul da América Central e norte da América do Sul (Sick, 1997; Hoyo <i>et al.</i> , 1999).
Taxonomia
São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre deve ser, segundo a distribuição geográfica, a <i>C. s. spinicaudus</i> (Hoyo <i>et al.</i> , 1999).
Status
Migratória (provável).
Comentários
(*). Os registros desta espécie no sudoeste amazônico são de caráter duvidoso (ver Lees <i>et al.</i> , 2014).

Registros
Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35618); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney <i>et al.</i> , n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); BR-364, Seringal Sardinha (Guilherme, E., MPEG 61477); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Kaseker, E. P. 2013 [Wikiaves - WA944977]).
Habitat
FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD, área aberta com pastagens, campinaranas.
Distribuição Geográfica
Sul da América Central e pontualmente na América do Sul desde a Colômbia até a Argentina (Sick, 1997; Hoyo <i>et al.</i> , 1999).
Taxonomia
São reconhecidas sete subespécies. A forma que ocorre no Acre é a <i>C. c. sclateri</i> (Pinto & Camargo, 1954; Pinto, 1978; Hoyo <i>et al.</i> , 1999).
Status
Residente.



Registros

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35615, 35616, 35617); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Rio Juruá, arredores da cidade de Porto Walter (Whittaker & Oren, 1999); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Kaseker, E. P., 2013 [Wikiaves - WA944975]).

Habitat

FOA com palmeiras, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Leste do Peru e nordeste da Bolívia. No Brasil, ocorre no Acre, em Rondônia e no Mato Grosso (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 1999).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1999).

Status

Residente.



Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Rio Juruá, arredores da cidade de Porto Walter (Whittaker & Oren, 1999); Rio Juruá, Município de Cruzeiro do Sul, Localidade Grajaú (Whittaker & Oren, 1999); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Município de Assis Brasil, Estrada da Pedreira, Localidade Museu (Whittaker, A., 2010 [Wikiaves - WA602487]).

Habitat

FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Sudeste da América do Norte (EUA). Migra para o noroeste da América do Sul durante o inverno setentrional (Hoyo *et al.*, 1999).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1999).

Status

Migrante neártica.

Comentários

(*) Esta espécie não consta da lista principal das aves do Brasil divulgada pelo CBRO (2014). No entanto, estou considerando aqui os registros constantes na literatura (Whittaker & Oren, 1999, Whittaker *et al.*, 2002) e no site brasileiro Wikiaves (Whittaker, A., 2010 [Wikiaves - WA602487]).



Addison Constantini



Emerson Kaseker



Registros

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35619, 35620, 35621, 35622, 35623, 35624; Dente, E., AMNH 785786, 785787); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); BR-364, Seringal Sardinha (Guilherme, E., MPEG 61476); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008).

Habitat

FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, área aberta com pastagens.

Distribuição Geográfica

Leste do Peru, região central e leste da Bolívia e Amazônia sul-ocidental brasileira (Hoyo *et al.*, 1999).

Taxonomia

Este táxon foi considerado, até bem pouco tempo, como uma subespécie de *Chaetura chapmani* (Pinto & Camargo, 1954). No entanto, Marin (1997), baseado em análises morfológicas externas, propôs tratá-lo como espécie válida. Desde então, o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO), acatou tal sugestão e passou a incluir *C. viridipennis* em sua lista primária de Aves Brasileiras (CBRO, 2014).

Status

Migrante regional.

Comentários

Dos seis espécimes deste táxon que foram coletados durante a expedição realizada por Vanzolini ao Acre, em 1951 (Vanzolini, 1952, Pinto & Camargo, 1954), dois foram permutados com o *American Museum of Natural History*, onde encontram-se depositados atualmente (AMNH 785786, 785787).

Registros

ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Rio Branco, *Campus* da Ufac (Guilherme, E. AC - 763).

Habitat

FOA aluvial, área aberta.

Distribuição Geográfica

Sudeste da Bolívia e do Paraguai e no norte da Argentina. No Brasil, ocorre nas regiões Sul e Central. Migra para o norte da América do Sul durante o inverno austral (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 1999).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1999).


Status

Migrante austral.

andorinhão-de-rabo-curto – *Chaetura brachyura* (Jardine, 1846)
Short-tailed Swift



Emerson Kaseker



andorinhão-do-buriti – *Tachornis squamata* (Shaw, 1796)
Fork-tailed Palm-Swift



Bertrando Campos



Registros

Município de Capixaba, Fazenda Campo Lindo (Hidasi, J., LSUMZ 64970, 68106); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Rio Juruá, Município de Cruzeiro do Sul, Localidade Grajaú (Whittaker & Oren, 1999); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão e localidades Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Rio Jurupari, Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Município de Rio Branco, *Campus* da Ufac (Amoêdo, M., AC 674, 770).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, área aberta.

Distribuição Geográfica

Sul da América Central e Norte da América do Sul. No Brasil, ocorre em toda a Amazônia (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 1999).

Taxonomia

São reconhecidas quatro subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *C. b. brachyura* (Hoyo *et al.*, 1999).

Status

Residente.

Registros

Rio Juruá, Município de Cruzeiro do Sul, Localidade Grajaú (Whittaker & Oren, 1999); Parque Zoobotânico e *Campus* da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001, AC 0659, 0661, 0732); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Município de Mâncio Lima, Campina (Aleixo, n. p. - 2003); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Município de Mâncio Lima, Estrada do Barão, Comunidade São Domingos (Guilherme, E., obs. pess.); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., obs. pess.); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011); Rio Jurupari, localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, campinarana, área aberta.

Distribuição Geográfica

Norte e nordeste da América do Sul cisandina (Pinto, 1978; Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 1999).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *T. s. semota* (Hoyo *et al.*, 1999).

Status

Residente.

Comentários

Espécie muito comum em todo o estado do Acre, inclusive em ambientes urbanos.


andorinhão-estofador – *Panyptila cayennensis* (Gmelin, 1789)
Lesser Swallow-tailed Swift




Robson Czaban



balança-rabo-de-bico-torto – *Glaucis birsutus* (Gmelin, 1788)
Rufous-breasted Hermit



Celso B. Almeida



Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Município de Brasília (Melo, M. A., 2013 [Wikiaves - WA1005832]); Município de Rio Branco, *Campus* da Ufac (Guilherme, E., 2014 [Wikiaves - WA1432559]); Município de Mâncio Lima, Parque Nacional da Serra do Divisor (Biancalana, R. N., 2014 [Wikiaves - WA1393836]).

Habitat

FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Do México ao sudeste do Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 1999).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *P. c. cayennensis* (Hoyo *et al.*, 1999).

Status

Residente.

Registros

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35625); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52546, 52547); Parque Zoobotânico e *Campus* da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; AC 0031, 0327); Rio Tejo, a aproximadamente 5 Km da foz, REAJ (Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 52026); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., 48094, 48095, 48096); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 48093); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80143, 80144, 80145, 80146); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005, Guilherme, E., MPEG 61529); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 59780); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60472, 60473; Silva *et al.*, 2015); Ramal Nabor Júnior, Km 26 (Guilherme, E., MPEG 60474); BR-364 a 40 Km da ponte sobre o Rio Liberdade, margem direita (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60475); Floresta Estadual do Mogno, BR-364, a 6 Km da ponte sobre o Rio Tauari (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60476); Floresta Estadual do Rio Gregório, próximo à ponte sobre o Rio Acuraua (Guilherme, 2007, MPEG 60479); Floresta Estadual do Antimary, Ramal Uirapuru (Guilherme, E., MPEG 60477, 60478); Estrada Transacrea (AC-090) Km 60, margem esquerda (Guilherme, E., MPEG 61396, 61397); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61228); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2008b, 2011, MPEG 63270, 63271, 63425); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63267, 63268, 63269); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64428); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., 64352); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63699; 63700); Município de Assis Brasil, Estrada da Pedreira, Localidade Museu (Guilherme, E., MPEG 70894, 70895, 70896); Reserva Humaitá – Ufac (Lemos, T. & Marques, E., AC 591; Silva *et al.*, 2015); Município de Senador Guiomard, Localidade Bonal (Guilherme, E. & Souza, G. AC 532); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Silva *et al.*, 2015); Município de Plácido de Castro, BR-364, Ramal do 45 (Marques, 2015); Município de Rio Branco, Estrada da Piçarreira (Marques, 2015); Município de Porto Acre, mata ripária adjacente à Reserva Humaitá - setor norte (Marques, 2015); Rio Branco, Bairro Calafate (Silva, D., AC 0789).


balança-rabo-de-bico-torto – *Glaucis hirsutus* (Gmelin, 1788)

Rufous-breasted Hermit

Habitat
FOA com palmeiras/bambus, FOA/FOD aluvial, FOD, área aberta com cultivares.
Distribuição Geográfica
Do Panamá até a Bolívia e em quase todo o Brasil (Sick, 1997; Hoyo <i>et al.</i> , 1999).
Taxonomia
São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a <i>G. h. hirsutus</i> (Pinto & Camargo, 1954; Hoyo <i>et al.</i> , 1999).
Status
Residente.

balança-rabo-de-garganta-preta – *Threnetes leucurus* (Linnaeus, 1766)

Pale-tailed Barbthroat

**Registros**

Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52544, 52545); Rio Tejo, a aproximadamente 5 Km da foz, REAJ (Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 52038, 52039, 52040); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52037; Whittaker *et al.*, 2002); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 48109, 48110); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48097, 48098, 48099, 48100, 48101, 48102, 48103, 48104, 48105, 48106, 48107, 48108); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80147); Parque Nacional da Serra do Divisor, 106 Km a sudoeste de Cruzeiro do Sul (Aleixo, A. & Polleto, F., MPEG 58007); Baixo Rio Paratari, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004, MPEG 58361); Floresta Estadual do Rio Gregório, próximo à ponte sobre o Rio Acuraua (Guilherme, 2007, MPEG 60480); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Floresta Estadual do Antimary, Ramal Uirapuru (Guilherme, E., MPEG 60481, 60482); Estação Ecológica Ecológica do Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 59777); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63261, 63262); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63701, 63702, 63703, 63704); Rio Jurupari, Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010, MPEG 69984); Rio Jurupari, Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Reserva Humaitá – Ufac (Lemos, T. & Marques, E., AC 581, 597; Silva *et al.*, 2015); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Parque Zoológico da Ufac (Guilherme, E. 2014, anilhado).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Das Guianas até a Bolívia e em toda a Amazônia brasileira (Sick, 1997).

Taxonomia


São reconhecidas seis subespécies (Hoyo *et al.*, 1999). Duas formas parecem ocorrer no estado do Acre: *T. l. cervinicauda*, registrada na Bacia do Rio Juruá (interflúvio Juruá/Purus) e *T. l. rufigastra*, registrada na Bacia do Rio Purus (interflúvio Purus/Madeira) (Guilherme, 2009, 2012).

Status


Residente.



Robson Czaban



Tomaz Melo



Registros

Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52550); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52034; Whittaker *et al.*, 2002); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80148); Parque Zoobotânico e *Campus* da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; AC 0442, 0445, 0651); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); arredores da cidade de Assis Brasil (Guilherme, 2004); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 59782); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., obs. pess.); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 64565); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Mâncio Lima, Comunidade Santa Bárbara (Lemos, T. & Marques, E., AC 614); Município de Rio Branco, Estrada da Piçarreira (Marques, E. & Lemos, T., AC 667); Reserva Humaitá – Ufac (Lemos, T. & Marques, E., AC 585; Silva *et al.*, 2015); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Silva *et al.*, 2015); Município de Plácido de Castro, BR-364, Ramal do 45 (Marques, 2015); Município de Rio Branco, Estrada da Piçarreira (Marques, 2015); Município de Porto Acre, mata ripária adjacente à Reserva Humaitá, setor norte (Marques, 2015).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, campinarana.

Distribuição Geográfica

Das Guianas até a Bolívia e em quase todas as regiões do Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 1999).

Taxonomia

São reconhecidas quatro subespécies (Hoyo *et al.*, 1999). A forma que ocorre no Acre é a *P. ruber ruber* (Hoyo *et al.*, 1999).

Status

Residente.

Registros

Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52035, 52036; Whittaker *et al.*, 2002); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 48083, 48084, 48085, 48086); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48087, 48088); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80149, 80150, 80151, 80152, 80153, 80154, 80155); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; AC 0170, 0427, 0774; MPEG 59925); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 59775, 59776, 58830, 58831, 58832, 58833); Floresta Estadual do Antimary, Ramal Uirapuru (Guilherme, E., MPEG 60491); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60492, 60493, 60494; Silva *et al.*, 2015); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Guilherme, E., MPEG 61525, 61526); Floresta Estadual do Rio Gregório, próximo à ponte sobre o Rio Acuraua (Guilherme, 2007, MPEG 60489, 60490); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008; Bueno, A. S., AC 0740); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61226); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63263, 63264); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 63495, 63513, 63514, 63627); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64534); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64429); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63705, 63706); Município de Assis Brasil, Estrada da Pedreira, Localidade Museu (Guilherme, E., MPEG 70897); Reserva Humaitá – Ufac (Lemos, T. & Marques, E., AC 584); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Cruzeiro do Sul, BR-307, Estrada da Variante (Pinheiro & Turci, 2013); Município de Senador Guiomard, BR 364, Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015); BR 317, margem esquerda, área adjacente à Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015); Município de Plácido de Castro, BR-364, Ramal do 45 (Marques, 2015); Município de Rio Branco, Estrada da Piçarreira (Marques, 2015); Município de Porto Acre, mata ripária adjacente à Reserva Humaitá, setor norte (Marques, 2015).

rabo-branco-cinza – *Phaethornis hispidus* (Gould, 1846)

White-bearded Hermit

Habitat
FOA com bambus/palmeiras, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.
Distribuição Geográfica
América do Sul oeste-setentrional cisandina (Pinto, 1978; Hoyo <i>et al.</i> , 1999).
Taxonomia
Espécie monotípica (Hoyo <i>et al.</i> , 1999).
Status
Residente.
Comentários
Este é um dos trochilídeos mais capturados em redes de neblina dentro do sub-bosque das florestas do leste do estado do Acre.

rabo-branco-amarelo – *Phaethornis philippii* (Bourcier, 1847)

Needle-billed Hermit




Registros
Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 26892); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney <i>et al.</i> , n. p. - 1997); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A., MPEG 48076, 48077, 48078, 48079, 48080, 48081, 48082); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48062, 48063, 48064, 48065, 48066, 48067, 48068, 48069, 48070, 48071, 48072, 48073, 48074); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen <i>et al.</i> , 2005; Guilherme, E., MPEG 61395, 61528); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre <i>et al.</i> 2010); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 61995, 61996, 61997, 61998, 61999, 62000, 62001); Município de Mâncio Lima, Estrada do Barão, Comunidade São Domingos (Guilherme, E., MPEG 62002, 62003, 62004); Município de Cruzeiro do Sul, BR 307, Ramal dos Caroba (Guilherme, E. AC 394, 398); Município de Mâncio Lima, Comunidade Santa Bárbara (Guilherme, E., AC 603); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme <i>et al.</i> , n. p. - 2013).
Habitat
FOA com palmeiras/bambus, FOD, FOD submontana, campinarana.
Distribuição Geográfica
Ocorre no leste do Peru, no norte da Bolívia e na Amazônia ocidental brasileira (Hoyo <i>et al.</i> , 1999).
Taxonomia
Espécie monotípica (Hoyo <i>et al.</i> , 1999).
Status
Residente.
Comentários
Em Novaes (1957) este táxon foi nominado como <i>Ametrornis philippii</i> .

rabo-branco-de-bico-reto – *Phaethornis bourcieri* (Lesson, 1832)

Straight-billed Hermit




João Quental

**besourão-de-bico-grande** – *Phaethornis malaris* (Nordmann, 1835)

Great-billed Hermit



Robson Czaban

**Registros**

Rio Tejo, margem esquerda, a aproximadamente 5 Km da foz (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52033, 52034, Whittaker *et al.*, 2002); Parque Nacional da Serra do Divisor, Alto Rio Moa, margem direita, Igarapé Ramon (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52716); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52548, 52549); Parque Nacional da Serra do Divisor, 106 Km a sudoeste de Cruzeiro do Sul (Aleixo, A. & Polleto, F., MPEG 58008); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal (Guilherme, E., MPEG 59922, 59923); Floresta Estadual do Rio Gregório, próximo à ponte sobre o Rio Acuraua (Guilherme, 2007, MPEG 60487); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61227); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63265); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63707); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010, MPEG 69987); Rio Jurupari, Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010, MPEG 69985, 69986); Rio Jurupari, Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Ocorre das Guianas ao Peru, acompanhando a calha do Rio Solimões/ Amazonas (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 1999).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *P. b. bourcieri* (Hoyo *et al.*, 1999).

Status

Residente.

Registros

Rio Tejo, margem esquerda, a aproximadamente 5 Km da foz (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52027, 52028, 52029, Whittaker *et al.*, 2002); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52030, 52031; Whittaker *et al.*, 2002); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A., MPEG 48059); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48052, 48053, 48054, 48055, 48056, 48057, 48061); Rio Paratari, margem sul, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004, MPEG 58362, 58363, 58364); Rio Branco, Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Guilherme, E., MPEG 59919, 59920, 59921, 61527); Floresta Estadual do Antimary, Ramal Uirapuru (Guilherme, E., MPEG 60483); BR-364 a 40 Km da ponte sobre o Rio Liberdade, margem direita (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60484, 60485); Floresta Estadual do Mogno, BR-364, a 6 Km da ponte sobre o Rio Tauari (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60486); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 59779); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63266); Município de Senador Guiomard, Localidade Bonal (Guilherme, E. & Souza, G., AC 578); Reserva Humaitá – Ufac (Lemos, T. & Marques, E., AC 582; Silva *et al.*, 2015); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Silva *et al.*, 2015); Município de Rio Branco, Estrada da Piçarreira (Marques, 2015).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Porção oeste-setentrional da América do Sul (Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Brasil) (Hinkelmann, 1996).

besourão-de-bico-grande – *Phaethornis malaris* (Nordmann, 1835)

Great-billed Hermit

Taxonomia

São reconhecidas seis subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *P. m. ochraceiventris* (Hoyo *et al.*, 1999).

Status


Residente.

Comentários

Em algumas publicações este táxon aparece nominado como *P. superciliosus* (e.g., Guilherme 2007). No entanto, uma ampla revisão sistemática e biogeográfica feita no complexo *Phaethornis superciliosus-malaris-longirostris* mostrou que a espécie deste grupo que ocorre na Amazônia ocidental é a *P. malaris* (Hinkelmann, 1996). Por essa razão, todos os registros de *P. superciliosus* para o Acre estão referidos aqui como *P. malaris*.

asa-de-sabre-cinza – *Campylopterus largipennis* (Boddaert, 1783)

Gray-breasted Sabrewing



João Quental

**Registros**

Arredores da cidade de Rio Branco, Seringal Nova Empresa (Hidasi, J., CPJH 2036); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52042; Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52551, 52552); arredores da cidade de Assis Brasil (Guilherme, 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 59773, 59774); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal (Guilherme, E., MPEG 59924); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 64563).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD.

Distribuição Geográfica

Norte da América do Sul cisandina, da Guiana até a Bolívia. Ocorre em toda a Amazônia e no sudeste brasileiro (Hoyo *et al.*, 1999).

Taxonomia

São reconhecidas quatro subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *C. l. aequatorialis* (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1999).

Status

Residente.

beija-flor-azul-de-rabo-branco – *Florisuga mellivora* (Linnaeus, 1758)

White-necked Jacobin




Macho


João Quental

**beija-flor-de-veste-preta** – *Anthracoceros nigricollis* (Vieillot, 1817)

Black-throated



João Quental



Macho

Registros

Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 48089); Alto Rio Moa, Igarapé Amil, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52717); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 59778); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Município de Manoel Urbano, Rio Purus (Kaseker, E. P. 2011 [Wikiaves - WA455400]).

Habitat

FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Do México até a Bolívia. No Brasil, ocorre em toda a Amazônia (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 1999).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *F. m. mellivora* (Hoyo *et al.*, 1999).

Status

Residente.

Registros

Arredores da cidade de Rio Branco (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35626); Parque Zoobotânico e *Campus* da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; AC 0093, 0169, 0172, 0769); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63708, 63709, 63710); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão (Dantas, n. p. - 2010).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, área aberta com cultivares, ambientes urbanos.

Distribuição Geográfica

Do Panamá até a Argentina e em todo o Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 1999).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1999).

Status

Residente.

Trochilidae Sub-família Trochilinae
topázio-de-fogo – *Topaza pyra* (Gould, 1846)
Fiery Topaz



Macho



Margi Moss

beija-flor-vermelho – *Chrysolampis mosquitus* (Linnaeus, 1758)
Ruby-topaz Hummingbird



Ciro Albano



Macho

Trochilidae Sub-família Trochilinae

Registros

Alto Rio Moa, Igarapé Amil, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52719, 52720, 52721); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62008).

Habitat

FOA aluvial, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

Do sul da Venezuela e da Colômbia ao norte do Peru. Ocorre no extremo-oeste do Brasil amazônico (Sick, 1997).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies (Hu *et al.*, 2000). Hu *et al.*, (2000) estudaram os três espécimes coletados no PNSD. Entretanto, não chegaram a uma conclusão sobre a que forma eles pertencem. Para estes autores, a forma que ocorre na Amazônia sul-ocidental está indeterminada.

Status

Residente.

Comentários

Este táxon foi considerado por Hoyo *et al.* (1999) como subespécie de *T. pella*.

Registros

Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2008b; 2011); Cidade de Rio Branco, Bairro Jardim Primavera (Souza, D., AC – 665).

Habitat

Borda de FOA aluvial, ambiente urbano.

Distribuição Geográfica

Norte da América do Sul, da Venezuela até a Bolívia. Ocorre em quase todas as regiões do Brasil (Sick, 1997).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1999).

Status

Migrante intratropical (vinda do leste).

topetinho-verde – *Lophornis chalybeus* (Vieillot, 1823)
Festive Coquette *



Macho

João Quental



rabo-de-espinho – *Discosura langsdorffi* (Temminck, 1821)
Black-bellied Thorntail *



Macho

Cárin Duarte



Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002, Suplemento).

Habitat

FOA com palmeiras (provável).

Distribuição Geográfica

Da Venezuela até a Bolívia. Ocorre no norte e sudeste do Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 1999).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1999).

Status

Vagante (provável).

Comentários

(*) Este registro precisa de confirmação (Guilherme, 2009; 2012).

Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002, Suplemento).

Habitat

FOA com palmeiras (provável).

Distribuição Geográfica

América do Sul oeste-setentrional e sudeste do Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 1999).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *D. l. melanosternon* (Hoyo *et al.*, 1999).

Status

Residente.

Comentários

(*) Este registro precisa de confirmação (Guilherme, 2009; 2012).

beija-flor-de-garganta-azul – *Chlorostilbon notatus* (Reich, 1793)

Blue-chinned Sapphire



Macho



Margi Moss

esmeralda-de-cauda-azul – *Chlorostilbon mellisugus* (Linnaeus, 1758)

Blue-tailed Emerald



Sílvia Faustino Linhares



Macho

Registros

Rio Juruá, margem direita, cidade de Cruzeiro do Sul (Novaes, 1957, MPEG 26928); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Município de Rio Branco, Estrada Transacreana (Plácido, R. A., 2015 [Wikiaves - WA1691575]).

Habitat

FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Da Venezuela à Guiana e no Brasil oriental. Ocorre, também, no nordeste do Peru e no Brasil oeste-amazônico (Pinto, 1978; Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 1999).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *C. n. puruensis* (Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 1999).

Status

Residente.

Comentários

Em Novaes (1957) e Whittaker *et al.* (2002) este táxon foi nominado como *Chlorestes notata*.

Registros

Rio Juruá, Foz do Rio Tejo (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52043; Whittaker *et al.*, 2002); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2008b, 2011, MPEG 63272); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); *Campus* da Ufac, Rio Branco (Guilherme, E., AC); Município de Rio Branco, *Campus* da Ufac (Guilherme, E., AC 630).

Habitat

FOA com palmeiras, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Do México até a Bolívia. No Brasil, ocorre da margem esquerda do Amazonas, para oeste, até as fronteiras com Peru e a Bolívia (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 1999).

Taxonomia

São reconhecidas 17 subespécies. Duas formas parecem estar presentes no Acre: *C. m. phaeopygus* e *C. m. peruanus* (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1999).

Status


Residente.

beija-flor-tesoura-verde – *Thalurania furcata* (Gmelin, 1788)

Fork-tailed Woodnymph



Macho

**Registros**

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, 1958, MPEG 26950); Rio Tejo, margem esquerda, a aproximadamente 5 Km da foz (Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 52041); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48090, 48091); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 48092); Parque Nacional da Serra do Divisor, Alto Rio Moa, margem direita, Igarapé Ramon (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52715); Alto Rio Acre, Foz do Igarapé dos Patos (Guilherme, E., obs. pess.); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, E., AC 0173); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Floresta Estadual do Rio Gregório, próximo à ponte sobre o Rio Acuraua (Guilherme, 2007, MPEG 60488); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61228, 61229, 61230, 61231); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 59781); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Município de Jordão, localidades Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2008b; 2011, MPEG 63273); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64445); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63711, 63713); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Mâncio Lima, Comunidade Santa Bárbara (Lemos, T. & Marques, E., AC 600, 615); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal e setor norte (Silva *et al.*, 2015); Município de Senador Guiomard, BR 364, Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Silva *et al.*, 2015); Município de Plácido de Castro, BR-364, Ramal do 45 (Marques, 2015).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Da Venezuela até a Argentina e em todo o Brasil (Hoyo *et al.*, 1999).

Taxonomia

São reconhecidas 13 subespécies (Hoyo *et al.*, 1999). Ao menos três formas podem estar presentes na região: *T. f. cf. boliviana*, *T. f. cf. jelskii* e *T. f. Simoni* (Guilherme, 2009).

Status

Residente.

beija-flor-safira – *Hylocharis sapphirina* (Gmelin, 1788)

Rufous-throated Sapphire



Macho

Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002).

Habitat

Borda de FOA aluvial (provável).

Distribuição Geográfica

Norte e sudeste da América do Sul (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 1999).


Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1999).

Status

Residente (provável).

beija-flor-roxo – *Hylocharis cyanus* (Vieillot, 1818)
White-chinned Sapphire



Macho



Robson Czaban

Registros

Arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35627); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Município de Mâncio Lima, Estrada do Barão, Comunidade São Domingos (Guilherme, E., MPEG 62005); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas 2011, MPEG 63277); Município de Mâncio Lima, Comunidade Santa Bárbara (Lemos, T. & Marques, E., AC 598, 599, 613); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOD, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

Norte da América do Sul. Ocorre em toda a Amazônia e no litoral brasileiro (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 1999).

Taxonomia

São reconhecidas cinco subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *H. c. rostrata* (Pinto & Camargo, 1954; Hoyo *et al.*, 1999).


Status

Residente.

beija-flor-de-cauda-dourada – *Chrysuronia oenone* (Lesson, 1832)
Golden-tailed Sapphire



Margi Moss



Macho

Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62006).

Habitat

FOA aluvial, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

América do Sul oeste-setentrional (Hoyo *et al.*, 1999).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *C. o. josephinae* (Pinto, 1978; Clements & Shany, 2001; Hoyo *et al.*, 1999).

Status

Residente.

Trochilidae Sub-família Trochilinae
beija-flor-verde – *Polytmus theresiae* (Da Silva Maia, 1843)
 Grenn-tailed Goldenthrroat



Macho



Robson Czaban

Registros
Campinaranas dos municípios de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima (Guilherme, 2012).
Habitat
Campinas e campinaranas.
Distribuição Geográfica
Ocorre no norte da América do Sul. Sudeste da Colômbia, sudoeste da Venezuela, Suriname, Guiana, Guiana Francesa e Brasil. Possui registros pontuais no Peru e na Bolívia (Hoyo <i>et al.</i> , 1999).
Taxonomia
São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a <i>P. t. leucorrhous</i> (Hoyo <i>et al.</i> , 1999).
Status
Residente.

beija-flor-de-garganta-verde – *Amazilia fimbriata* (Gmelin, 1788)
 Glittering-throated Emerald



Fêmea




Tancredo Maia Filho

Registros
Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney <i>et al.</i> , n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002).
Habitat
FOA com palmeiras.
Distribuição Geográfica
Da Colômbia ao Paraguai. Ocorre em toda Amazônia e sudeste brasileiro (Sick, 1997; Hoyo <i>et al.</i> , 1999).
Taxonomia
São reconhecidas sete subespécies. A forma que ocorre no Acre deve ser, segundo a distribuição geográfica, a <i>A. f. laeta</i> (Hoyo <i>et al.</i> , 1999).
Status
Residente.


Trochilidae Sub-família Trochilinae

beija-flor-de-peito-azul – *Amazilia lactea* (Lesson, 1832)

Sapphire-spangled Emerald



Edson Guilherme

**Registros**

Cidade de Rio Branco (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35630; Oren, D. C., MPEG 44214); arredores da cidade de Rio Branco, Seringal Nova Empresa (Hidasi, J., LSUMZ 68108); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; AC 174, 420, 430); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); arredores da cidade de Assis Brasil (Guilherme, 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60495, 60496; Silva *et al.*, 2015); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63626); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2008b, 2011, MPEG 63274; 63275; 63276); Município de Assis Brasil, Estrada da Pedreira, Localidade Museu (Guilherme, E., MPEG 70893); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Município de Rio Branco, Estrada da Piçarreira (Marques, 2015); Município de Plácido de Castro, BR-364, Ramal do 45 (Marques, 2015).

Habitat

FOA aluvial, FOD, área aberta com cultivares, ambientes urbanos.

Distribuição Geográfica

Extremo norte (Venezuela) e oeste (Peru, Bolívia, Brasil) da América do Sul e também no sudeste brasileiro (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 1999).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *A. l. bartletti* (Pinto & Camargo, 1954; Hoyo *et al.*, 1999).

Status

Residente.

Comentários

Espécie nominada em Pinto & Camargo (1954) como *Thaumantias bartletti* e, em Hoyo *et al.* (1999), como *Polyerata lactea*.

beija-flor-estrela – *Heliodoxa aurescens* (Gould, 1846)

Gould's Jewelfront



Margi Moss

**Registros**

Alto Rio Moa, Igarapé Amil, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52718); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010).

Habitat

FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Noroeste da América do Sul (Venezuela, Brasil e Peru) (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 1999).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1999).

Status

Residente.

beija-flor-de-bochecha-azul – *Heliothryx auritus* (Gmelin, 1788)

Black-eared Fairy



Macho



Robson Czaban

Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Fazenda Experimental Catuaba (Kaseker, E. P., 2013 [Wikiaves - WA963933]).

Habitat

FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Norte e nordeste da América do Sul. Ocorre em toda a Amazônia brasileira (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 1999).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *H. a. auriculatus* (Hoyo *et al.*, 1999).

Status

Residente.

Comentários


Os únicos registros desta espécie no Acre foram visuais.

bico-reto-cinzento – *Heliomaster longirostris* (Audebert & Vieillot, 1801)

Long-billed Starthroat



Margi Moss



Fêmea

Registros

Arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35628, 35629); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62007); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63712); Município de Senador Guimard, Localidade Bonal (Guilherme, E. & Souza, G. AC 568).

Habitat

FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

Na América Central e no norte da América do Sul (Hoyo *et al.*, 1999).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *H. l. longirostris* (Pinto & Camargo, 1954; Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1999).

Status

Residente.

Trochilidae Sub-família Trochilinae
bico-reto-azul – *Helioaster furcifer* (Shaw, 1812)
 Blue-tufted Startroat



Roseanne Almeida



Macho

Registros
Município de Rio Branco, <i>Campus</i> da Universidade Federal do Acre (Cardoso, A., ZUEC 1565).
Habitat
Ambiente urbano, área aberta.
Distribuição Geográfica
Ocorre no sudoeste da América do Sul. Região central e leste da Bolívia, Paraguai, sudoeste do Brasil, norte da Argentina e noroeste do Uruguai. A ocorrência desta espécie no Acre é de status vagante (Guilherme, 2012).
Taxonomia
Espécie monotípica (Hoyo <i>et al.</i> , 1999).
Status
Vagante.
Comentários
O único registro desta espécie feito no Acre foi baseado em um espécime encontrado morto no <i>Campus</i> da Ufac, coletado pelo herpetólogo Adão Cardoso, em 20 de fevereiro de 1988. Este espécime está depositado na Coleção Ornitológica do Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Campinas (ZUEC) no Estado de São Paulo, Brasil.

estrelinha-ametista – *Calliphlox amethystina* (Boddaert, 1783)
 Amethyst Woodstar



Robson Czaban



Macho


Registros
Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002).
Habitat
FOA aluvial (provável).
Distribuição Geográfica
Das Guianas até a Argentina e, em todo o Brasil (Sick, 1997; Hoyo <i>et al.</i> , 1999).
Taxonomia
Espécie monotípica (Hoyo <i>et al.</i> , 1999).
Status
Residente (provável).

Trochilidae Sub-família Trochilinae

surucuá-de-cauda-preta – *Trogon melanurus* Swainson, 1838
Black-tailed Trogon



Edson Guilherme



Macho

surucuá-grande-de-barriga-amarela – *Trogon viridis* Linnaeus, 1766
White-tailed Trogon



Edson Guilherme



Macho

Trogonidae

Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 15991, 15992, 15993); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 76384); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal (Guilherme, E., MPEG 59928); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61250); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 59784); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62009); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 63497); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63289); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

Ocorre no sul da América Central (Panamá) e no norte da América do Sul (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2001).

Taxonomia

São reconhecidas quatro subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *T. m. eumorphus* (Novaes, 1957; Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 2001).

Status

Residente.

Registros

Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 48111); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 59783); Ramal Nabor Júnior, Km 26 (Guilherme, E., MPEG 60504); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62011, 62012); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Município de Mâncio Lima, Estrada do Barão, Comunidade São Domingos (Guilherme, E., MPEG 62013); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63624); Rio Jurupari, localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Sul da América Central; norte e sudeste da América do Sul (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2001).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *T. v. viridis* (Pinto 1978; Hoyo *et al.*, 2001).

Status

Residente.

Trogonidae

surucuá-pequeno – *Trogon ramonianus* Deville & DesMurs, 1849
Amazonian Trogon



Robson Czaban



Macho

Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 14237); Rio Juruá, margem direita, Localidade Mato Grosso (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52044, Whittaker *et al.*, 2002); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 58835); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63491); Município de Jordão, localidades Pará, Veneza e Távora (Dantas, n. p. - 2010); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Campos, B., 2015 [Wikiaves - WA1896485]).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA/FOD aluvial, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

América Central e norte da América do Sul (Amazônia) (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2001).

Taxonomia

Antes de ser elevada à espécie plena, este táxon era tratado como como subespécie de *Trogon violaceus* (Novaes, 1957; Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 2001).

Status

Residente.

Nome anterior

Trogon violaceus.

surucuá-de-barriga-vermelha – *Trogon curucui* Linnaeus, 1766
Blue-crowned Trogon



Edson Guilherme



Macho

Registros

Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 48112); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52045; Whittaker *et al.*, 2002); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Parque Zoológico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); arredores da cidade de Assis Brasil (Guilherme, 2004); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60497); Ramal Nabor Júnior, Km 26 (Guilherme, E., MPEG 60498); BR-364 a 40 Km da ponte sobre o Rio Liberdade, margem direita (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60499, 60500); Rio Liberdade, margem direita, próximo à Foz do Igarapé Novena (Guilherme, E., MPEG 60501); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63492); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 58834); Município de Jordão, localidades Pará, Veneza e Távora (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63288); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64409); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64441); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63714, 63715); Rio Jurupari, localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Da Colômbia até a Argentina e em quase todo o Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2001).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *T. c. peruvianus* (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 2001).

Status

Residente.

surucuá-de-barriga-amarela – *Trogon rufus* Gmelin, 1788

Black-throated Trogon



Robson Czaban



Macho

Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 14242, 14243); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Baixo Rio Paratari, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Estrada Transacreeana (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Jordão, localidades Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62010); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010).

Habitat

FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

Ocorre no sul da América Central e no norte e sudeste da América do Sul (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2001).

Taxonomia

São reconhecidas seis subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *T. r. sulphureus* (Novaes, 1957; Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 2001).

Status


Residente.

surucuá-de-coleira – *Trogon collaris* Vieillot, 1817

Collared Trogon



Anselmo D'Affonseca



Macho

Registros

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35659); arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35660); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Baixo Rio Paratari, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004, MPEG 58365); arredores da cidade de Assis Brasil (Guilherme, E., AC 0075); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005; Guilherme, E., MPEG 59926, 59927); Floresta Estadual do Antimary, Ramal Uirapuru (Guilherme, E., MPEG 60502); Ramal Nabor Júnior, Km 26 (Guilherme, E., MPEG 60503); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada Transacreeana (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Município de Jordão, localidades Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64440); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63716); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Ocorre na América Central, no norte e no sudeste da América do Sul (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2001).

Taxonomia

São reconhecidas oito subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *T. c. collaris* (Pinto & Camargo, 1957; Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 2001).

Status

Residente.

surucuá-pavão – *Pharomachrus pavoninus* (Spix, 1824)
Pavonine Quetzal



Macho

João Quental



martim-pescador-grande – *Megaceryle torquata* (Linnaeus, 1766)
Ringed Kinkfisher



Macho

Bertrando Campos



Registros

Alto Rio Moa, Igarapé Amil, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52722); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal (Quental, J. G., 2014 [Wikiaves - WA1429156]).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

Em toda a Amazônia (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2001).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2001).

Status

Residente.

Registros

Arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35656); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada Transacreaana (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63290); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

Margens de rios, açudes e lagos, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Do México à Terra do Fogo (Argentina) e em todo o Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2001).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *M. t. torquatus* (Pinto & Camargo, 1954; Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 2001).

Status

Residente.

Nome anterior

Ceryle torquata.


martim-pescador-verde – *Chloroceryle amazona* (Latham, 1790)

Amazon Kingfisher



Macho

Edson Guilherme

**martinho** – *Chloroceryle aenea* (Pallas, 1764)

American Pygmy Kingfisher



Macho

Emerson Kaseker

**Registros**

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35657, 35658); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Parque Zoobotânico e *Campus* da Ufac, Rio Branco (Guilherme, E., AC 0060, 0758); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, localidades Santa Cruz Velha e Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

Margens de rios, açudes e lagos, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Do México até a Argentina e em todo o Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2001).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2001).

Status

Residente.

Registros

Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 48122, 48123, 48124); Rio Tejo, a aproximadamente 5 Km da foz, REAJ (Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 52046); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 76396); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; Portela, R. AC-752); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E. 63268); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64519); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63717); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Rio Jurupari Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010, MPEG 69993); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Silva *et al.*, 2015); Município de Plácido de Castro, BR-364, Ramal do 45 (Marques, 2015).

Habitat

Margens de igarapés no interior de FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Do México até a Argentina e em quase todo o Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2001).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *C. a. aenea* (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 2001).

Status


Residente.

martim-pescador-pequeno – *Chloroceryle americana* (Gmelin, 1788)

Green Kingfisher



Emerson Kaseker

**martim-pescador-da-mata** – *Chloroceryle inda* (Linnaeus, 1766)

Green-and-rufous Kingfisher



Celso B. Almeida

**Registros**

Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52553); Parque Zoobotânico e *Campus* da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; AC 0260, 0724); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64356, 64357); Rio Purus, localidades Santa Cruz Velha e Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Cruzeiro do Sul, Estrada Canela Fina (Guilherme, E. AC 408); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Município de Rio Branco, Estrada da Piçarreira (Marques, 2015); Rio Branco, Bairro Joafra (Doação IBAMA/CETAS; AC 795).

Habitat

Margens de rios, açudes e lagos, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Do Texas até a Argentina e em todo o Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2001).

Taxonomia

São reconhecidas cinco subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *C. a americana* (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 2001).

Status

Residente.

Registros

Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 48121); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48119, 48120); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); BR-364, Seringal Sardinha (Guilherme, E. AC 0113, 0119); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Floresta Estadual do Antimary, Ramal Uirapuru (Guilherme, E., MPEG 60511); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 63499, 63500); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal (Silva *et al.*, 2015); Município de Rio Branco, Estrada da Piçarreira (Marques, 2015); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, E. e equipe, anilhado).

Habitat

Margens de igarapés no interior de FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Da América Central (Nicarágua) ao Paraguai. Ocorre no norte e sudeste do Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2001).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2001).

Status


Residente.

udu-de-bico-largo – *Electron platyrhynchum* (Leadbeater, 1829)

Broad-billed Motmot



Robson Czaban

**Registros**

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 27326, 27327); Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35667, 35668, 35669, 35670); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 48113); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., 48114); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52047; Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52554); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal (Guilherme, E., MPEG 59929; Silva *et al.*, 2015); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60505, 60506; Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 59788); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63718); Município de Jordão, localidades Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Senador Guionard, BR 364, Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD.

Distribuição Geográfica

América Central e norte da América do Sul (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2001).

Taxonomia

São reconhecidas seis subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *E. p. orienticola* (Pinto & Camargo, 1954; Novaes, 1957, Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 2001).

Status

Residente.

juruva-ruiva – *Baryphthengus martii* (Spix, 1824)

Rufous Motmot



Ciro Albano

**Registros**

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 27328, 27329); Alto Rio Moa, Igarapé Amil, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52723); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); arredores da cidade de Assis Brasil (Guilherme, 2004, AC 0073); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60507, 60508); Floresta Estadual do Mogno, BR-364, a 6 Km da ponte sobre o Rio Tauari (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60509); Floresta Estadual do Antimary, Ramal Uirapuru (Guilherme, E., MPEG 60510); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 59787); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Rio Jurupari localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

América Central e noroeste da América do Sul (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2001).

Taxonomia


São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *B. m. martii* (Novaes, 1957, Pinto 1978, Hoyo *et al.*, 2001).

Status

Residente.



Edson Guilherme



Habitat
FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, campinarana.
Distribuição Geográfica
Do México até a Argentina e em quase todo o Brasil (Sick, 1997; Hoyo <i>et al.</i> , 2001).
Taxonomia
São reconhecidas 20 subespécies (Hoyo <i>et al.</i> , 2001). Duas formas ocorrem no estado do Acre: <i>M. m. cf. nattereri</i> , registrada em todo o Estado e <i>M. m. simplex</i> , registrada apenas na porção leste do Acre (Guilherme, 2009; 2012).
Status
Residente.

Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, 1958, MPEG 27332); Rio Juruá, Localidade Grajauzinho, próximo à Foz do Rio Grajáú (Novaes, 1957, 1958, MPEG 27333, 27335); Rio Juruá, arredores da cidade de Cruzeiro do Sul (Novaes, 1957, 1958, MPEG 27334); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52555); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 48115); Rio Juruá, Foz do Rio Tejo (Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 52049); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52048); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; AC 0026); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); BR-364, Seringal Sardinha (Guilherme, E. AC 0129); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005, Guilherme, E., MPEG 59930, 61524); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008), Estrada Transacreama (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61238, 61239); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 58837, 59786); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62021); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 63498); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63278); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64355); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64434, 64435); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63719); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão e localidades Pará, Veneza e Távora (Dantas, n. p. - 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Assis Brasil, Estrada da Pedreira, Localidade Museu (Guilherme, E., MPEG 70901); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Reserva Humaitá – Ufac, setor norte (Silva *et al.*, 2015); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Silva *et al.*, 2015); Município de Senador Guiomard, BR 364, Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015); BR 317, margem esquerda, área adjacente à Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015); Município de Rio Branco, Estrada da Piçarreira (Marques, 2015); Município de Plácido de Castro, BR-364, Ramal do 45 (Marques, 2015).


sovela-vermelha – *Galbalcyryhynchus purusianus* Goeldi, 1904
Purus Jacamar



Henrique Moreira



agulha-de-garganta-branca – *Brachygalba albogularis* (Spix, 1824)
White-throated Jacamar



Edson Guilherme



Registros

Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52053; Whittaker *et al.*, 2002); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 76392, 76393, 76394); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2008, 2010, MPEG 59789, 59790); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63287); Município de Manoel Urbano, ig. Macapá (Crozariol, M. A., Melo, T. N. e Leite, G., MNRJ 49524, 49526); Parque Zoobotânico da Ufac (Guilherme, E., 2015 [Wikiaves - WA1504869]).

Habitat

FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Restrita à Amazônia sul-ocidental (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2002). Espécie pertencente ao centro de endemismo Inambari (Haffer, 1978).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2002).

Status

Residente.

Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá, Município de Marechal Thaumaturgo, Rio Tejo, margem esquerda a aproximadamente 4 Km da foz (Whittaker & Oren, 1999; Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 52054, 52055); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 76395); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2008, MPEG 58838, 58839, 58840); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60516, 60517, 60518, 60519); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61240); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2008, 2011); Município de Plácido de Castro, BR-364, Ramal do 45 (Marques, 2015); arredores da cidade de Xapuri, ramal do beleza (Guilherme, E., obs. pess.).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Restrita à Amazônia sul-ocidental (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2002). Espécie pertencente ao centro de endemismo Inambari (Haffer, 1978; Cracraft, 1985).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2002).

Status

Residente.

ariramba-de-bico-amarelo – *Galbula albirostris* Latham, 1790
Yellow-billed Jacamar



Macho

Anselmo D'Alfonseca



ariramba-da-mata – *Galbula cyanicollis* Cassin, 1851
Blue-cheeked Jacamar



Macho

Robson Czaban



Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002, Suplemento).

Habitat

FOA com palmeiras, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Margem norte do Rio Solimões, das Guianas em direção à margem sul do Solimões, até o Peru (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2002).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2002).

Status

Residente.

Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 26756); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 49621, 48117); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62016, 62017); Município de Mâncio Lima, Estrada do Barão, Comunidade São Domingos (Guilherme, E., MPEG 62014, 62015); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Jurupari Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010, MPEG 69992); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA aluvial, campinarana.

Distribuição Geográfica

Margem sul do Solimões/ Amazonas. Do leste do Peru até Belém do Pará, no Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2002).

Taxonomia


Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2002).

Status

Residente.



Bertrando Campos

**Habitat**

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição GeográficaRestrita à Amazônia sul-ocidental (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2002). Espécie pertencente ao centro de endemismo Inambari (Haffer, 1978; Cracraft, 1985).**Taxonomia**Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2002).**Status**

Residente.

Comentários

Em Pinto & Camargo (1954) esta espécie foi nominada como *Galbula tombacea cyanescens*. Guilherme (2001), assinalou *G. tombacea* para o Parque Zoobotânico da Ufac no entanto, a nomenclatura correta para este táxon, na região, é *G. cyanescens*.

Registros

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35665, 35666); arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35662, 35663, 35664; Forrester, 1993); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 52556); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52556); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 76400, 76401, 76402); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004, MPEG 58366, 58367); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Floresta Estadual do Antimary, Ramal Uirapuru (Guilherme, E., MPEG 60512); Rio Liberdade, margem direita, próximo à Foz do Igarapé Novena (Guilherme, 2007, MPEG 60513); Floresta Estadual do Antimary, Localidade Limoeiro (Guilherme, E., MPEG 60514); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60515; Silva *et al.*, 2015); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61241, 61242, 61243); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 58841, 58842, 58843); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63486, 63625); Município de Jordão localidades Pará e Távora (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2008a, 2011); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64446); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63720, 63721); Rio Jurupari Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Município de Plácido de Castro, BR-364, Ramal do 45 (Marques, 2015).

ariramba-bronzeada – *Galbula leucogastra* Vieillot, 1817

Bronzy Jacamar



Anselmo D'Afonseca

**Registros**

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Município de Sena Madureira, Resex Cazumbá-Iracema (Moss, M., 2013 [Wikiaves - WA910864]).

Habitat

FOA com palmeiras.

Distribuição Geográfica

Em quase toda a Amazônia (Guiana Inglesa, Venezuela, Peru e Brasil) (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2002).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2002).

Status


Residente.

ariramba-do-paráiso – *Galbula dea* (Linnaeus, 1758)

Paradise Jacamar



Anselmo D'Afonseca

**Registros**

Arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35661); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64532); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64517); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

Em toda a Amazônia, desde as Guianas até a Bolívia (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2002).

Taxonomia

São reconhecidas quatro subespécies (Hoyo *et al.*, 2002). Duas formas distintas ocorrem no Acre: *G. d. phainopepla* e *G. d. amazonum* (Guilherme, 2009; 2012).

Status

Residente.

jacamaracu – *Jacamerops aureus* (Statius Muller, 1776)
Great Jacamar



Anselmo D'Alfonseca



Fêmea

Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 26772); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A., MPEG 48118); Rio Juruá, margem direita, Localidade Mato Grosso (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52051; Whittaker *et al.*, 2002); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Município de Jordão localidades Pará e Manaus (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Rio Jurupari Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010).

Habitat

FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

No sul da América Central e no norte da América do Sul (Amazônia) (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2002).


Taxonomia

São reconhecidas quatro subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *J. a. isidori* (Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2002).

Status

Residente.

macuru-de-testa-branca – *Notharchus hyperrhynchus* (Sclater, 1856)
White-necked Puffbird



Edson Guilherme



Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Jordão localidades Távora, Veneza, Pará e Manaus (Dantas, n. p. - 2010); Rio Jurupari localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Rio Branco, Estrada Transacrea, Ramal do Noca (Guilherme, E., 2015 ([Wikiaves - WA1770345])).

Habitat

FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Do sul do México ao norte da Bolívia. Ocorre no extremo-oeste da Amazônia brasileira (Hoyo *et al.*, 2002).

Taxonomia

Hoyo *et al.* (2002) considera esse táxon como subespécie de *N. macrorhynchus*.

Status

Residente.

Comentários

Em Whittaker *et al.*, (2002) esta espécie foi nominada como *Notharchus macrorhynchus*.

macuru-de-peito-marrom – *Notbarchus ordii* (Cassin, 1851)
Brown-banded Puffbird



Margi Moss



macuru-pintado – *Notbarchus tectus* (Boddaert, 1783)
Pied Puffbird



Robson Czaban



Registros

Alto Rio Moa, margem esquerda, Localidade Morro Queimado, Serra da Jaquirana (Whitney *et al.*, n. p. - 1997; Alvarez-Alonso & Whitney, 2003, MPEG 52726, 52727); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62025).

Habitat

FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

Ocorre localmente no norte da América do Sul (Venezuela, Brasil, Peru e Bolívia) (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2002).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2002).

Status

Residente.

Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Rio Jurupari Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Fazenda Experimental Catuaba (Xavier, R. S. 2013 [Wikiaves - WA1525605]).

Habitat

FOA – aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Sul da América Central e norte da América do Sul (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2002).

Taxonomia

São reconhecidas quatro subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *N. t. picatus* (Hoyo *et al.*, 2002).

Status

Residente.

rapazinho-de-boné-vermelho – *Bucco macrodactylus* (Spix, 1824)

Chestnut-capped Puffbird



Robson Czaban

**rapazinho-carijó** – *Bucco tamatia* Gmelin, 1788

Spotted Puffbird



Robson Czaban

**Registros**

Arredores da cidade de Rio Branco (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35672); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52559, 52560); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); arredores da cidade de Assis Brasil (Guilherme, 2004, AC 0079); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60520; Silva *et al.*, 2015); Estrada Transacreeana (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62022, 62023, 62024); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 63629); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63280); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63490, 63489); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64533); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64438); Município de Senador Guiomard, Localidade Bonal (Guilherme, E. & Souza, G. AC 562); Município de Rio Branco, Estrada da Piçarreira (Marques, 2015); Município de Plácido de Castro, BR-364, Ramal do 45 (Marques, 2015).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD.

Distribuição Geográfica

Em toda a Amazônia (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2002).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2002).

Status

Residente.

Comentários

Em Hoyo *et al.* (2002) este táxon foi nominado como *Argicus macrodactylus*.

Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002, Suplemento); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004, MPEG 58372); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009).

Habitat

FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Em toda a Amazônia (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2002).

Taxonomia

São reconhecidas quatro subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *B. t. pulmentum* (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 2002).

Status

Residente.

Comentários

Em Hoyo *et al.* (2002) este táxon foi nominado como *Nystactes tamatia*.

rapazinho-de-colar – *Bucco capensis* Linnaeus, 1766

Collared Puffbird



Sílvia Faustino Linhares

**Registros**

Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52557, 52558); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48129); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 76399); BR-364, Seringal Sardinha (Guilherme, E. AC 0110); Parque Nacional da Serra do Divisor, 106 Km a sudoeste de Cruzeiro do Sul (Aleixo, A. & Polleto, F, MPEG 58009); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD.

Distribuição Geográfica

Norte da América do Sul (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2002).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2002).


Status

Residente.


rapazinho-estriado-do-oeste

Nystalus obamai Whitney, Piacentini, Schunck, Aleixo, Sousa, Silveira & Rêgo, 2013

Western Striolated-Puffbird



Tancredo Maia Filho

**Registros**

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35673, 35674, 35675); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62026, 62027, 62028); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63279); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64437); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão e localidades Veneza e Pará (Dantas, n. p. - 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Amazônia ocidental. Ocorre na porção amazônica do Equador, Peru, Bolívia e sudoeste da Amazônia brasileira (Whitney *et al.* 2013a).

Taxonomia

Táxon pertencente ao grupo *N. striolatus* recém-nominado como espécie plena por Whitney *et al.* (2013a).

Status

Residente.

Nome anterior

Nystalus striolatus.

Comentários

Em Pinto & Camargo (1954) este táxon foi nominado como *Bucco striolatus*.

barbudo-de-coleira – *Malacoptila semicineta* Todd, 1925
Semicollared Puffbird



Edson Guilherme



barbudo-de-pescoço-ferrugem – *Malacoptila rufa* (Spix, 1824)
Rufous-necked Puffbird



Mathias Singer



Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MZUSP 42185); Alto Rio Moa, margem esquerda, Serra da Jaquirana (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52728); Rio Tejo, a aproximadamente 5 Km da foz, REAJ (Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 52052); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2008, MPEG 58846, 59792); Floresta Estadual do Mogno, BR-364, a 6 Km da ponte sobre o Rio Tauari (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60522); BR-364 a 40 Km da ponte sobre o Rio Liberdade, margem direita (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60523, 60524); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Floresta Estadual do Antimary, Ramal Uirapuru (Guilherme, E., MPEG 60525); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61246, 61247); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63283, 63284); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64358); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Município de Senador Guiomard, BR 364, Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Na Amazônia sul ocidental brasileira e no sudeste do Peru e norte da Bolívia (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2002). Espécie pertencente ao centro de endemismo Inambari (Haffer, 1978; Crraft, 1985).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2002).

Status

Residente.

Comentários

Em Novaes (1957) esta espécie foi nominada como *M. fusca semicineta*.

Registros

ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013, AC 710).

Habitat

FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Calha sul do Solimões/Amazonas no Brasil, nordeste do Peru e Bolívia (Hoyo *et al.*, 2002).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *M. r. rufa* (Hoyo *et al.*, 2002).

Status

Residente.

macuru – *Nonnula rubecula* (Spix, 1824)
Rusty-breasted Nunlet



Emerson Kaseker



Registros

Alto Rio Moa, margem direita (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52724, 52725); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002, Suplemento).

Habitat

FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Distribuição disjunta, no norte da América do Sul (Amazônia) e no sudeste do Brasil até o Paraguai e Argentina (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2002).

Taxonomia

São reconhecidas sete subespécies. A forma que ocorre no Acre é, provavelmente, a *N. r. cineracea* (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 2002).


Status

Residente.

freirinha-amarelada – *Nonnula sclateri* Hellmayr, 1907
Fulvous-chinned Nunlet



Tomaz Melo



Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MZUSP 42186, 42187); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker & Oren, 1999, MPEG 48125, 48126, 48134); Rio Ouro Preto, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52885); Igarapé Preto, afluente do Rio Juruá-mirim, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52886); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004, MPEG 58368, 58369, 58370); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2008); Floresta Estadual do Mogno, BR-364, a 6 Km da ponte sobre o Rio Tauari (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60521); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62029); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2008a, 2011); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64439); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013, AC 713); Município de Porto Acre, Floresta Humaitá (Melo, T. N., 2014 [Wikiaves - WA1371821]); Parque Estadual Chandless (Melo, T. N., 2014 [Wikiaves - WA1544037]).

Habitat

FOA com bambus, FOA/FOD aluvial com bambus, FOD com bambus.

Distribuição Geográfica

Amazônia sul-ocidental (Brasil, Peru e Bolívia) (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2002). Espécie pertencente ao centro de endemismo Inambari (Haffer, 1978; Crraft, 1985). Esta espécie está associada às florestas com bambus no sudoeste amazônico (Stotz *et al.*, 1996).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2002).

Status

Residente.

freirinha-de-coroa-castanha – *Nonnula ruficapilla* (Tschudi, 1844)


Rufous-capped Nunlet



Ciro Albano

**chora-chuva-preto • bico-de-brasa** – *Monasa nigrifrons* (Spix, 1824)

Black-fronted Nunbird



Edson Guilherme

**Registros**

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 76409); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61249); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 59791).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Margem sul do Amazonas no Brasil e também no sudeste do Peru e norte da Bolívia (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2002). Espécie associada às florestas com bambus no sudoeste amazônico (Stotz *et al.*, 1996).

Taxonomia

São reconhecidas quatro subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *N. r. ruficapilla* (Hoyo *et al.*, 2002).

Status

Residente.

Registros

Arredores da cidade de Rio Branco (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35683); Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35684, 35685, 35686, 35687); arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35688, 35689, 35690); Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 27047, 27048, 27050, 27051); Rio Juruá, arredores da cidade de Cruzeiro do Sul (Novaes, 1957, MPEG 27049, 27055); Município de Capixaba, Fazenda Campo Lindo (Hidasi, J., CPJH 1189); Rio Juruá, Foz do Rio Tejo (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52050; Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52561); Parque Zoológico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001, AC 629, 0801); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 76397); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Floresta Estadual do Antimary, Localidade Limoeiro (Guilherme, E., MPEG 60526); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63488; Silva *et al.*, 2015); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 58844); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64359); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64436); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63722); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62030); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Rio Branco, Estrada da Piçarreira (Guilherme, E., AC 375); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Silva *et al.*, 2015); Município de Rio Branco, Estrada da Piçarreira (Marques, 2015); Município de Plácido de Castro, BR-364, Ramal do 45 (Marques, 2015).

chora-chuva-preto • bico-de-brasa – *Monasa nigrifrons* (Spix, 1824)
Black-fronted Nunbird

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, área aberta com cultivares.

Distribuição Geográfica

Norte da América do Sul, da Colômbia até a Bolívia e em quase todo o Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2002).


Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *M. n. nigrifrons* (Pinto & Camargo, 1954; Novaes, 1957; Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 2002).

Status

Residente.

chora-chuva-de-cara-branca – *Monasa morphoens* (Hahn & Küster, 1823)
White-fronted Nunbird



Robson Czaban

**Registros**

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35676, 35677, 35678, 35679, 35680, 35681, 35682); Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 27034, 27035, 27036); Município de Capixaba, Fazenda Campo Lindo (Hidasi, J., CPJH 1190); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48130); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52562, 52563); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Ramal Nabor Júnior, Km 26 (Guilherme, E., MPEG 60527, 60528); Município de Rio Branco, Estrada Transacrea (AC-090) Km 60 (Guilherme, E., MPEG 61402, 61403, 61519, 61520, 61399, 61400, 61401); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61248); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 59793); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Município de Mâncio Lima, Estrada do Barão, Comunidade São Domingos (Guilherme, E., MPEG 62031); Município de Jordão Localidade Távora (Dantas, n. p. - 2010, MPEG 71383); Município de Jordão localidades Pará, Manaus e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal (Silva *et al.*, 2015).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD.

Distribuição Geográfica

Distribuição disjunta, América Central, norte e sudeste da América do Sul (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2002).

Taxonomia

São reconhecidas sete subespécies (Hoyo *et al.*, 2002). Segundo Hoyo *et al.* (2002), a forma que ocorre no sudoeste da Amazônia é a *M. m. peruana*. Esta forma foi, inclusive, reconhecida por Novaes (1957) como de ocorrência no oeste do Acre. Contudo, Pinto & Camargo (1954) identificaram os espécimes coletados no leste do Acre (rio Iquiri) como pertencentes à forma *M. m. rikeri* (Guilherme, 2009).

Status

Residente.

chora-chuva-de-bico-amarelo – *Monasa flavirostris* Strickland, 1850
Yellow-billed Nunbird



Edson Guilherme



urubuzinho – *Chelidoptera tenebrosa* (Pallas, 1782)
Swallow-winged Puffbird



Tancredo Maia Filho



Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005; Crozariol, M. A., Melo, T. N. e Leite, G., MNRJ 49527, 49528); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61244); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme 2008, 2010); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010).

Habitat

FOA com bambus.

Distribuição Geográfica

Amazônia ocidental (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2002). Espécie associada às florestas com bambus no sudoeste amazônico (Stotz *et al.*, 1996); (Guilherme & Santos, 2009).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2002).

Status

Residente.

Registros

Rio Juruá, Estirão do Carmo, próximo à Foz do Rio Grajaú (Novaes, 1957, MPEG 27249); Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 27241, 27250, 27252); arredores da cidade de Rio Branco (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35695); Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35696); arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35691, 35692, 35693, 35694); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 76398); Parque Zoológico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63487); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63282); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63285); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63723); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, área aberta com cultivares.

Distribuição Geográfica

Centro-norte da América do Sul (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2002).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *C. t. tenebrosa* (Pinto & Camargo, 1954; Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2002).

Status

Residente.

capitão-de-coroa – *Capito aurovirens* (Cuvier, 1829)
Scarlet-crowned Barbet



Robson Czaban



Registros
Município de Cruzeiro do Sul, Localidade Olivença (Gomes, G. C., 2013 [Wikiaves - WA891318]).
Habitat
FOA aluvial.
Distribuição Geográfica
Oeste da Amazônia brasileira, sudeste da Colômbia, leste do Equador e nordeste do Peru (Hoyo <i>et al.</i> , 2002).
Taxonomia
Espécie monotípica (Hoyo <i>et al.</i> , 2002).
Status
Residente.

capitão-de-frente-dourada – *Capito auratus* (Dumont, 1816)
Gilded Barbet



Robson Czaban



Fêmea

Registros
<i>C. a. orosae</i> – Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 26773, 26774, 26775, 26776, 26777, 26778); Rio Juruá, arredores da cidade de Cruzeiro do Sul (Novaes, 1957, MPEG 26779); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 48131, 48132, 48133); Rio Tejo, margem esquerda a aproximadamente 5 Km da foz (Whittaker <i>et al.</i> , 2002, MPEG 52056); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52057); Rio Juruá, margem direita, Localidade Mato Grosso (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52058, Whittaker <i>et al.</i> , 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63724, 63725); Município de Jordão, localidades Távora, Manaus, Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo <i>et al.</i> , n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme <i>et al.</i> , n. p. - 2013).
<i>C. a. insperatus</i> – Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35671); arredores da cidade de Manoel Urbano (Silva, G. P., MPEG 32991, 35335, 37471); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; AC 0411); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63501, 64566); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre <i>et al.</i> 2010); Município de Rio Branco, Ramal Piçarreira (Crozariol, M. A., Melo, T. N. e Leite, G., MNRJ 49511).
Habitat
FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, campinarana.
Distribuição Geográfica
Leste do Peru, norte da Bolívia e Amazônia sul-ocidental brasileira (Hoyo <i>et al.</i> , 2002).
Taxonomia
São reconhecidas oito subespécies (Hoyo <i>et al.</i> , 2002). Duas formas ocorrem no estado do Acre: <i>C. a. orosae</i> , registrada na porção oeste do Estado e <i>C. a. insperatus</i> , com distribuição mais comum na porção leste do Acre (Guilherme, 2009; 2012).
Status
Residente.


capitão-de-bigode-limão – *Eubucco richardsoni* (Gray, 1846)

Lemon-throated Barbet



Macho

Marco Guedes

**capitão-de-colar-amarelo** – *Eubucco tucinkae* (Seilern, 1913)

Scarlet-hooded Barbet



Macho

Edson Guilherme

**Registros**

Arredores da cidade de Plácido de Castro (Forrester, 1993, observada); Rio Juruá, Foz do Rio Tejo (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52059, 52060 Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52564, 52565); Parque Nacional da Serra do Divisor, 106 Km a sudoeste de Cruzeiro do Sul (Aleixo, A. & Polleto, F, MPEG 58010, 58011); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63726, 63727); Município de Jordão, localidades Távora, Manaus, Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD.

Distribuição Geográfica

Amazônia ocidental (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2002).

Taxonomia

São reconhecidas quatro subespécies. A forma que ocorre no Acre parece ser a *E. r. purusianus* (Hoyo *et al.*, 2002).

Status

Residente.

Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá, Médio Rio Tejo (Whittaker & Oren, 1999; Whittaker *et al.*, 2002); Rio Juruá, Foz do Igarapé São João (Whittaker & Oren, 1999); Parque Nacional da Serra do Divisor, Município de Porto Walter, Igarapé São Luiz (Whittaker & Oren, 1999); Parque Nacional da Serra do Divisor, Alto Rio Moa (Whitney *et al.*, n. p. - 1997; Whitney & Oren, 2001b, MPEG 52729); Floresta Estadual do Mogno, BR-364, a 6 Km da ponte sobre o Rio Tauari (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60529); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2008, 2010); Município de Assis Brasil (DeLuca, 2012).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD submontana, FOD.

Distribuição Geográfica

Restrita ao leste do Peru, sudoeste da Bolívia e sudoeste da Amazônia brasileira. No Brasil, só foi registrada no estado do Acre (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2002). Espécie restrita ao centro de endemismo Inambari (Haffer, 1978, Cracraft, 1985).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2002).

Status

Residente.


tucano-grande-de-papo-branco – *Ramphastos tucanus* Linnaeus, 1758
White-throated Toucan




Silvia Faustino Linhares



tucano-de-bico-preto – *Ramphastos vitellinus* Lichtenstein, 1823
Channel-billed Toucan



Robson Czaban



Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, 1958, MPEG 26739); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52065; Whittaker *et al.*, 2002); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); arredores da cidade de Assis Brasil (Guilherme, 2004, AC 0055); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); BR-364 a 40 Km da ponte sobre o Rio Liberdade, margem direita (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60534); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61251); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 58845, 59833); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Município de Jordão, localidades Távora, Manaus, Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2007, 2011); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 63506); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63728); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010).

Habitat

Dossel e borda de FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

Norte da América do Sul (Amazônia) (Hoyo *et al.*, 2002).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *R. t. cuiveri* (Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2002).

Status

Residente.

Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 26743, 26744); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52566); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); arredores da cidade de Assis Brasil (Guilherme, 2004, AC 0040); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Floresta Estadual do Rio Gregório, próximo à ponte sobre o Rio Acuraua (Guilherme, 2007, MPEG 60535, 60536); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Município de Jordão, localidades Távora, Manaus, Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63296); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010, MPEG 69990); Rio Jurupari localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com palmeiras, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Norte e sudeste da América do Sul (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2002).


Taxonomia

São reconhecidas quatro subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *R. v. culminatus* (Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2002).


Status

Residente.

tucaninho-de-nariz-amarelo – *Aulacorhynchus atrogularis* (Sturm & Sturm, 1841)
Clack-throated Toucanet



Marco Guedes



Registros

Arredores da cidade de Plácido de Castro (Forrester, 1993, observada); Rio Tejo, a aproximadamente 5 Km da foz, REAJ (Whittaker & Oren, 1999; Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 52064); Rio Juruá, margem direita, Município de Mâncio Lima (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52730, 52731); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2008, 2010); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010, MPEG 66988, 66989); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62034); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63299).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

América Central e extremo-oeste da América do Sul (Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia) (Hoyo *et al.*, 2002). No Brasil, só foi registrada, até o momento, no estado do Acre (Sick, 1997; Whittaker & Oren, 1999; Guilherme & Dantas, 2011; Guilherme & Borges, 2011).

Taxonomia

Este táxon foi considerado por muito tempo como subespécie de *A. prasinus* (Hoyo *et al.*, 2002, Navarro *et al.*, 2001).


Status

Residente.

saripoca-de-coleira – *Selenidera reinwardtii* (Wagler, 1827)
Golden-collared Toucanet



Ricardo Plácido



Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, 1958, MPEG 26647); Rio Juruá, arredores da cidade de Cruzeiro do Sul (Novaes, 1957, 1958, MPEG 26648); Município de Rio Branco, Fazenda Campo Lindo (Hidasi, J., LSUMZ 64940, 64941); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52567, 52568); Rio Tejo, a aproximadamente 5 Km da foz, REAJ (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52061; Whittaker *et al.*, 2002); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52062); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Município de Jordão Localidade Távora (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63293, 63292); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64360, 64361); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD.

Distribuição Geográfica

Amazônia ocidental, da Colômbia ao norte da Bolívia e noroeste do Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2002).

Taxonomia


São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *S. r. langsdorffii* (Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2002).

Status

Residente.



Robson Czaban

**Registros**

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35698, 35699); Rio Abunã, margem esquerda (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35700); Município de Capixaba, Fazenda Campo Lindo (Hidasi, J., CPJH 1217); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada Transacreeana (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61252); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Floresta Estadual do Antimary, Ramal Uirapuru (Guilherme, E., obs. pess.); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64362, 64413, 64414); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 64564); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, E., obs. pess.); Município de Plácido de Castro, BR-364, Ramal do 45 (Marques, 2015).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Norte da América do Sul. Ocorre na Amazônia, ao sul do Solimões/ Amazonas e na Mata Atlântica (Pernambuco e Alagoas) (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2002).

Taxonomia


São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *P. i. humboldti* (Pinto & Camargo, 1954; Hoyo *et al.*, 2002).

Status

Residente.

Comentários

Em Pinto & Camargo (1954) este táxon foi nominado como *P. viridis humboldti*.



Anselmo D'Afonseca

**Registros**

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 26640, 26641); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 48135, 48136); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 58847, 59794); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal (Guilherme, E., MPEG 59935); Floresta Estadual do Mogno, BR-364, a 6 Km da ponte sobre o Rio Tauari (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60530); BR-364 a 40 Km da ponte sobre o Rio Liberdade, margem direita (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60532, 60533); Floresta Estadual do Antimary, Localidade Limeiro (Guilherme, E., MPEG 60531); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63295, 63294); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., obs. pess.); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., obs. pess.); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

No noroeste da América do Sul, da Colômbia até a Bolívia e na Amazônia ocidental brasileira (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2002).

Taxonomia

Em Hoyo *et al.* (2002), este táxon é considerado uma subespécie de *P. azara*.

Status

Residente.

Comentários

Em Rasmussen *et al.* (2005) este táxon foi nominado como *P. azara*.

araçari-castanho – *Pteroglossus castanotis* Gould, 1834
Chestnut-eared Aracari



Bertrando Campos



araçari-castanho – *Pteroglossus castanotis* Gould, 1834
Chestnut-eared Aracari

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies (Hoyo *et al.*, 2002). Ambas as formas ocorrem no Acre: *P. c. australis*, registrada mais comumente no extremo-oeste do Estado, e *P. c. castanotis* mais amplamente distribuída no Estado (Guilherme, 2009, 2012).

Status

Residente.

Comentários

Apesar de só haver peles coletadas de *P. c. australis* no extremo-oeste do Acre (Guilherme, 2009), já observei a forma *australis* no leste e a forma nominal no extremo-oeste do Estado. Hoje estou convicto que ambas as formas (ou híbridos delas) ocorrem em todo o estado do Acre.

Registros

P. c. australis – Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 26747); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Município de Mâncio Lima, Estrada do Barão, Comunidade São Domingos (Guilherme, E., MPEG 62032, 62033);
P. c. castanotis – Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35697); arredores da cidade de Rio Branco, Seringal Nova Empresa (Hidasi, J., CPJH 2301); Parque Zoobotânico e *Campus* da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; MPEG 59933); BR-364, Seringal Sardinha (Guilherme, E. AC 0121); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal (Guilherme, E., MPEG 59934; Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 63505); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64411, 64412); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63729); Município de Jordão Localidade Manaus (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha, e Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA/FOD aluvial, FOD, FOD submontana, área aberta com cultivares, ambientes urbanos.


Distribuição Geográfica

Oeste da América do Sul, da Colômbia até a Argentina (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2002).

araçari-mulato – *Pteroglossus beaubarnaisii* Wagler, 1831
Curl-crested Aracari



Celso B. Almeida



Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52063; Whittaker *et al.*, 2002); arredores da cidade de Assis Brasil (Guilherme, 2004, AC 0058); Parque Nacional da Serra do Divisor, 106 Km a sudoeste de Cruzeiro do Sul (Aleixo, A. & Polleto, F, MPEG 58013, 58014, 58015); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63502, 63503, 63504); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Município de Jordão, localidades Távora, Manaus e Pará (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2008a; 2011); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64500); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63723, 63730, 63731); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Amazônia ocidental, Peru, Brasil e Bolívia (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2002).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2002).

Status

Residente.

pica-pau-anão-dourado – *Picumnus aurifrons* Pelzeln, 1870
Bar-breasted Piculet



Robson Czaban



Macho

Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002, Suplemento); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Município de Feijó, rio Jurupari (Melo, T. N., 2015 [Wikiaves - WA1702048]).

Habitat

FOA com palmeiras, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Margem sul do Rio Solimões/Amazonas (Brasil e Peru) (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2002).

Taxonomia

Sete subespécies são reconhecidas. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *P. a. juruanus* (Hoyo *et al.*, 2002).

Status

Residente.

Comentários


Em Whittaker *et al.* (2002) este táxon foi nominado como *P. borbae*.



Macho



Tomaz Melo



Macho



Robson Czaban

Registros

Arredores da cidade de Rio Branco (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35644); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48141); Alto Rio Moa, margem direita, Igarapé Ramon, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52732); Parque Zoobotânico e *Campus* da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; AC 0004); BR-364, Seringal Sardinha (Guilherme, E. AC 136, 137); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 63507, 63508, 63509); Rio Chandless, margem esquerda, a aproximadamente 3 Km da foz (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63298); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013, AC 688); Município de Rio Branco, Estrada da Piçarreira (Marques, 2015).

Habitat

FOA com bambus e/ou cipós, FOA aluvial com bambus, FOD com bambus.

Distribuição Geográfica

Noroeste da América do Sul, da Colômbia até a Bolívia (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2002).

Taxonomia

Três subespécies são reconhecidas. A forma que ocorre no Acre parece ser a *P. r. grandis* (Hoyo *et al.*, 2002).

Status

Residente.

Registros

Flona Macauã (Rego *et al.*, 2009, MZUSP 76408); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Rego *et al.*, 2009; Guilherme & Dantas, 2011); Cidade de Rio Branco (Souza, B., 2011 [Wikiaves - WA373823]); Município de Rio Branco, *Campus* da Ufac (Guilherme, E., AC 446); Município de Rio Branco, Ramal Piçarreira (Croزاریol, M. A., Melo, T. N. e Leite, G., MNRJ 49512); Município de Rio Branco, Ramal Jarinal (Melo *et al.*, 2015); Horto Florestal, Rio Branco (Guilherme, 2014 [Wikiaves - WA1438858]).

Habitat

FOA com bambus.

Distribuição Geográfica

Ocorre localmente no sudeste do Peru (Schulenberg *et al.*, 2007) e nas terras baixas da Amazônia sul-ocidental brasileira (Acre). Espécie pertencente ao centro de endemismo Inambari (Haffer, 1978).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2002).

Status

Residente.

Comentários

Esta espécie era considerada endêmica do Peru (Schulenberg *et al.*, 2007). Os registros feitos no Acre foram os primeiros para o Brasil (Rego *et al.*, 2010).



Edson Guilherme



Fêmea

Registros

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35631, 35632, 35633, 35634, 35635, 35636); Rio Abunã, margem esquerda (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35637); Rio Juruá, Estirão do Carmo, próximo à Foz do Rio Grajaú (Novaes, 1957, MPEG 26790); Rio Juruá, margem direita, Localidade Mato Grosso (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52071, Whittaker *et al.*, 2002); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 76403); Parque Zoobotânico e *Campus* da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005; Guilherme, E., MPEG 59931); Floresta Estadual do Mogno, BR-364, a 6 Km da ponte sobre o Rio Tauari (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60541); Floresta Estadual do Antimary, Localidade Limoeiro (Guilherme, E., MPEG 60542); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Estrada Transacrea (AC-090) Km 60, margem direita (Guilherme, E., MPEG 61406); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Município de Jordão, localidades Távora, Manaus, Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62039); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 63511, 63512); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., AC 190, 191; MPEG 63634); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64535); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63733); Rio Purus, localidades Santa Cruz Velha e Seringal Terra Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, campinarana, área aberta com pastagem ou cultivares, ambientes urbanos.

Distribuição Geográfica

Em toda a Amazônia, das Guianas até a Bolívia (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2002).

Taxonomia


Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2002).

Status

Residente.



Macho



Registros

Arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35643); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52570); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 76406); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 58850); Estrada Transacrea (AC-090) Km 60, margem esquerda e direita (Guilherme, E., MPEG 61530, 61405); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, E., obs. pess.); Município de Senador Guiomard, Localidade Bonal (Guilherme, E. & Souza, G., AC 549); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal e mata ripária adjacente (Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015).

Habitat

FOA com bambus, FOA aluvial, FOD.

Distribuição Geográfica

Na Amazônia (Colômbia, Venezuela, Brasil, Equador, Peru e Bolívia) e na Mata Atlântica (Alagoas e Bahia) (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2002).

Taxonomia

São reconhecidas quatro subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *V. a. bilaris* (Pinto & Camargo, 1954; Hoyo *et al.*, 2002).

Status

Residente.



Fêmea



Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 76407); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada Transacrea (AC-090) Km 60, margem esquerda (Guilherme, E., MPEG 61404); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61259, 61260, 61261, 61262); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 63550); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64536); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64442); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63734); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Município de Senador Guiomard, Localidade Bonal (Guilherme, E. & Souza, G., AC 572); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal (Silva *et al.*, 2015); Município de Porto Acre, mata ripária adjacente à Reserva Humaitá, setor norte (Marques, 2015); BR 317, margem esquerda, área adjacente à Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Silva *et al.*, 2015); Município de Rio Branco, Estrada da Piçarreira (Marques, 2015); Município de Plácido de Castro, BR-364, Ramal do 45 (Marques, 2015).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD.

Distribuição Geográfica

Região central e norte da América do Sul, da Venezuela ao Paraguai. Ocorre em todo o Brasil central e amazônico (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2002).

Taxonomia

São reconhecidas nove subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *V. p. agilis* (Hoyo *et al.*, 2002).


Status

Residente.

pica-pau-de-garganta-branca – *Piculus leucolaemus* (Natterer & Malherbe, 1845)
White-throated Woodpecker



Tomaz Melo



Fêmea

Registros

Igarapé Preto, afluente do Rio Juruá-mirim, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52887); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52068; Whittaker *et al.*, 2002); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Norte da América do Sul (Amazônia) (Hoyo *et al.*, 2002). No Brasil, ocorre do Acre ao Pará (Sick, 1997).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2002).

Status

Residente.

pica-pau-bufador – *Piculus flavigula* (Boddaert, 1783)
Yellow-throated Woodpecker



Celso B. Almeida



Macho

Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52068; Whittaker *et al.*, 2002); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Município de Jordão, localidades Pará e Távora (Dantas, n. p. - 2010).

Habitat

FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

Norte da América do Sul (Amazônia) e na Mata Atlântica brasileira (Hoyo *et al.*, 2002).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *P. f. magnus* (Hoyo *et al.*, 2002).


Status

Residente.



Macho

Celso B. Almeida



João Quental



Macho

Registros

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35638, 35639); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 48139); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62036).

Habitat

FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

Do Panamá até a Argentina e em quase todo o Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2002).

Taxonomia

São reconhecidas nove subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *P. c. laemostictus* (Pinto & Camargo, 1954; Hoyo *et al.*, 2002).

Status

Residente.

Registros

Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 48140); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 76404); Parque Zoobotânico e *Campus* da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; Guilherme, E., MPEG 59932); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60543); Estrada Transacreana (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61258); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62035); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64363); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63735, 63736); Rio Jurupari localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Branco, Bairro Joafra (Doação IBAMA/CETAS; AC 799).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Norte da América do Sul (Hoyo *et al.*, 2002).

Taxonomia

São reconhecidas seis subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *C. p. guttatus* (Hoyo *et al.*, 2002).

Status

Residente.



Robson Czaban



Macho

Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 26822); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Jordão Localidade Távora (Dantas, n. p. - 2010); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62037); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63737, 63738, 63739); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

Noroeste da América do Sul (Amazônia) (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2002).

Taxonomia

São reconhecidas quatro subespécies. A forma que ocorre no Acre é, provavelmente, a *C. g. grammicus* (Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2002).

Status

Residente.



Ricardo Plácido



Macho

Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 26841); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52569); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52066; Whittaker *et al.*, 2002); BR-364, Seringal Sardinha (Guilherme, E. AC 0109); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Floresta Estadual do Antimary, Ramal Uirapuru (Guilherme, E., MPEG 60540); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61253); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62038); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63740); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Parque Zoológico da Ufac (Guilherme, E., 2014 [Wikiaves - WA1558662]).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Norte da América do Sul (Amazônia) (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2002).

Taxonomia

São reconhecidas seis subespécies (Hoyo *et al.*, 2002). Duas formas parecem ocorrer no Acre. Um espécime coletado no Alto Juruá (MPEG 26841) foi atribuído a *C. e. jumanus* (Novaes 1957). Entretanto, a maioria dos espécimes do Acre apresenta a coloração do píleo e das partes superiores e inferiores mais escura do que a do espécime coletado por F. Novaes no Seringal Oriente. A presença deste padrão escuro da plumagem torna estes espécimes mais semelhantes à descrição da forma *C. e. citreopygius* (Hoyo *et al.*, 2002).

Status

Residente.



Fêmea

Anselmo D'Alfonseca



Peru

Bolivia



Macho

Robson Czaban



Peru

Bolivia

Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 26820); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 48137, 48138); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Floresta Estadual do Rio Gregório, próximo à ponte sobre o Rio Acuraua (Guilherme, 2007, MPEG 60537); Ramal Nabor Júnior, Km 26 (Guilherme, E., MPEG 60538, 60539); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63297); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Norte da América do Sul (Amazônia) e no norte da mata Atlântica brasileira (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2002).

Taxonomia

São reconhecidas quatro subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *C. f. peruvianus* (Novaes, 1954; Hoyo *et al.*, 2002).

Status

Residente.

Registros

Rio Tejo, Localidade Machadinho (Whittaker & Oren, 1999); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Tartaruga (Whittaker & Oren, 1999); Rio Tejo, Localidade Santo Antônio (Whittaker & Oren, 1999); Rio Amônia, Localidade Quieto (Whittaker & Oren, 1999); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 76405); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004, MPEG 58371); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2008; 2010); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61254, 61255, 61256, 61257); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2008a, 2011); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64443); Município de Assis Brasil, Estrada da Pedreira, Localidade Museu (Guilherme, E., MPEG 70902); Parque Zoobotânico da Ufac (Melo, T. N., 2013 [Wikiaves - WA1188421]); Reserva Florestal Humaitá, Ufac (Kaseker, E. P., 2013 [Wikiaves - WA972554]); Fazenda Experimental Catuaba (Czaban, 2015 [Wikiaves - WA1600158]).

Habitat

FOA com bambus, FOA aluvial com bambus.

Distribuição Geográfica

Noroeste da América do Sul (Equador, Brasil, Peru e Bolívia) (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2002).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *C. s. exsul* (Whittaker & Oren, 1999; Hoyo *et al.*, 2002).

Status

Residente.



Fêmea

Anselmo D'Alfonseca



Peru

Bolivia

Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); BR-364, Seringal Sardinha (Guilherme, E., AC 0130); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 59795); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Município de Jordão localidades Pará e Távora (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011); Rio Jurupari Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Norte da América do Sul (Amazônia) e em parte da mata Atlântica brasileira (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2002).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *C. t. occidentalis* (Hoyo *et al.*, 2002).

Status

Residente.



Peru

Bolivia

Tomaz Melo



Macho

Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); BR-364 a 40 Km da ponte sobre o Rio Liberdade, margem direita (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60545); Floresta Estadual do Mogno, BR-364, a 6 Km da ponte sobre o Rio Tauari (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60544); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64444); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Município de Jordão localidades Pará, Manaus, Veneza e Távora (Dantas, n. p. - 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); *Campus* da Universidade Federal do Acre (Guilherme, E., 2014 [Wikiaves - WA1369204]).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Do México até a Argentina e em todo o Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2002).

Taxonomia

São reconhecidas cinco subespécies (Hoyo *et al.*, 2002). No Acre, o padrão das estrias da região ventral dos espécimes parece representar uma forma intermediária entre *D. l. lineatus* e *D. l. fuscipennis* (Guilherme, 2009).

Status

Residente.




Macho

Anselmo D'Alfonseca



Peru

Bolivia



Macho

Anselmo D'Alfonseca



Peru

Bolivia

Registros

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35640, 35641); Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 26860); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Rio Juruá, margem direita, Localidade Mato Grosso (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52070, Whittaker *et al.*, 2002); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 58848, 58849); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., obs. pess.); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., obs. pess.); Município de Jordão localidades Pará, Manaus, Veneza e Távora (Dantas, n. p. - 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Parque Zoológico da Ufac (Guilherme, E., 2015 [Wikiaves - WA1719325]).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, área aberta com pastagens ou cultivares.

Distribuição Geográfica

Em toda a Amazônia (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2002).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *C. r. trachelopyrus* (Pinto & Camargo, 1954; Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2002).

Status

Residente.

Comentários

Em Pinto & Camargo (1954) este táxon foi nominado como *Scapanus rubricollis* e em Novaes (1957) como *Phloeocastes rubricollis*.

Registros

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35642); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52069; Whittaker *et al.*, 2002); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Parque Zoológico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 58851, 58852, 58853); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Floresta Estadual do Antimary, Ramal Uirapuru (Guilherme, E., MPEG 60546); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão (Dantas, n. p. - 2010); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62040); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E. 63631); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63632); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63741); Rio Jurupari localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, área aberta com pastagem ou cultivares.

Distribuição Geográfica

Do Panamá até a Argentina e em quase todo o Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2002).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *C. m. melanoleucos* (Pinto & Camargo, 1954; Hoyo *et al.*, 2002).

Status

Residente.


Comentários

Em Pinto & Camargo (1954) este táxon foi nominado como *Scapanus melanoleucos*.

gavião-de-anta – *Daptrius ater* Vieillot, 1816
Black Caracara



Tancredo Maia Filho



Registros

Alto Rio Tarauacá (Peres, 1996); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão (Dantas, n. p. - 2010); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Parque Zoológico – Ufac (Guilherme, E., obs. pess.); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011); Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Jurupari localidades: Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD submontana, área aberta com pastagem.

Distribuição Geográfica

Ocorre em toda a Amazônia, do Maranhão ao leste do Peru e nordeste da Bolívia (Hoyo *et al.*, 1994; Sick, 1997).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1994).


Status

Residente.

gralhão • canção – *Ibycter americanus* (Boddaert, 1783)
Red-throated Caracara



Robson Czaban



Registros

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35564); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Jordão, localidades Távora, Pará, Manaus e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011); Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Jurupari localidades: Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Ocorre na América Central (sul do México) e na América do Sul cisandina (Hoyo *et al.*, 1994; Sick, 1997).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1994).


Status

Residente.

caracará – *Caracara plancus* (Miller, 1777)
Southern Caracara



Emerson Kaseker



carrapateiro – *Milvago chimachima* (Vieillot, 1816)
Yellow-headed Caracara



Anselmo D'Affonseca



Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002, Suplemento); Ramal Nabor Júnior, Km 26 (Guilherme, E., obs. pess.); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64343); Município de Capixaba, BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., 2007 [Wikiaves - WA1658621]); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010; DeLuca, 2012); Rio Jurupari localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); arredores da cidade de Cruzeiro do Sul (Gomes, G. C., 2013 [Wikiaves - WA1096954]); Município de Brasília, Ramal do 13 (Guilherme, E., 2015 [Wikiaves - WA1688034]).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras, área aberta com pastagens.

Distribuição Geográfica

Ocorre no sul dos Estados Unidos, na América Central e em toda a América do Sul (Hoyo *et al.*, 1994; Sick, 1997).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é *C. p. plancus* (Hoyo *et al.*, 1994).

Status

Invasora.

Comentários

Espécie recém-chegada ao Estado e que tem colonizado, sobretudo, as fazendas e colônias onde há pastagens para a criação bovina. Hoje, esta espécie já é comumente vista às margens das principais rodovias, estradas e ramais do Acre (DeLuca, 2012; Guilherme & Czaban, 2015).

Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, áreas abertas.

Distribuição Geográfica

Ocorre da América Central ao Uruguai e em todo o Brasil (Hoyo *et al.*, 1994).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *M. c. cordata* (Hoyo *et al.*, 1994).

Status


Residente.

acauã – *Herpetotheres cachinnans* (Linnaeus, 1758)


Laughing Falcon



Edson Guilherme

**falcão-caburé** – *Micrastur ruficollis* (Vieillot, 1817)

Barred Forest-Falcon



Tomaz Melo

**Registros**

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Município de Jordão, localidades Pará, Manaus e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011). Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., obs. pess); Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Jurupari, Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD submontana, área aberta com pastagens.

Distribuição Geográfica

Ocorre do México até a Argentina e em todo o Brasil (Hoyo *et al.*, 1994; Sick, 1997).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *H. c. cachinnans* (Hoyo *et al.*, 1994).

Status

Residente.

Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Rio Tejo, a aproximadamente 5 Km da foz, REAJ (Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 52016); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 48032, 48031); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 76366); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008; Guilherme, E. AC 245); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60436); Floresta Estadual do Antimary, Localidade Limoeiro (Guilherme, E., MPEG 60435); Estrada Transacreaana (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61217, 61218); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63472; Silva *et al.*, 2015); Município de Jordão, localidades Pará, Manaus e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011); Rio Jurupari, Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Ocorre do México até a Argentina e nas regiões florestadas do Brasil (Hoyo *et al.*, 1994; Sick, 1997).

Taxonomia

São reconhecidas seis subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *M. r. ruficollis* (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1994).


Status

Residente.

falcão-mateiro – *Micrastur gilvicolis* (Vieillot, 1817)
Lined Forest-Falcon




Tomaz Melo



tanatau – *Micrastur mirandollei* (Schlegel, 1862)
Slaty-backed Forest-Falcon



Robson Czaban



Registros

Arredores da cidade de Rio Branco, Seringal Nova Empresa (Hidasi, J., CPJH 970); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 76365); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60437, 60438); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Município de Jordão, localidades Távora, Pará, Manaus e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Ocorre em toda a Amazônia cisandina e também nos estados da Bahia e Espírito Santo (Hoyo *et al.*, 1994; Sick, 1997).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1994). Uma possível subespécie nova pode estar presente no leste do Acre (Guilherme, 2009).

Status

Residente.

Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Jordão, localidades Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Guilherme, E., 61522).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Ocorre no sul da América Central (Costa Rica), na Amazônia cisandina e no leste do Brasil (Hoyo *et al.*, 1994; Sick, 1997).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1994).


Status

Residente.

falcão-relógio – *Micrastur semitorquatus* (Vieillot, 1817)
Collared Forest-Falcon



Ciro Albano



Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Rio Jurupari, localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Ocorre do México até a Argentina e em todas as regiões florestadas do Brasil (Hoyo *et al.*, 1994; Sick, 1997).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *M. s. semitorquatus* (Hoyo *et al.*, 1994).

Status

Residente.

falcão-de-buckley – *Micrastur buckleyi* Swann, 1919
Buckley's Forest-Falcon



Richard C. Hoyer



Jovem

Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002, Suplemento); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011); Rio Jurupari, Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010).

Habitat

FOA com bambus/palmeiras, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Ocorre na região oeste da Amazônia (Hoyo *et al.*, 1994).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1994).

Status

Residente.


quiriquiri – *Falco sparverius* Linnaeus, 1758
American Kestrel *



Celso B. Almeida



esmerilhão – *Falco columbarius* Linnaeus, 1758
Merlin



Túlio Dornas



Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002, Suplemento).

Habitat

Campinarana (provável).

Distribuição Geográfica

Ocorre desde a América do Norte (Alaska) até a Terra do Fogo (Argentina) e em todo o Brasil (Hoyo *et al.*, 1994; Sick, 1997).

Taxonomia

Ver Comentários.

Status

Ver Comentários.

Comentários

(*) Este registro precisa de confirmação (Guilherme, 2009; 2012).

Registros

Município de Xapuri (Mendizabal, S. I., 2012 [Wikiaves - WA1060596]); Dornas & Pinheiro, 2014).

Habitat

Área aberta.

Distribuição Geográfica

América do Norte, Europa, Ásia e ilhas como a Islândia. As populações norte-americanas migram para a América Central e a América do Sul. Os registros desta espécie no Brasil são pontuais (Hoyo *et al.*, 1994; Dornas *et al.*, 2014).

Taxonomia

São reconhecidas nove subespécies. A forma que migra para o norte da América do Sul é a *F. c. columbarius* (Dornas & Pinheiro, 2014).


Status

Migrante neártica.

cauré – *Falco rufifularis* Daudin, 1800
Bat Falcon



Herbert Schubart



falcão-de-coleira – *Falco femoralis* Temminck, 1822
Aplomado Falcon *



Tancredo Maia Filho



Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Floresta Estadual do Mogno, BR-364, a 6 Km da ponte sobre o Rio Tauari (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60439); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63677); Município de Jordão, localidades Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Jurupari, localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo e Guilherme, n. p.); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, campinarana.

Distribuição Geográfica

Em toda a América Central e América do Sul até a Bolívia e norte da Argentina. Ocorre em quase todo o Brasil (Hoyo *et al.*, 1994; Sick, 1997).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é *F. r. rufifularis* (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1994).

Status

Residente.

Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002, Suplemento).

Habitat

Área aberta (provável).

Distribuição Geográfica

Ocorre no sul dos Estados Unidos, na América Central e em toda a América do Sul (Hoyo *et al.*, 1994; Sick, 1997).

Taxonomia

Ver Comentários.

Status

Ver Comentários.

Comentários

(*) Este registro precisa de confirmação (Guilherme, 2009; 2012).


arara-canindé – *Ara ararauna* (Linnaeus, 1758)
Blue-and-yellow Macaw



Celso B. Almeida



araracanga – *Ara macao* (Linnaeus, 1758)
Scarlet Macaw



Celso B. Almeida



Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Rio Jurupari, Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010).

Habitat

Dossel de FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Do Panamá ao Paraguai e em quase todo o Brasil (Hoyo *et al.*, 1997; Sick, 1997).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1997).

Status

Residente.

Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Rio Paratari, margem sul, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Floresta Estadual do Antimary, Ramal Uirapuru (Guilherme, E., MPEG 60931); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Ramal Nabor Júnior, Km 26 (Guilherme, E., obs. pess.); Município de Santa Rosa do Purus, Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Jurupari, Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, localidades Távora, Pará, Manaus e Veneza (Dantas, n. p. - 2010).

Habitat

Dossel de FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Do México até a Bolívia. No Brasil, pode ser encontrada em toda a Amazônia (Hoyo *et al.*, 1997; Sick, 1997).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *A. m. macao* (Hoyo *et al.*, 1997).


Status

Residente.


arara-vermelha-grande – *Ara chloropterus* Gray, 1859
Red-and-green Macaw



Anselmo D'Alfonseca



maracanã-guaçu – *Ara severus* (Linnaeus, 1758)
Chestnut-fronted Macaw



Tancredo Maia Filho



Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, 1958, MPEG 27412); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Rio Paratari, margem sul, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Município de Santa Rosa do Purus, Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011).

Habitat

FOA com palmeiras, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Do Panamá ao norte da Argentina (Hoyo *et al.*, 1997; Sick, 1997).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1997).

Status

Residente.

Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60454); Floresta Estadual do Antimary, Localidade Limoeiro (Guilherme, E., MPEG 60455); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Município de Santa Rosa do Purus, Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão (Dantas, n. p. - 2010); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64419); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., obs. pess.); Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Jurupari, localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010).

Habitat

FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, área aberta com pastagens ou cultivares, ambientes urbanos.

Distribuição Geográfica

Do Panamá até a Bolívia. Ocorre em toda a Amazônia brasileira (Hoyo *et al.*, 1997; Sick, 1997).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1997).

Status

Residente.

Comentários

Entre as araras de médio porte, esta espécie é a mais comumente vista em todos os ambientes dentro do Estado, inclusive em fragmentos florestais urbanos.

maracanã-do-buriti – *Orthopsittaca manilatus* (Boddaert, 1783)
Red billed Macaw




Celso B. Almeida



maracanã-de-cabeça-azul – *Primolius couloni* (Sclater, 1876)
Blue-headed Macaw



Edson Guilherme



Registros

Rio Juruá-Mirim, margem direita, Localidade Santo Antônio do Comprido (Oren, D. C., MPEG 53967 – penas); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Floresta Estadual do Antimary, Ramal Uirapuru (Guilherme, E., MPEG 60456); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Kaseker, E. P. 2011 [Wikiaves - WA436323]); Município de Xapuri (Melo, M. A., 2013 [Wikiaves - WA1009401]).

Habitat

FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD.

Distribuição Geográfica

Da Venezuela até a Bolívia e em toda a Amazônia brasileira (Hoyo *et al.*, 1997; Sick, 1997).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1997).

Status

Residente.

Nome anterior

Ara manilata.

Registros

Arredores da cidade de Capixaba (Parker & Remsen, 1987, observada); arredores da cidade de Plácido de Castro (Forrester, 1993, observada); Rio Juruá, Município de Cruzeiro do Sul, Localidade Porongaba (Whittaker & Oren, 1999, observada); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Whittaker & Oren, 1999, MPEG 52019); Rio Juruá, Igarapé São Luiz, Localidade Valparaíso (Whittaker & Oren, 1999, observada); BR-364, Seringal Sardinha (Guilherme, E. AC 0116; Tobias & Brightsmith, 2007); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); arredores da cidade de Rio Branco, Parque Ambiental Chico Mendes (Tobias & Brightsmith, 2007); Município de Santa Rosa do Purus, Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., obs. pess.); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Jurupari, Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Floresta Estadual do Antimary, Localidade São Pedro (DeLuca, 2012); Município de Brasiléia - Localidade Deodete (DeLuca, 2012); Município de Brasiléia - Localidade São João (DeLuca, 2012); Município de Sena Madureira – Rio Iaco (DeLuca, 2012); Município de Sena Madureira - Localidade Primavera (DeLuca, 2012); Município de Xapuri - Localidade Monte Videlzinho (DeLuca, 2012); Município de Xapuri - Localidade Alto Alegre (DeLuca, 2012); Município de Senador Guimard - Projeto Pedro Peixoto (DeLuca, 2012); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Leite, G., 2013 [Wikiaves - WA1120906]).

maracanã-de-cabeça-azul – *Primolius couloni* (Sclater, 1876)

Blue-headed Macaw

Habitat
FOA com palmeiras/bambus, área desmatada com cultivares (roçados).
Distribuição Geográfica
Leste do Peru, norte da Bolívia e na Amazônia sul-ocidental brasileira. Espécie restrita ao centro de endemismo Inambari (Haffer, 1978, Cracraft, 1985).
Taxonomia
Espécie monotípica (Hoyo <i>et al.</i> , 1997).
Status
Residente.
Comentários
Espécie de distribuição geográfica restrita. A exceção de um único registro feito na fronteira Bolívia/Rondônia (Abunã) e outro feito no sul do Amazonas, todos os demais registros desta espécie em território brasileiro, até o momento, foram dentro do estado do Acre (Tobias & Brightsmith, 2007).

periquitão-maracanã – *Psittacara leucophthalmus* (Statius Muller, 1776)

White-eyed Parakeet



Hugo Viana




Registros
Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney <i>et al.</i> , n. p. - 1997, MPEG 53966); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); arredores da cidade de Feijó (Guilherme, E., obs. pess.); Município de Xapuri, BR-317, próximo ao entroncamento que dá acesso à cidade de Xapuri (Guilherme, E., MPEG 59917); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60457); Município de Santa Rosa do Purus, Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Estrada Transacreaana (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61232); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 63477); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63475, 63476); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre <i>et al.</i> 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64347, 64408; AC 0185); Reserva Humaitá (Guilherme, E., MPEG 63461); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63685, 63686); Foz do Rio Jurupari (Aleixo <i>et al.</i> , n. p. - 2010); Rio Jurupari, localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo <i>et al.</i> , n. p. - 2010); Município de Jordão, localidades Távora, Pará, Manaus e Veneza (Dantas, n. p. - 2010).
Habitat
FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, área aberta com pastagens e cultivares (roçados).
Distribuição Geográfica
Das Guianas até a Argentina e em quase todo o Brasil (Hoyo <i>et al.</i> , 1997; Sick, 1997).
Taxonomia
São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é a <i>P. l. callogenys</i> (Hoyo <i>et al.</i> , 1997).
Status
Residente.
Nome anterior
<i>Aratinga leucophthalma</i> .

periquito-de-cabeça-suja – *Aratinga weddellii* (Deville, 1851)

Dusky-headed Parakeet



Bertrando Campos

**Registros**

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35592, 35593, 35594, 35595, 35596, 35597); arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35598); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52540); Alto Rio Moa, margem esquerda, Serra da Jaquirana (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52707, 52708); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 52020); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 48044); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 76371, 76372, 76373); Parque Zoobotânico e *Campus* da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; AC 0028, 148, 159, 768; MPEG 59913, 59914); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); arredores da cidade de Assis Brasil (Guilherme, 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005, Guilherme, E., MPEG 59912); Município de Santa Rosa do Purus, Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada Transacrea (AC-090) Km 60, margem direita (Guilherme, E., MPEG 61398); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61233); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 61990, 63478, 63479); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 61988, 61989); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Jordão, localidades Távora, Pará, Manaus e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Jurupari, localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); arredores da cidade de Rio Branco, Estrada de Porto Acre, Km 11 (Ruan, R. AC – 723).

periquito-de-cabeça-suja – *Aratinga weddellii* (Deville, 1851)

Dusky-headed Parakeet

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, área aberta com pastagem e/ou cultivares (roçados), ambientes urbanos.

Distribuição Geográfica

Noroeste da América do Sul. Desde o sudeste da Colômbia ao nordeste da Bolívia. No Brasil, ocorre apenas na Amazônia ocidental (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1997; Sick, 1997).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1997).

Status

Residente.

Comentários

Trata-se do psitacédeo mais comumente visto em todo o estado do Acre. Ocorre em todos os ambientes, inclusive nas áreas urbanas, nos quintais e praças públicas.

tiriba-de-cabeça-vermelha – *Pyrrhura roseifrons* (Gray, 1859)

Rose-fronted Parakeet



Emerson T. Rodrigues

**tiriba-rupestre** – *Pyrrhura rupicola* (Tschudi, 1844)

Black-capped Parakeet



Cárin Duarte

**Registros**

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, 1958, MPEG 28152); Alto Rio Moa, margem esquerda, Igarapé Amil (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52706); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 48046); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Rio Paratari, margem sul, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Mâncio Lima, Estrada do Barão, Comunidade São Domingos (Guilherme, E., MPEG 61993); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63687); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Município de Jordão, Localidade Manaus (Dantas, n. p. - 2010); Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Jurupari, localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

Amazônia sul-ocidental, do leste do Peru até a margem esquerda do Alto Rio Solimões (Pinto, 1978).

Taxonomia

Em Hoyo *et al.* (1997) este táxon foi nominado como uma subespécie de *P. picta*.

Status

Residente.

Comentários

Em Whittaker *et al.* (2002) este táxon foi nominado como *Pyrrhura picta*.

Registros

Município de Capixaba, Fazenda Campo Lindo (Hidasi, J., CPJH 800); arredores da cidade de Plácido de Castro (Forrester, 1993, observada); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Rio Tejo, REAJ (Whittaker & Oren, 1999; Whittaker *et al.*, 2002); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2008, MPEG 58825); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., obs. pess.); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Município de Rio Branco, Parque Ambiental Chico Mendes (Gonçalves, D., 2011 [Wikiaves - WA497728]).

Habitat

FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Região central e sudeste do Peru, norte da Bolívia e extremo-oeste da Amazônia brasileira (Hoyo *et al.*, 1997; Sick, 1997). Espécie restrita ao centro de endemismo Inambari (Haffer, 1978, Cracraft, 1985). No Brasil, esta espécie só tem sido registrada no estado do Acre (Sick, 1997).

Taxonomia

Duas subespécies são reconhecidas. A forma que ocorre no Acre é a *P. r. sandiae* (Hoyo *et al.*, 1997).

Status

Residente.

tuim – *Forpus xanthopterygius* (Spix, 1824)
Blue-winged Parrotlet



Roseanne Almeida



Registros

Município de Cruzeiro do Sul (Gomes, G. C., 2013 [Wikiaves - WA1092728]); Complexo *Campus* e Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, E., 2014, 2015 [Wikiaves - WA1554370, WA1595214]).

Habitat

FOA aluvial, FOA com palmeiras, área aberta, ambientes urbanos.

Distribuição Geográfica

Possui distribuição disjunta na América do Sul. Ocorre em quase todo o leste do Brasil e extremo-oeste da Amazônia. Ocorre, também, no Peru, Equador, Bolívia e Paraguai.


Taxonomia

Quatro subespécies são reconhecidas. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *F. x. flavescens* (Hoyo *et al.*, 1997).


Status

Residente.

tuim-de-bico-escuro – *Forpus sclateri* (Gray, 1859)
Dusky-billed Parrotlet



Edson Guilherme



Registros

Arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35599, 35600); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 76375, 76376); *Campus* e Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; AC 0436); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64421); Município de Santa Rosa do Purus, Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008).

Habitat

FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Em toda Amazônia (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1997; Sick, 1997).

Taxonomia

São reconhecidas duas supespécies. A forma que ocorre no Acre é *F. m. sclateri* (Pinto & Camargo, 1954; Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1997).

Status

Residente.


Nome anterior

Forpus modestus.

periquito-de-asa-azul – *Brotogeris cyanoptera* (Pelzeln, 1870)
Cobalt-winged Parakeet



Robson Czaban



periquito-de-asa-azul – *Brotogeris cyanoptera* (Pelzeln, 1870)
Cobalt-winged Parakeet

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

América do Sul oeste-setentrional cisandina (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1997).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies (Hoyo *et al.*, 1997). Duas formas parecem ocorrer na região: *B. c. beniensis* e *B. c. cyanoptera* (Guilherme, 2009; 2012).

Status

Residente.

Registros

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35601, 35602, 35603, 35604, 35605, 35606, 35607, 35608); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 48045); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 76377, 76378, 76379); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); arredores da cidade de Assis Brasil (Guilherme, 2004); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005, Guilherme, E., MPEG 59915, 59916); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 58826, 58827, 59771); arredores da cidade de Rio Branco (Guilherme, E., AC 0023, 0024); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61234); Município de Mâncio Lima, Estrada do Barão, Comunidade São Domingos (Guilherme, E., MPEG 61991, 61992); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Município de Santa Rosa do Purus, Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 63480, 63617, 63618; AC 0132); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63619); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas 2011, MPEG 63256); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64349); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64420); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Município de Jordão, localidades Pará, Manaus, Veneza e Távora (Dantas, n. p. - 2010); Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Jurupari, localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

periquito-testinha – *Brotogeris sanctithomae* (Statius Muller, 1776)

Tui Parakeet



Edson Guilherme

**periquito-da-amazônia** – *Nannopsittaca dachilleae* O'Neill, Munn & Franke, 1991

Amazonian Parrotlet



João Quental

**Registros**

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 27380, 27381, 27382); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 76380, 76381); Parque Zoobotânico e *Campus* da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; AC 0022, 0779); arredores da cidade de Assis Brasil (Guilherme, 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004, MPEG 58358, 58359); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 58828); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Município de Santa Rosa do Purus, Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); arredores da cidade de Brasiléia (Guilherme, E. Obs. Pess.); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Rio Branco, Bairro Joafrá (Doação IBAMA/CETAS; AC 794).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Porção amazônica do Equador, do Peru e da Bolívia. No Brasil, pode ser encontrada ao longo de toda a calha do Rio Amazonas (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1997; Sick, 1997).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *B. s. sanctithomae* (Novaes, 1957; Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1997).

Status

Residente.

Registros

Alto Rio Moa, margem direita, Município de Mâncio Lima (Whitney *et al.*, n. p. - 1997; Whitney & Oren, 2001a, MPEG 52709 52710, 52711, 52712, 52713); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Brasiléia - Localidade Deodete (DeLuca, 2012).

Habitat

FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Sudeste do Peru, noroeste da Bolívia e no extremo-oeste do Brasil amazônico (Acre) (Hoyo *et al.*, 1997). Espécie com distribuição geográfica restrita. Em território brasileiro só foi registrada, até o momento, no estado do Acre.

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1997).

Status

Residente.

apuim-de-asa-vermelha – *Touit buetii* (Temminck, 1839)
Scarlet-shouldered Parrotlet



Jorge Macêdo



Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Rio Juruá, Foz do Rio Tejo (Whittaker & Oren, 1999; Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 52022); Município de Santa Rosa do Purus, Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Município de Jordão, Localidade Manaus e arredores da cidade de Jordão (Dantas, n. p. - 2010).

Habitat

FOA com palmeiras, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

América do Sul oeste-setentrional cisandina. Espécie de distribuição disjunta, ocorre na Venezuela, Colômbia, Guiana, Peru, Bolívia e Brasil. No Brasil, é encontrada localmente, desde o Maranhão até o Acre (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1997; Sick, 1997).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1997).

Status

Residente.

apuim-de-costas-azuis – *Touit purpuratus* (Gmelin, 1788)
Sapphire-rumped Parrotlet



Emerson Kaseker



Registros

Municípios de Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul (Guilherme, 2012).

Habitat

Campinas e campinaranas

Distribuição Geográfica

Norte da América do Sul. Região amazônica do Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa e Brasil (Hoyo *et al.*, 1997).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *T. p. viridiceps* (Hoyo *et al.*, 1997).

Status

Residente.

marianinha-de-cabeça-amarela – *Pionites leucogaster* (Kuhl, 1820)
White-bellied Parrot



Edson Guilherme



curica-de-bochecha-laranja – *Pyrilia barrabandi* (Kuhl, 1820)
Orange-cheeked Parrot



Robson Czaban



Registros

Arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35609); Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 27397); Município de Capixaba, Fazenda Campo Lindo (Hidasí, J., CPJH 853); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 52021); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52541); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme, & Dantas, 2011); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63620); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63688); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64424); Município de Santa Rosa do Purus, Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Rio Jurupari, localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, localidades Távora, Pará, Manaus e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD, área aberta com pastagem ou cultivares, campinarana.

Distribuição Geográfica

Ocorre ao sul do Rio Amazonas, desde o Pará até a Bolívia (Hoyo *et al.*, 1997; Sick, 1997).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *P. l. xanthomeria* (Pinto & Camargo, 1954; Novaes, 1957; Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1997).

Status

Residente.

Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 53966); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 76374); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Município de Santa Rosa do Purus, Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2007; 2011); Rio Jurupari, localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, campinarana.

Distribuição Geográfica

Porção oeste-setentrional da América do Sul cisandina (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1997; Sick, 1997).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo distribuição geográfica, a *P. b. aurantiigena* (Hoyo *et al.*, 1997).

Status

Residente.

Comentários

Nos registros (op. cit.) esta espécie aparece nominada como *Pionopsitta barrabandi* ou como *Gypopsitta barrabandi*.

maitaca-de-cabeça-azul – *Pionus menstruus* (Linnaeus, 1766)

Blue-headed Parrot



Ciro Albano

**papagaio-da-várzea** – *Amazona festiva* (Linnaeus, 1758)

Festive Parrot



Anselmo D'Affonseca

**Registros**

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; AC 256); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Município de Santa Rosa do Purus, Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60458); Ramal Nabor Júnior, Km 26 (Guilherme, E., MPEG 60459); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63852, 63853); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63689); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64422); Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Jurupari, Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Jurupari, Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, localidades Távora, Pará, Manaus e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, área aberta com pastagens ou cultivares.

Distribuição Geográfica

Do sul da América Central até a Bolívia. No Brasil, pode ser encontrada em toda Amazônia. Ocorre, também, do Mato Grosso ao Espírito Santo (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1997).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *P. m. menstruus* (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1997).

Status

Residente.

Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Cidade de Rio Branco, Parque Ambiental Chico Mendes (Guilherme, E. obs. pess./vários espécimes em cativeiro).

Habitat

FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Em quase toda a Amazônia (Hoyo *et al.*, 1997).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1997).

Status

Residente.

Comentários


Os registros desta espécie no Alto Juruá foram todos visuais. No leste do Acre foram vistos apenas animais em cativeiro ou domesticados, sugerindo que a espécie pode ocorrer em estado silvestre na região.

papagaio-moleiro – *Amazona farinosa* (Boddaert, 1783)

Mealy Parrot



Robson Czaban

**Registros**

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35608); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Parque Nacional da Serra do Divisor, 106 Km a sudoeste de Cruzeiro do Sul (Aleixo, A. & Polleto, F., MPEG 58006); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Município de Santa Rosa do Purus, Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63257); Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Jurupari, Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Jurupari, Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, localidades Távora, Pará, Manaus e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, área aberta com pastagens ou cultivares.

Distribuição Geográfica

Sul da América Central e América meridional cisandina. No Brasil, ocorre na Amazônia e do extremo leste da Bahia ao leste de Minas (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1997; Sick, 1997).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *A. f. farinosa* (Pinto & Camargo, 1954; Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1997).

Status

Residente.

curica – *Amazona amazonica* (Linnaeus, 1766)

Orange-winged Parrot



Bertrando Campos

**Registros**

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002, Suplemento); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005).

Habitat

FOA com palmeiras.

Distribuição Geográfica

Centro-norte da América do Sul cisandina. Desde a Colômbia até o estado do Paraná no Brasil (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 1997; Sick, 1997).

Taxonomia


Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 1997).

Status

Residente.

papagaio-campeiro – *Amazona ochrocephala* (Gmelin, 1788)

Yellow-crowned Parrot

**Registros**

Rio Juruá, Localidade São Salvador, próximo à Foz do Rio Grajaú (Novaes, 1957, 1958, MPEG 27386); Rio Juruá-Mirim, margem direita, Localidade Santo Antônio do Comprido (Oren, D. C., MPEG 53968); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 76369, 76370); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); arredores da cidade de Assis Brasil (Guilherme, 2004, AC 0078); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Município de Santa Rosa do Purus, Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63474); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64351); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64423); Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Jurupari, Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Jurupari, Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, localidades Távora, Pará, Manaus e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

América Central e norte da América do Sul. (Hoyo *et al.*, 1997; Sick, 1997).

Taxonomia

São reconhecidas dez subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *A. o. nattereri* (Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 1997).

Status

Residente.


Comentários

Dentre as espécies de papagaios criados em cativeiro, no Acre, esta é a espécie mais comum.



choca-do-acre (fêmea), um dos passeriformes mais raros em território brasileiro.

zidedê-de-encontro – *Euchrepomis humeralis* (Sclater & Salvin, 1880)
Chestnut-shouldered Antwren




Registros
Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney <i>et al.</i> , n. p. - 1997); Rio Juruá, Foz do Rio Tejo (Whittaker <i>et al.</i> , 2002, MPEG 52141); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Município de Jordão, Localidade Manaus (Dantas, n. p. - 2010); Rio Jurupari localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo <i>et al.</i> , n. p. - 2010).
Habitat
FOA com palmeiras, FOD submontana.
Distribuição Geográfica
Noroeste da Amazônia (Equador, Brasil, Peru e Bolívia) (Sick, 1997; Hoyo <i>et al.</i> , 2003).
Taxonomia
Espécie monotípica (Hoyo <i>et al.</i> , 2003).
Status
Residente.
Nome anterior
<i>Terenura humeralis</i> .

choca-cantadora – *Pygiptila stellaris* (Spix, 1825)
Spot-winged Antshrike



Círo Albano



Macho

Registros
Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 24559, 24560); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney <i>et al.</i> , n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Floresta Estadual do Rio Gregório, próximo à ponte sobre o Rio Acuraua (Guilherme, 2007, MPEG 60656); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63545, 63637, 63638); Rio Jurupari Localidade Novo Oriente (Aleixo <i>et al.</i> , n. p. - 2010).
Habitat
FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD submontana.
Distribuição Geográfica
Em quase toda a Amazônia, das Guianas até a Bolívia (Sick, 1997; Hoyo <i>et al.</i> , 2003).
Taxonomia
São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a <i>P. s. stellaris</i> (Hoyo <i>et al.</i> , 2003).
Status
Residente.


papa-formiga-de-bando – *Microrhopias quixensis* (Cornalia, 1849)

Dot-winged Antwren



Macho

Robson Czaban

**choca-preta** – *Neotantes niger* (Pelzeln, 1859)

Black Bushbird



Macho

Bruno Rennó

**Registros**

Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A., MPEG 48308); Rio Tejo, a aproximadamente 5 Km da foz, REAJ (Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 52146); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80171, 80172); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004, MPEG 58378, 58379); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 59856); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão (Dantas, n. p. - 2010); Rio Jurupari Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010, MPEG 70019); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal e setor norte (Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015).

Habitat

FOA com bambus/palmeiras, FOA aluvial, FOD.

Distribuição Geográfica

América Central e norte da América do Sul (Amazônia) (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas dez subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *M. q. intervedens* (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

Registros

Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48230); Rio Tejo, margem esquerda, a aproximadamente 5 Km da foz (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52121, 52122; Whittaker & Oren, 1999; Whittaker *et al.*, 2002); Alto Rio Moa, margem direita (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52740, 52741); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 76444); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010).

Habitat

FOA com palmeiras e cipós, FOA com bambus, FOA aluvial com helicônias, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Amazônia ocidental (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

choquinha-de-olho-branco – *Epinecrophyllos leucophthalma* (Pelzeln, 1868)

White-eyed Antwren



Macho



Robson Czaban

choquinha-de-garganta-carijó – *Epinecrophyllos haematonota* (Sclater, 1857)

Napo Stipple-throated Antwren



Edson Guilherme



Macho

Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957); Município de Capixaba, Fazenda Campo Lindo (Hidasi, J., CPJH 1354); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48269, 48270, 48271); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A., MPEG 48268, 48272, 48273); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52612); Alto rio Acre, margem esquerda, Localidade Cachoeira do Bandeira (Guilherme, E., MPEG 61488); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63348); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63635, 63636); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010, MPEG 70007, 70008); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013, AC 704).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD.

Distribuição Geográfica

Ao sul do Solimões/Amazonas (Brasil, Peru e Bolívia) (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas quatro subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *E. l. leucophthalma* (Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

Nome anterior

Myrmotherula leucophthalma.

Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 24583, 24584); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48263, 48264, 48265, 48266, 48267; 49720); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A., MPEG 48261, 48262); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52613, 52614); Alto Rio Moa, Igarapé Amil, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52765, 52766); Alto Rio Moa, margem direita, Igarapé Ramon, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52763, 52764); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); BR-364 a 40 Km da ponte sobre o Rio Liberdade, margem direita (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60676); Município de Mâncio Lima, Estrada do Barão, Comunidade São Domingos (Guilherme, E., MPEG 62090, 62091, 62092, 62093); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63747); Rio Jurupari Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010, MPEG 70006); Município de Cruzeiro do Sul, BR 307, Ramal dos Caroba (Guilherme, E., AC 393); Município de Mâncio Lima, Comunidade Santa Bárbara (Guilherme, E., AC 606); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOD, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

Oeste da Amazônia, da Venezuela até a Bolívia (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia


Foram descritas três subespécies (Hoyo *et al.*, 2003). As três formas foram recém-transformadas em espécies plenas (Whitney *et al.*, 2013b).

Status


Residente.

choquinha-do-madeira – *Epinecrophylla amazonica* (Ihering, 1905)

Madeira Stipple-throated Antwren




Jovem




Bruno Rennó

choquinha-ornada – *Epinecrophylla ornata* (Sclater, 1853)

Ornate Antwren



Macho



Bruno Rennó

Registros

Município de Rio Branco, Seringal Nova Empresa (Hidasi, J., LSUMZ 68112); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Ramal Nabor Júnior, Km 26 (Guilherme, E., MPEG 60672, 60673); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Silva *et al.*, 2015).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOD.

Distribuição Geográfica

Sudoeste da Amazônia, da margem esquerda do Rio Madeira para o oeste no interflúvio Purus/Madeira (Whitney *et al.*, 2013b).

Taxonomia

Este táxon foi considerado por muito tempo como uma subespécie de *Myrmotherula haematonota* (Hoyo *et al.*, 2003; Whitney *et al.*, 2013b).

Status

Residente.

Nome anterior

Myrmotherula haematonota.

Comentários

Em Silva *et al.* (2015) este táxon foi grafado como *Epinecrophylla haematonota*.

Registros

Alto Rio Moa, Igarapé Amil, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52906); Parque Nacional da Serra do Divisor, Alto Rio Moa, margem direita, Igarapé Ramon (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52762); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80199, 80200, 80201, 80202, 80203, 80204); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal (Guilherme, E., MPEG 59986; Silva *et al.*, 2015); Floresta Estadual do Mogno, BR-364, a 6 Km da ponte sobre o Rio Tauari (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60668); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005; Guilherme, E., MPEG 61423, 61424); Estrada Transacrea (AC-090) Km 60, margem esquerda (Guilherme, E., MPEG 61425); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61345, 61346, 61347, 61348); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 59866); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Jurupari Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Senador Guiomard, Localidade Bonal (Guilherme, E. & Souza, G. AC 565); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Silva *et al.*, 2015); BR 317, margem esquerda, área adjacente à Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015); Município de Plácido de Castro, BR-364, Ramal do 45 (Marques, 2015).

Habitat

FOA com bambus/palmeiras, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Na Amazônia, ao sul do Solimões/Amazonas (Brasil, Peru e Bolívia) e ao norte do Solimões, na região centro-sul da Colômbia e leste do Equador (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003). Espécie associada às florestas com bambus no sudoeste amazônico (Stotz *et al.*, 1996).

Taxonomia

São reconhecidas cinco subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *E. o. meridionalis* (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

Nome anterior

Myrmotherula ornata.

choquinha-de-cauda-ruiva – *Epinecrophylla erythrura* Sclater, 1890
Rufous-tailed Antwren *



Nick Athanas



Macho

Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002, Suplemento).

Habitat

FOA com palmeiras (provável).

Distribuição Geográfica

Amazônia ocidental (Colômbia, Equador, Peru e Brasil) (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

Ver Comentários.

Status

Ver Comentários.


Comentários

(*) Este registro precisa de confirmação (Guilherme, 2009; 2012).

formigueiro-de-peito-preto – *Myrmophylax atrotborax* (Boddaert, 1783)
Black-throated Antbird



Edson Guilherme



Macho

Registros

Arredores da cidade de Rio Branco (Teixeira *et al.*, 1994, MNRJ 31073); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80185, 80186); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Floresta Estadual do Rio Gregório, próximo à ponte sobre o Rio Acuraua (Guilherme, 2007, MPEG 60709, 60710); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62084); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., obs. pess.); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010, MPEG 70011); Rio Jurupari localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010).

Habitat

FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD submontana, floresta secundária.

Distribuição Geográfica

Em quase toda a Amazônia, das Guianas até a Bolívia (Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas cinco subespécies (Hoyo *et al.*, 2003). A forma que ocorre no Acre parece ser a *M. a. tenebrosa* (Guilherme, 2009).

Status


Residente.

Nome anterior

Myrmeciza atrotborax.


choquinha-miúda – *Myrmotherula brachyura* (Hermann, 1783)

Pygmy Antwren



Macho

Anselmo D'Alfonseca

**choquinha-de-bico-curto** – *Myrmotherula ignota* Griscom, 1929

Moustached Antwren



Robson Czaban



Macho

Registros

Rio Juruá, arredores da cidade de Cruzeiro do Sul (Novaes, 1957, MPEG 14248, 14249); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52140); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão e localidades Pará, Távora e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

Em quase toda a Amazônia, das Guianas até a Bolívia (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Sul da América Central (Panamá) e noroeste da América do Sul (Colômbia, Equador, Brasil e Peru) (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *M. i. obscura* (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.


choquinha-de-garganta-amarela – *Myrmotherula sclateri* Sneathlage, 1912

Sclater's Antwren



Fêmea

Ricardo Plácido

**choquinha-estriada-da-amazônia** – *Myrmotherula multistriata* Sclater, 1858

Amazonian Streaked-Antwren



Macho

Celso B. Almeida

**Registros**

Arredores da cidade de Plácido de Castro (Forrester, 1993, observada); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64489); Município de Jordão localidades Pará, Távora, Manaus e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

Amazônia, ao sul do Solimões/Amazonas (Brasil, Peru e Bolívia) (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

Registros

Rio Juruá, margem esquerda, arredores da cidade de Cruzeiro do Sul (Whittaker, A., MPEG 48284); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52615, 52616); Parque Nacional da Serra do Divisor, setor norte (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Ocorre na Amazônia, na calha sul do Solimões/Amazonas e, pontualmente, na calha norte (Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia


Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.



Macho



Robson Czaban

Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 24596, 24597); Rio Juruá, Estirão do Carmo, próximo à Foz do Rio Grajaú (Novaes, 1957, MPEG 24595); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48289); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 48285, 48286, 48287, 48288); Rio Tejo, a aproximadamente 5 Km da foz, REAJ (Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 52134, 52135); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52136); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52610, 52611); Alto Rio Moa, margem direita, Igarapé Ramon, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52761); Rio das Minas, margem esquerda, Município de Porto Walter, Localidade Gustavo (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52907); Parque Zoológico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; AC 0015, 0380, 0803); Parque Nacional da Serra do Divisor, 106 Km a sudoeste de Cruzeiro do Sul (Aleixo, A. & Polleto, F, MPEG 58018); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005; Guilherme, E., MPEG 59975); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal (Guilherme, E., AC 196; MPEG 59976, 59977, 59978, 59979, 59980); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60666; Silva *et al.*, 2015); Rio Liberdade, margem direita, próximo à Foz do Igarapé Novena (Guilherme, 2007, MPEG 60664, 60665); Floresta Estadual do Mogno, BR-364, a 6 Km da ponte sobre o Rio Tauari (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, E., MPEG 60667); Floresta Estadual do Antimary, Localidade Limoeiro (Guilherme, E., MPEG 60663); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada Transacrea (AC-090) Km 60, margem esquerda e direita (Guilherme, E., MPEG 61540, 61539); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61339, 61340, 61341); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 58894, 59863, 59864, 59865); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62085, 62086, 62087); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63339, 63340, 63341, 63342); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal e setor leste (Guilherme, E., MPEG 63542, 63543; Silva *et al.*, 2015); BR-317,

Registros

Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64460); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63745, 63746); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Cruzeiro do Sul, BR 307, Ramal dos Caroba (Guilherme, E. AC 356); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Município de Senador Guimard, BR 364, Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015); BR 317, margem esquerda, área adjacente à Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015); Município de Rio Branco, Estrada da Piçarreira (Marques, 2015); Município de Plácido de Castro, BR-364, Ramal do 45 (Marques, 2015); Município de Porto Acre, mata ripária adjacente à Reserva Humaitá, setor norte (Marques, 2015).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Na América Central, no norte da América do Sul (Amazônia) e no extremo leste do Brasil, da Paraíba ao Rio de Janeiro (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas seis subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *M. a. heterozyga* (Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.



Registros

Arredores da cidade de Plácido de Castro (Forrester, 1993).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus. (Provável).

Distribuição Geográfica

Ocorrência pontual no extremo-oeste da Amazônia (Hoyo *et al.*, 2003; Schulenberg *et al.*, 2007).

Taxonomia


São reconhecidas duas subespécies. A forma que possivelmente ocorre em território brasileiro é a *M. s. yessupi* (Hoyo *et al.*, 2003).

Status


Ver Comentários.

Comentários

(*) Este é o único registro desta espécie para o estado do Acre. Como este registro foi apenas visual e como se trata de uma espécie de difícil indentificação em campo, podendo ser visualmente confundida com *M. longipennis*, *M. ornata* ou mesmo *M. oreni*, incluí este táxon na lista secundária das aves do Acre (Guilherme, 2012) até que sua presença possa ser confirmada no Estado através de algum registro documental.



Robson Czaban



Macho

Registros

Rio Juruá, arredores da cidade de Cruzeiro do Sul (Novaes, 1957, MPEG 24602); Rio Juruá, margem direita, Localidade Pedra Preta (Novaes, 1957, MPEG 24601); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48282, 48283); Parque Nacional da Serra do Divisor, Alto Rio Moa, margem direita, Igarapé Ramon (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52759, 52760); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80196); arredores da cidade de Assis Brasil (Guilherme, 2004, MPEG 61487); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal (Guilherme, E., MPEG 59987, 59988, 59989); Ramal Nabor Júnior, Km 26 (Guilherme, E., MPEG 60674); BR-364 a 40 Km da ponte sobre o Rio Liberdade, margem direita (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60675); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63343, 63344, 63345, 63346, 63347); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Silva *et al.*, 2015).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Em toda a Amazônia, das Guianas até a Bolívia (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas seis subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *M. l. garbei* (Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2003).


Status

Residente.

choquinha-do-bambu – *Myrmotherula oreni* Miranda, Aleixo, Whitney, Silveira, Guilherme, Santos & Schneider, 2013
Bamboo Antwren



Macho



Bertrando Campos

choquinha-do-purus – *Myrmotherula heteroptera* Todd, 1927
Purus Antwren



Registros

Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80194, 80195, 80196, 80197, 80198); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada Transacreeana (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009; Miranda *et al.*, 2013; MPEG 61342, 61343, 61344); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Silva *et al.*, 2015 – grafado erroneamente como *Formicivora iberingi*); Município de Plácido de Castro, BR-364, Ramal do 45 (Marques, 2015).

Habitat

FOA com bambus.

Distribuição Geográfica

Sudoeste da Amazônia brasileira (leste do Acre) e sudeste do Peru (Miranda *et al.*, 2013).

Taxonomia

Espécie antes pertencente ao grupo *Myrmotherula iberingi* (Miranda *et al.*, 2013).

Status

Residente.

Nome anterior

Myrmotherula iberingi.

Comentários

Em Silva *et al.* (2015) este táxon foi grafado por engando como *Formicivora iberingi*.

Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 24609); Rio Juruá, Foz do Rio Tejo (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52138; Whittaker *et al.*, 2002); Alto Rio Moa, margem direita, Município de Mâncio Lima (Whitney *et al.*, n. p. - 1997; MPEG 52757); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62094).

Habitat

FOA com bambus/palmeiras, FOA aluvial com bambus, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Margem sul do Amazonas, a oeste do Rio Tapajós até o leste do Peru e norte da Bolívia (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

Espécie antes pertencente ao grupo *Myrmotherula iberingi* (Miranda *et al.*, 2013).

Status

Residente.

Nome anterior


Myrmotherula iberingi.

choquinha-de-garganta-cinza – *Myrmotherula menetriesii* (d'Orbigny, 1837)

Gray Antwren



Macho



Robson Czaban

papa-formiga-pardo – *Formicivora grisea* (Boddaert, 1783)

White-fringed Antwren



Macho



Robson Czaban

Registros

Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 48256, 48257); Rio Tejo, a aproximadamente 5 Km da foz, REAJ (Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 52139); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52137); Rio Ouro Preto, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52905); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Floresta Estadual do Mogno, BR-364, a 6 Km da ponte sobre o Rio Tauari (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60669); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Ramal Nabor Júnior, Km 26 (Guilherme, E., MPEG 60670); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64495); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão (Dantas, n. p. - 2010); Rio Jurupari Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Mâncio Lima, Comunidade Santa Bárbara (Guilherme, E., AC 612); Parque Estadual Chandless (Bueno, A. S., AC 0738); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013);

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Em toda a Amazônia, das Guianas até a Bolívia (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas cinco subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *M. m. menetriesii* (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

Registros

Campinaranas dos municípios de Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul (Guilherme, 2012; MPEG 74506).

Habitat

Campinarana.

Distribuição Geográfica

Sul da América Central (Panamá) e norte da América do Sul (Venezuela e Colômbia). Ocorre pontualmente no norte e nordeste brasileiro (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas oito subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *F. g. grisea* (Hoyo *et al.*, 2003).

Status


Residente.

choquinha-de-garganta-clara – *Isleria hauxwelli* (Sclater, 1857)

Plain-throated Antwren



Macho

**Registros**

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 24582); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48279, 48280, 48281, 49719); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 48274, 48275, 48276, 48277, 48278); Rio Tejo, a aproximadamente 5 Km da foz, REAJ (Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 52132, 52133); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52608, 52609); arredores da cidade de Assis Brasil (Guilherme, 2004, AC 0087); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal (Guilherme, E., MPEG 59981, 59982, 59983, 59984, 59985; Lemos, T. & Marques, E., 596; Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60657, 60658, 60659; Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); Ramal Nabor Júnior, Km 26 (Guilherme, E., MPEG 60671); Floresta Estadual do Antimary, Localidade Limoeiro (Guilherme, E., MPEG 60662); Floresta Estadual do Antimary, Ramal Uirapuru (Guilherme, E., MPEG 60660, 60661); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 63541); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63349, 63350, 63351, 63352); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63353); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64382, 64383); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64488); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63743, 63744); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010, MPEG 70009, 70010); Rio Jurupari localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Município de Senador Guimard, BR 364, Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015).

choquinha-de-garganta-clara – *Isleria hauxwelli* (Sclater, 1857)

Plain-throated Antwren

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição GeográficaDa margem sul do Solimões/ Amazonas para o oeste, até a Bolívia, o Peru, o Equador e a Colômbia (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).**Taxonomia**São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *I. h. hauxwelli* (Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2003).**Status**

Residente.

Nome anterior*Myrmotherula hauxwelli*.

uirapuru-de-garganta-preta – *Thamnomanes ardesiacus* (Sclater & Salvin, 1867)

Dusky-throated Antshrike



Macho

Robson Czaban

**uirapuru-selado** – *Thamnomanes saturninus* (Pelzeln, 1878)

Saturnine Antshrike



Edson Guilherme

**Registros**

Arredores da cidade de Manoel Urbano (Silva, G. P., MPEG 40617); Rio Tejo, margem esquerda, a aproximadamente 5 Km da foz (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52131; Whittaker *et al.*, 2002); arredores da cidade de Assis Brasil (Guilherme, 2004, AC 0064); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal (Guilherme, E., MPEG 59969, 59972, 59973); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Guilherme, E., MPEG 59971); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60648); Ramal Nabor Júnior, Km 26 (Guilherme, E., MPEG 60646); Floresta Estadual do Antimary, Ramal Uirapuru (Guilherme, E., MPEG 60647); Município de Mâncio Lima, Estrada do Barão, Comunidade São Domingos (Guilherme, E., MPEG 62076, 62077); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008; Bueno, A. S., AC 0737); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63338); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63332, 63428); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62075); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64545); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63748); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD.

Distribuição GeográficaNorte do Solimões/Amazonas e localmente na Amazônia sul-ocidental (Brasil, Peru e Bolívia) (Hoyo *et al.*, 2003).**Taxonomia**São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *T. a. ardesiacus* (Hoyo *et al.*, 2003).**Status**

Residente.

Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 14307, 14308, 14309); Rio Juruá, Estirão do Carmo, próximo à Foz do Rio Grajaú (Novaes, 1957, MPEG 14310); Rio Juruá, arredores da cidade de Cruzeiro do Sul (Novaes, 1957, MPEG 14311); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48231, 48232, 48233, 48234, 49648, 49652, 49653, 49654, 49655, 49656); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 49647, 49649, 49650, 49651); Rio Tejo, margem esquerda, a aproximadamente 5 Km da foz (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52129, 52130, Whittaker *et al.*, 2002); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52128); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52606, 52607, 52631, 52605); Alto Rio Moa, margem direita, Igarapé Ramon, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52745); Rio das Minas, margem esquerda, Município de Porto Walter, Localidade Gustavo (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52910); Alto Rio Moa, margem esquerda, Serra da Jaquirana (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52746, 52747); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); BR-364 a 40 Km da ponte sobre o Rio Liberdade, margem direita (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60653, 60654, 60655); Município de Mâncio Lima, Estrada do Barão, Comunidade São Domingos (Guilherme, E., MPEG 62078); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão e localidades Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Rio Jurupari Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010, MPEG 70003); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Cruzeiro do Sul, BR 307, Ramal dos Caroba (Guilherme, E. AC 351, 357); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD submontana, campinarana.


Distribuição GeográficaAmazônia sul-ocidental (Brasil, Peru e Bolívia) (Hoyo *et al.*, 2003).**Taxonomia**São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *T. s. huallagae* (Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2003).**Status**

Residente.

ComentáriosEm Novaes (1957) este táxon foi nominado como *Dysithamnus saturninus*.



Macho

**Registros**

Rio Juruá, arredores da cidade de Cruzeiro do Sul (Novaes, 1957, MPEG 24563, 24564, 24566, 24567); Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 24562, 24565, 24568); arredores da cidade de Plácido de Castro (Forrester, 1993, observada); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 49645, 49646); Rio Tejo, margem esquerda, a aproximadamente 5 Km da foz (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52123; Whittaker *et al.*, 2002); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52124, 52125, 52126, 52127); Igarapé Preto, afluente do Rio Juruá-mirim, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52911); Alto Rio Moa, margem direita, Igarapé Ramon, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52744); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 76445, 76446, 76447, 76448); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; AC 656); arredores da cidade de Assis Brasil (Guilherme, 2004, AC 0063, 0085); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004, MPEG 58375); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal e setor norte (Guilherme, E., MPEG 59967, 59968; Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60649, 60650, 60651; Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); Floresta Estadual do Mogno, BR-364, a 6 Km da ponte sobre o Rio Tauari (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60652); Estrada Transacrea (AC-090) Km 60, margem esquerda (Guilherme, E., MPEG 61421; 61422); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61335); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 59840, 59841, 58890, 58891); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão e localidades Pará, Manaus e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Rio Chandless, margem esquerda, a aproximadamente 3 Km da foz (Guilherme & Dantas, 2008a, 2011, MPEG 63333, 63334); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63331); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 65530); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64456, 64492); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63749, 63750, 63751); Rio Jurupari, Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Jurupari Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010, MPEG 70005); Município de Senador Guiomard, Localidade Bonal (Guilherme, E. & Souza, G., AC 563, 567) AC ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Município de Senador Guiomard, BR 364, Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015); BR 317, margem esquerda, área adjacente à Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015); Município de Rio Branco, Estrada da Piçarreira (Marques, 2015).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Ocorre no leste do Peru, no norte da Bolívia e na Amazônia sul-ocidental brasileira. Espécie restrita ao centro de endemismo Inambari (Haffer, 1978, Cracraft, 1985).

TaxonomiaSão reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *T. s. schistogynus* (Hoyo *et al.*, 2003).**Status**

Residente.

ComentáriosEm Novaes (1957), este táxon foi nominado como *Thamnomanes caesius schistogynus*.

tovaquinha – *Dichrozona cincta* (Pelzeln, 1868)
Banded Antbird



Silvia Faustino Linhares



Registros

Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 49708); Rio Tejo, margem esquerda, a aproximadamente 5 Km da foz (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52017); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52143); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 58904); Município de Jordão localidades Távora e Pará (Dantas, n. p. - 2010); Rio Jurupari Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010, MPEG 70004, 70022, 70023).

Habitat

FOA com palmeiras, FOA/FOD aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Margem sul do Rio Amazonas, da foz para o noroeste, até a Colômbia e Venezuela (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

chorozinho-de-asa-vermelha – *Herpsilochmus rufimarginatus* (Temminck, 1822)
Rufous-winged Antwren



Anselmo D'Affonseca



Macho

Registros

ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2008, 2010; MPEG 59861, 59862); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008).

Habitat

Dossel de FOA com palmeiras.

Distribuição Geográfica

Do Panamá ao norte da Argentina e em quase todo o Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia


São reconhecidas quatro subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *H. r. frater* (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.



Macho



Bertrando Campos



Macho



Robson Czaban

Registros

Arredores da cidade de Rio Branco (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35713); Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 14258); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 76443); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Floresta Estadual do Antimary, Localidade Limoeiro (Guilherme, E., MPEG 60627); Floresta Estadual do Mogno, BR-364, a 6 Km da ponte sobre o Rio Tauari (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60628); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60629; Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); Estrada Transacrea (AC-090) Km 60, margem esquerda (Guilherme, E., MPEG 61534); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61296); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão e localidades Veneza e Pará (Dantas, n. p. - 2010); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 63529); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63330); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64380, 64381); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Assis Brasil, Estrada da Pedreira, Localidade Museu (Guilherme, E., MPEG 70899); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Reserva Humaitá – Ufac, setor norte (Silva *et al.*, 2015); Município de Plácido de Castro, BR-364, Ramal do 45 (Marques, 2015); Município de Porto Acre, mata ripária adjacente à Reserva Humaitá, setor norte (Marques, 2015).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, área aberta com cultivares.

Distribuição Geográfica

Do México até a Argentina e em quase todo o Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas 12 subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *T. d. radiatus* (Hoyo *et al.*, 2003). Pinto & Camargo (1954) e Novaes (1957) consideram a forma existente no Acre como sendo a *T. d. subradiatus*. Entretanto, estou adontando a classificação de Hoyo *et al.* (2003) que considera a forma *T. d. subradiatus* como sinônimo de *T. d. radiatus*.

Status

Residente.

Registros

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35714, 35715); Rio Juruá, arredores da cidade de Cruzeiro do Sul (Novaes 1957, 1958, MPEG 14180, 14181, 14182); arredores da cidade de Manoel Urbano (Silva G. P., MPEG 47761); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 49638, 49639, 49640, 49641); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; AC 633); arredores da cidade de Assis Brasil (Guilherme, 2004); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Rio Liberdade, margem direita, próximo à Foz do Igarapé Novena (Guilherme, 2007, MPEG 60642); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60639, 60640, 60641; Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); Ramal Nabor Júnior, Km 26 (Guilherme, E., MPEG 60643); Estrada Transacrea (AC-090) Km 60, margem direita (Guilherme, E., MPEG 61535); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61301, 61302, 61303); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 59838, 59839, 58892); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Município de Jordão, localidades Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste e norte (Guilherme, E., MPEG 63540, 63544; Silva *et al.*, 2015); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64521); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63742); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Senador Guionard, Localidade Bonal (Guilherme, E. & Souza, G., AC 554, 561); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Ocorre da Colômbia até a Bolívia, na calha sul do Rio Solimões/Amazonas e, localmente, na calha norte (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *T. s. schistaceus* (Pinto & Camargo, 1954; Hoyo *et al.*, 2003, Guilherme, 2009).

Status

Residente.

choca-murina – *Thamnophilus murinus* Sclater & Salvin, 1868
Mouse-colored Antshrike




Macho

Anselmo D'Alfonseca



choca-lisa – *Thamnophilus aethiops* Sclater, 1858
White-shouldered Antshrike



Edson Guilherme



Macho

Taxonomia

Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 48228, 48229); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 49683); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004, MPEG 58374); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Ramal Nabor Júnior, Km 26 (Guilherme, E., MPEG 60644, 60645); Estrada Transacrea (AC-090) Km 60, margem direita (Guilherme, E., MPEG 61417); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62072); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63752); Município de Cruzeiro do Sul, BR 307, Ramal dos Caroba (Guilherme, E. AC 369, 395); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Em quase toda a Amazônia (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *T. m. canipennis* (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 14187, 14188, 14189); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 49642, 49643); Rio das Minas, margem esquerda, Município de Porto Walter, Localidade Gustavo (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52909); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 48226); Rio Tejo, margem esquerda, a aproximadamente 5 Km da foz (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52118, 52119; Whittaker *et al.*, 2002); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52120); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80177); Parque Nacional da Serra do Divisor, 106 Km a sudoeste de Cruzeiro do Sul (Aleixo, A. & Polletto, F, MPEG 58016); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); BR-364, Seringal Sardinha (Guilherme, E., MPEG 61479); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal e setor norte (Guilherme, E., AC, 0192, 0193, 0194, 0195, 0588, 0590; MPEG 59961, 59962, 59963, 59964, 59965; Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); Rio Branco, Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Guilherme, E., MPEG 59966, 59970); BR-364 a 40 Km da ponte sobre o Rio Liberdade, margem direita (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60630, 60631, 60632); Floresta Estadual do Antimary, Localidade Limoeiro (Guilherme, E., MPEG 60633, 60634, 60635, 60636); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60638; Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); Ramal Nabor Júnior, Km 26 (Guilherme, E., MPEG 60637); Estrada Transacrea (AC-090) Km 60, margem esquerda e direita (Guilherme, E., MPEG 61419, 61420, 61418); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61297, 61298, 61299, 61300); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 59837); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Município de Jordão Localidade Távora (Dantas, n. p. - 2010); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62071); Município de Mâncio Lima, Estrada do Barão, Comunidade São Domingos (Guilherme, E., MPEG 62069, 62070); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63336, 63337); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64547, 64548); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64505); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Mâncio Lima, Comunidade Santa Bárbara (Guilherme, E., AC 610); Município de Senador Guiomard, Localidade Bonal (Guilherme, E. & Souza, G., AC 536); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); BR 317, margem esquerda, área adjacente à Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015).

choca-lisa – *Thamnophilus aethiops* Sclater, 1858
White-shouldered Antshrike

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Norte da América do Sul (Amazônia) e na Mata Atlântica brasileira (Pernambuco e Alagoas) (Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas dez subespécies (Hoyo *et al.*, 2003). Três formas ocorrem no Acre: *T. a. juruanus* e *T. a. kapouni*, encontradas em todo o Estado (Novaes, 1957; Guilherme, 2009; Guilherme, 2012; Thom & Aleixo, 2015) e *T. a. injunctus*, encontrada apenas no extremo leste do Acre (Thom & Aleixo, 2015).

Status

Residente.

choca-canela – *Thamnophilus amazonicus* Sclater, 1858
Amazonian Antshrike



Robson Czaban



Casal

Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Município de Rio Branco, estrada Transacreaana, Ramal do Noca (Lopes, L., AC 804).

Habitat

FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Norte da América do Sul (Amazônia) (Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é *T. a. amazonicus* (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.



Macho

Guillermo Knell



Edson Guilherme



Fêmea

Registros

Alto Rio Moa, Localidade Morro Queimado, Serra da Jaquirana, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997; Whitney *et al.*, 2004, MPEG 52748, 52749, 52750, 52751, 52752, 52753, 52754, 52755).

Habitat

FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Extremo-oeste da Amazônia sul ocidental (Brasil e Peru) (Whitney *et al.*, 2004; Schulenberg *et al.*, 2007). Espécie descrita a partir de espécimes coletados no extremo-oeste do estado do Acre (Whitney *et al.*, 2004).

Taxonomia

Espécie monotípica (Whitney *et al.*, 2004).

Status

Residente.

Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 59835); Estrada Transacrea (AC-090) Km 60, margem esquerda (Guilherme, E., MPEG 61532); Floresta Estadual do Antimary, Localidade Limoeiro (Guilherme, E., MPEG 60626); Município de Jordão localidades Manaus, Távora, Veneza e Pará (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64455); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013, AC 690).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

Ocorre na América Central (a partir de Honduras) e no norte da América do Sul (das Guianas até a Bolívia) (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *C. l. intermedius* (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.


choca-do-bambu – *Cymbilaimus sanctaemariae* Gyldenstolpe, 1941

Bamboo Antshrike



Macho

Robson Czaban


**choró-boi** – *Taraba major* (Vieillot, 1816)

Great Antshrike



Macho

Bertrando Campos

**Registros**

Arredores da cidade de Rio Branco, Seringal Nova Empresa (Pierpont & Fitzpatrick, 1983; LSUMZ 68109); Rio Juruá, Localidade Arara (Whittaker & Oren, 1999); Rio Amônia, Localidade Quieto (Whittaker & Oren, 1999); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61293, 61294, 61295); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2008, MPEG 58888, 58889); Parque Zoológico da Ufac, Rio Branco (Zimmer *et al.*, 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); AC, Município de Manuel Urbano - Ramal da Cigana (Crozariol, M. A., Melo, T. N. e Leite, G., MNRJ 49525).

Habitat

FOA com bambus, FOA aluvial com bambus.

Distribuição Geográfica

Amazônia sul ocidental (sudeste do Peru e norte da Bolívia). No Brasil, é encontrada no Acre e no estado de Rondônia (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003). Esta espécie está associada às florestas com bambus no sudoeste amazônico (Stotz *et al.*, 1996).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

Registros

Arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35709, 35710, 35711, 35712); Rio Juruá, arredores da cidade de Cruzeiro do Sul (Novaes, 1957, 1958, MPEG 26662); Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957); Parque Nacional da Serra do Divisor, Alto Rio Moa, margem direita, Igarapé Ramon (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52743); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 76440, 76441, 76442); arredores da cidade de Assis Brasil (Guilherme, 2004); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Rio Liberdade, margem direita, próximo à Foz do Igarapé Novena (Guilherme, 2007, MPEG 60624, 60623); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61292); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 59836); Floresta Estadual do Antimary, Localidade Limoeiro (Guilherme, E., MPEG 60621); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60622; Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); *Campus* da Ufac, Rio Branco (Guilherme, E., MPEG 60623); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62073, 62074); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Plácido de Castro, BR-364, Ramal do 45 (Marques, 2015); Município de Porto Acre, mata ripária adjacente à Reserva Humaitá, setor norte (Marques, 2015).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Do México até a Argentina e em quase todo o Brasil (Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas dez subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *T. m. melanurus* (Pinto & Camargo, 1954; Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

borralhara-ondulada – *Frederickena unduliger* (Pelzeln, 1868)

Undulated Antshrike



Fêmea

Edson Guilherme




Peru

Bolivia

solta-asa – *Hypocnemoides maculicauda* (Pelzeln, 1868)

Band-tailed Antbird



Macho

Celso B. Almeida



Peru

Bolivia

Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MZUSP 42283); Alto Rio Moa, margem direita, Igarapé Ramon, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52742); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

Região oeste-setentrional da América do Sul (Colômbia, Brasil, Equador, Peru e Bolívia) (Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas quatro subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *F. u. pallida* (Novaes, 1957; Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

Nome anterior

Frederickena unduligera.

Registros

Rio Juruá, arredores da cidade de Cruzeiro do Sul (Novaes, 1957, MPEG 24654, 24655); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48236, 49698); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 49697); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004, MPEG 58376); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013, AC 70).

Habitat

FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Ao sul do Rio Solimões/Amazonas, do estado do Pará no Brasil, para o oeste, até o Peru e a Bolívia (Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.


guarda-floresta – *Hylophylax naevius* (Gmelin, 1789)

Spot-backed Antbird




Fêmea

Celso B. Almeida

**guarda-várzea** – *Hylophylax punctulatus* (Des Murs, 1856)

Dot-backed Antbird



Macho

Edson Guilherme

**Registros**

Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 49704, 49705, 49706, 49707); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 49702, 49703); Rio Tejo, a aproximadamente 5 Km da foz, REAJ (Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 52180, 52181, 52182); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52184, 52185); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52621, 52622, 52623); Alto Rio Moa, margem direita, Igarapé Ramon, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52771, 52772); arredores da cidade de Assis Brasil (Guilherme, 2004, AC 0088, 0089); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004, MPEG 58377); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal (Guilherme, E., MPEG 59998, 59999); Rio Liberdade, margem direita, próximo à Foz do Igarapé Novena (Guilherme, 2007, MPEG 60688, 60689); Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61307); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 58899, 58900, 58901, 59853, 59854); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Município de Jordão, localidades Távora, Veneza e Pará (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63362); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63430); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63764); Município de Assis Brasil, Estrada da Pedreira, Localidade Museu (Guilherme, E., MPEG 70906).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Em quase toda a Amazônia, das Guianas até a Bolívia (Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas cinco subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *H. n. inexpectatus* (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

Registros

Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A.; MPEG 49701); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013, AC 692, 703).

Habitat

FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Ocorre pontualmente em quase toda a Amazônia, das Guianas até a Bolívia (Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

papa-formiga-do-igarapé – *Sclateria naevia* (Gmelin, 1788)

Silvered Antbird



Fêmea

Edson Guilherme

**formigueiro-cinza** – *Myrmelastes schistaceus* (Sclater, 1858)

Slare-colored Antbird



Fêmea

Edson Guilherme

**Registros**

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35725, 35726); Rio Juruá, arredores da cidade de Cruzeiro do Sul (Novaes, 1957, MPEG 24662); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48235, 49699); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 49700); Rio Tejo, margem esquerda a aproximadamente 5 Km da foz (Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 52164); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Floresta Estadual do Antimary, Localidade Limoeiro (Guilherme, E., MPEG 60683); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63756); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013, AC 717); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal (Silva *et al.*, 2015); Município de Senador Guiomard, BR 364, Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Em quase toda a Amazônia, das Guianas até a Bolívia (Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas quatro subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *S. n. argentata* (Pinto & Camargo, 1954; Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 24658, 24659, 24660, 24661); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48237, 49679, 49680, 49681, 49682); Rio Juruá, margem direita, Localidade Mato Grosso (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52152, Whittaker *et al.*, 2002); Floresta Estadual do Mogno, BR-364, a 6 Km da ponte sobre o Rio Tauari (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007 – citado como *S. leucostigma*, MPEG 60898).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Noroeste da Amazônia (Colômbia, Equador, Peru e Brasil) (Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

Nome anterior


Schistocichla schistacea; *Percnostola schistacea*.

formigueiro-chumbo – *Myrmelastes hyperythrus* (Sclater, 1855)

Plumbeous Antbird



Macho

**Registros**

Arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35716); Rio Juruá, arredores da cidade de Cruzeiro do Sul (Novaes, 1957, MPEG 24664, 24665, 24666, 24667, 24668, 24669, 24670, 24671, 24672); arredores da cidade de Rio Branco, Seringal Nova Empresa (Hidasi, J., CPJH 422); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 49627, 49628); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 49626); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001, AC 637); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61313); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 64567); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 63531, 63532, 63533 63534); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63758, 63759); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 59842, 59843, 58908); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Jurupari Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Município de Rio Branco, Estrada da Piçarreira (Marques, 2015); Município de Porto Acre, mata ripária adjacente à Reserva Humaitá, setor norte (Marques, 2015).

Habitat

FOA com bambus/palmeiras, FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Amazônia ocidental (Colômbia, Equador, Peru, Brasil e Bolívia) (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

Nome anterior

Myrmeciza hyperythra.

formigueiro-de-cauda-curta – *Myrmelastes bumaythae* (Hellmayr, 1907)

Humaita Antbird



Macho

**Registros**

Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Seringal Sardinha (Guilherme, E., MPEG 61480, AC 0120); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal (Guilherme, E., MPEG 60012); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63851); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010).

Habitat

FOA com bambus/palmeiras.

Distribuição Geográfica

Região central e sudoeste da Amazônia brasileira e no norte da Bolívia (Departamento de Pando). (Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

Este táxon foi considerado por Hoyo *et al.* (2003) como subespécie de *Schistocichla leucostigma*. Entretanto, Isler *et al.* (2007) e Isler *et al.* (2013), baseados em análises genéticas, nas vocalizações, no comportamento e na distribuição geográfica dos táxons que compõe o complexo *S. leucostigma* na Amazônia, elevaram a forma *S. l. bumaythae* a espécie plena em um novo gênero - *Myrmelastes*.

Status

Residente.

Nome anterior

Schistocichla bumaythae.

formigueiro-de-asa-pintada – *Myrmelastes leucostigma* (Pelzeln, 1868)

Spot-winged Antbird



Fêmea



Robson Czaban

Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013, AC 695, 698); Município de Xapuri, Seringal Cachoeira (Silva, G. C. 2015. [Wikiaves - WA2006156]).

Habitat

FOA com bambus/palmeiras, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Extremo-oeste da Venezuela em direção a base dos Andes na Colômbia até o nordeste do Peru. Ocorre no extremo sudoeste da Amazônia brasileira nos estados do Amazonas e Acre (Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

Nove subespécies foram reconhecidas (Hoyo *et al.*, 2003); após uma revisão taxonômica baseada em análises genéticas e comportamentais, quatro subespécies foram elevadas à espécies plenas (Isler *et al.* 2013). A forma que ocorre no oeste do Acre é a *M. l. subplumbea* (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

Nomes anteriores

Percnostola leucostigma, *Schistocichla leucostigma*.

formigueiro-do-bambu – *Myrmoborus lophotes* (Hellmayr & Seilern, 1914)

White-lined Antbird



Ricardo Plácido



Macho

Registros

Rio Juruá, Foz do Rio Tejo (Whittaker & Oren, 1999, MPEG 52153); Rio Tejo, Localidade Machadinho (Whittaker & Oren, 1999); Rio Tejo, base de pesquisa Restauração (Whittaker & Oren, 1999); Rio Juruá, Localidade Nossa Senhora Aparecida (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52915); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80188, 80189, 80190, 80191); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61317); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2008, 2010); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); municípios de Xapuri e Brasiléia (DeLuca, 2012); Município de Bujari, Floresta Estadual do Antimary (DeLuca, 2012); Rio Jurupari Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010).

Habitat

FOA com bambus, FOA aluvial com bambus.

Distribuição Geográfica

Sudoeste da Amazônia (Peru, Brasil e Bolívia) (Hoyo *et al.*, 2003). Espécie pertencente ao centro de endemismo Inambari (Haffer, 1978; Crraft, 1985) e também associada às florestas com bambus no sudoeste amazônico (Stotz *et al.*, 1996).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

Nome anterior


Percnostola lophotes.

formigueiro-de-cara-preta – *Myrmoborus myotherinus* (Spix, 1825)

Black-faced Antbird



Macho

**Registros**

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 24648, 24649, 24650); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 49684, 49685, 49686); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 49686, 49687, 49688, 49689, 49690, 49691, 49692, 49693, 49694); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52148, 52149); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52624, 52625); Alto Rio Moa, margem direita, Igarapé Ramon, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52768); Igarapé Preto, afluente do Rio Juruá-mirim, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52912); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80187); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); BR-364, Seringal Sardinha (Guilherme, E., AC 0101, 0115, 0132, 0135); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005, Guilherme, E., MPEG 60002, 60003, 60004); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal (Guilherme, E., MPEG 60005, 60006, 60007, 60008, 60009; Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); BR-364 a 40 Km da ponte sobre o Rio Liberdade, margem direita (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60677); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008; Bueno, A. S., AC 0734, 0743); Floresta Estadual do Mogno, BR-364, a 6 Km da ponte sobre o Rio Tauari (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60679, 60680); Floresta Estadual do Antimary, Localidade Limoeiro (Guilherme, E., MPEG 60681, 60682); Floresta Estadual do Antimary, Ramal Uirapuru (Guilherme, E., MPEG 60678); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61306); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Município de Jordão localidades Távora e Pará (Dantas, n. p. - 2010); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62095); Município de Mâncio Lima, Estrada do Barão, Comunidade São Domingos (Guilherme, E., MPEG 62096, 62097); Rio Chandless, margem esquerda, a aproximadamente 3 Km da foz (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63359); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63360, 63361); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63753, 63754, 63755); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010, MPEG 70013); Rio Jurupari localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Cruzeiro do Sul, BR 307, Ramal dos Caroba (Guilherme, E. AC 347); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

formigueiro-de-cara-preta – *Myrmoborus myotherinus* (Spix, 1825)

Black-faced Antbird

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, campinarana.

Distribuição GeográficaEm quase toda a Amazônia, da Venezuela até a Bolívia (Hoyo *et al.*, 2003).**Taxonomia**São reconhecidas sete subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *M. m. myotherinus* (Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2003).**Status**


Residente.

papa-formiga-de-sobrancelha – *Myrmoborus leucophrys* (Tschudi, 1844)

White-browed Antbird



Macho

**formigueiro-grande** – *Aketos melanoceps* (Spix, 1825)

White-shouldered Antbird



Macho



Edson Guilherme

Registros

Rio Juruá, arredores da cidade de Cruzeiro do Sul (Novaes, 1957, MPEG 24647); Rio Tejo, a aproximadamente 5 Km da foz, REAJ (Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 52150, 52151); Alto Rio Moa, margem direita, Igarapé Ramon, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52769); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80166, 80167, 80168, 80169, 80170); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; AC 0007); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal (Guilherme, E., MPEG 60010); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60684); Rio Liberdade, margem direita, próximo à Foz do Igarapé Novena (Guilherme, 2007, MPEG 60742, 60684, 60685, 60686, 60687); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008; Bueno, A. S., AC 0741); Estrada Transacrea (AC-090) Km 60, margem esquerda (Guilherme, E., MPEG 61430); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61304, 61305); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 59860, 58897, 58898); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63429); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64493); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Assis Brasil, Estrada da Pedreira, Localidade Museu (Guilherme, E., MPEG 70905); BR 317, margem esquerda, área adjacente à Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015); Município de Porto Acre, mata ripária adjacente à Reserva Humaitá, setor norte (Marques, 2015).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Em quase toda a Amazônia, das Guianas até a Bolívia (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas quatro subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *M. l. leucophrys* (Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

Registros

Rio Juruá, arredores da cidade de Cruzeiro do Sul (Novaes, 1957, MPEG 24679); Rio Juruá, Estirão do Carmo, próximo à Foz do Rio Grajaú (Novaes, 1957, MPEG 24678); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013, AC 694, 701).

Habitat

FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Amazônia ocidental (Colômbia, Equador, Peru e Brasil) (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2003; Isler *et al.* 2013).

Status

Residente.


Nome anterior

Myrmeciza melanoceps.



Macho

Edson Guilherme



Peru

Bolívia

Registros

Rio Tejo, a aproximadamente 5 Km da foz, REAJ (Whittaker & Oren, 1999; Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 52155); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 76433, 76434, 76435, 76436, 76437, 76438, 76439); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal (Guilherme, E., MPEG 60011); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Guilherme, E., MPEG 61536); Estrada Transacrea (AC-090) Km 60, margem esquerda (Guilherme, E., MPEG 61537); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008; Bueno, A. S., AC 0742); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61311, 61312, 61314, 61315); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2008, 2010; MPEG 58906, 58907, 59844, 59845); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 63535, 63536); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2008a, 2011, MPEG 63354); Rio Jurupari Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Assis Brasil, Estrada da Pedreira, Localidade Museu (Guilherme, E., MPEG 70907, 70908, 70909); municípios de Assis Brasil, Brasiléia e Xapuri (DeLuca, 2012); Município de Bujari, Floresta Estadual do Antimary (DeLuca, 2012); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 e Ramal do 45 (Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015).

Habitat

FOA com bambus, FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Amazônia sul-ocidental (Brasil, Peru e Bolívia) (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003). Espécie restrita ao centro de endemismo Inambari (Haffer, 1978, Cracraft, 1985).

Taxonomia


Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2003; Isler *et al.* 2013).

Status

Residente.

Nome anterior

Myrmeciza goeldii.



Peru

Bolívia

Edson Guilherme



Fêmea

Registros

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35708); Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 24674, 24675, 24676, 24677); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48250, 49629, 49630); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 49631); Rio Tejo, a aproximadamente 5 Km da foz, REAJ (Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 52160, 52161, 52162, 52163); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52633); Rio Ouro Preto, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52904); arredores da cidade de Manoel Urbano, BR-364 (Silva, G. P., MPEG 47811, 47812); BR-364, Seringal Sardinha (Guilherme, E., MPEG 61481); Parque Nacional da Serra do Divisor, 106 Km a sudoeste de Cruzeiro do Sul (Aleixo, A. & Polleto, F, MPEG 58017); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60707, 60708); BR-364 a 40 Km da ponte sobre o Rio Liberdade, margem direita (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60701, 60702, 60703, 60704, 60730); Floresta Estadual do Mogno, BR-364, a 6 Km da ponte sobre o Rio Tauari (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60700); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008; Bueno, A. S., AC 0735); Floresta Estadual do Antimary, Ramal Uirapuru (Guilherme, E., MPEG 60705, 60706); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 59846); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Município de Jordão Localidade Manaus (Dantas, n. p. - 2010); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63539, 63639, 63640); Rio Chandless, margem esquerda, a aproximadamente 3 Km da foz (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63355); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63356); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63760); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010, MPEG 70012); Rio Jurupari Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010, MPEG 70025).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD.

Distribuição Geográfica

Amazônia ocidental (Colômbia, Equador, Peru, Brasil e Bolívia) (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *H. f. fortis* (Hoyo *et al.*, 2003; Isler *et al.* 2013).

Status


Residente.

Nome anterior

Myrmeciza fortis.



Fêmea

**Registros**

Rio Abunã, margem esquerda (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35717); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48251, 49632, 49633); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 49634, 49635, 49636); Rio Tejo, a aproximadamente 5 Km da foz, REAJ (Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 52157, 52158, 52159); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52156); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52632); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80178, 80179, 80180, 80181, 80182, 80183, 80184) Parque Zoológico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; AC 0005, 0008, 0641, 764); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005, Guilherme, E., MPEG 60015, 60016, 60017, 60018); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal e setor norte (Guilherme, E., AC 199; MPEG 60013, 60014; Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60698; Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); Ramal Nabor Júnior, Km 26 (Guilherme, E., MPEG 60696); Floresta Estadual do Mogno, BR-364, a 6 Km da ponte sobre o Rio Tauari (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60699); Floresta Estadual do Antimary, Ramal Uirapuru (Guilherme, E., MPEG 60697); Estrada Transacrea (AC-090) Km 60, margem esquerda e direita (Guilherme, E., MPEG 61431, 61432, 61433, 61434); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61309, 61310); Município de Mâncio Lima, Estrada do Barão, Comunidade São Domingos (Guilherme, E., MPEG 62089); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 63537, 63538); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 59847, 58905); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Município de Jordão Localidade Manaus (Dantas, n. p. - 2010); Rio Chandless, margem esquerda, a aproximadamente 3 Km da foz (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63358); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63357); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64549); Rio Jurupari Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010, MPEG 70024); Rio Jurupari Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010, MPEG 70018); Município de Senador Guiomard, Localidade Bonal (Guilherme, E. & Marques, E. L., AC 314, 323, 325; Guilherme, E. & Souza, G., AC 566); Município de Cruzeiro do Sul, BR 307, Ramal dos Caroba (Guilherme, E. AC 350); ARIE Japiim / Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Município de Senador Guiomard, BR 364,

Registros

Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015); BR 317, margem esquerda, área adjacente à Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015); Município de Rio Branco, Estrada da Piçarreira (Marques, 2015); Município de Plácido de Castro, BR-364, Ramal do 45 (Marques, 2015); Município de Porto Acre, mata ripária adjacente à Reserva Humaitá, setor norte (Marques, 2015).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

Margem sul do Rio Solimões/ Amazonas, do sudoeste do Pará até o nordeste da Bolívia (Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *S. b. hemimelaena* (Pinto & Camargo, 1954; Hoyo *et al.*, 2003; Isler *et al.* 2013)

Status

Residente.

Nome anterior


Myrmeciza hemimelaena.

chororó-pocua – *Cercomacra cinerascens* (Sclater, 1857)
Gray Antbird



Macho

Emerson Kaseker



chororó-negro – *Cercomacra nigrescens* (Cabanis & Heine, 1859)
Blackish Antbird



Macho

Robson Czaban



Registros

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35721, 35722); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A., MPEG 49637); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80175); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61338); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64457); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Xapurí, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão e localidades Távora, Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com bambus/palmeiras, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Em toda a Amazônia, das Guianas até a Bolívia (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas quatro subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *C. c. sclateri* (Pinto & Camargo, 1954; Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

Registros

Arredores da cidade de Rio Branco (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35719); Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35720); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A., MPEG 49696); Parque Nacional da Serra do Divisor, Alto Rio Moa, margem direita, Igarapé Ramon (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52767); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80176); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62083); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010).

Habitat

FOA com bambus/palmeiras, FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Na Amazônia, das Guianas até a Bolívia (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).


Taxonomia

São reconhecidas seis subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *C. n. fuscicauda* (Pinto & Camargo, 1954; Hoyo *et al.*, 2003). Diferenças na vocalização de *C. n. fuscicauda* em relação às outras cinco subespécies de *C. nigrescens* levou os cientistas a considerarem esta forma como espécie plena. Em Piacentini *et al.*, (2015), este táxon é nominado como *Cercomacroides fuscicauda*.

Status


Residente.

chororó-preto – *Cercomacroides serva* (Sclater, 1858)
Black Antbird




Macho

Robson Czaban




chororó-de-manu – *Cercomacra manu* Fitzpatrick & Willard, 1990
Manu Antbird



Macho

Ciro Albano



Registros

Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A., MPEG 48239); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52147); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Guilherme, E., MPEG 59974); Estrada Transacrea (AC-090) Km 60, margem esquerda (Guilherme, E., MPEG 61426, 61427, 61428, 61429); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste e norte (Guilherme, E., MPEG 63549; Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); Município de Jordão localidades Távora e Pará (Dantas, n. p. - 2010).

Habitat

FOA com bambus/palmeiras, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

Amazônia ocidental, da Colômbia até a Bolívia (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

Registros

Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker & Oren, 1999 MPEG 48238); Rio Amônia, Localidade Quieto (Whittaker & Oren, 1999); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Tartaruga (Whittaker & Oren, 1999); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61336, 61337); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Plácido de Castro, BR-364, Ramal do 45 (Marques, 2015).

Habitat

FOA com bambus.

Distribuição Geográfica

Amazônia sul-ocidental (Brasil, Peru e Bolívia). Encontrada com frequência no estado do Acre e, pontualmente, no interflúvio Xingu/Tapajós, na Amazônia brasileira (Hoyo *et al.*, 2003). Espécie associada às florestas com bambus no sudoeste amazônico (Stotz *et al.*, 1996).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.



Bruno Rennó

**Registros**

Rio Tejo, a aproximadamente 5 Km da foz, REAJ (Bates *et al.*, 1999; Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 52144, 52145); margens dos rios Juruá, Tejo e Amônia (Whittaker & Oren, 1999); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80173, 80174); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004, MPEG 58380, 58381, 58382, 58383); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada Transacreaana (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61349, 61350); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010).

Habitat

FOA com bambus, FOA aluvial com bambus.

Distribuição Geográfica

Ao sul do Solimões/Amazonas (Brasil, Peru e Bolívia). É encontrada pontualmente também ao norte do Solimões (Equador e Colômbia) (Hoyo *et al.*, 2003). Espécie restrita às florestas com predominância de bambus no sudoeste amazônico (Stotz *et al.*, 1996; Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *D. d. devillei* (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.



Anselmo D'Affonseca

**Registros**

Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 49717, 49718); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 49711, 49712, 49713, 49714, 49715, 49716); Rio Juruá, margem direita, Localidade Mato Grosso (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52142, Bates *et al.*, 1999; Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52627); Alto Rio Moa, margem direita, Igarapé Ramon, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52770); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Floresta Estadual do Mogno, BR-364, a 6 Km da ponte sobre o Rio Tauari (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60889); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008, dúvida – ver comentários II); Município de Mâncio Lima, Estrada do Barão, Comunidade São Domingos (Guilherme, E., MPEG 62100); Município de Jordão, localidades Távora, Manaus e Pará (Dantas, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. -

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

Ocorre na Amazônia, do Rio Xingu para o oeste até a Colômbia, Equador e o Peru (Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *H. h. hypoxantha* (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.


Comentários

Guilherme (2001) cita a ocorrência desta espécie para o Parque Zoobotânico da Ufac. No entanto, minhas observações posteriores mostraram que a espécie de ocorrência no PZ é, na verdade, *Hypocnemis subflava* (Guilherme & Santos, 2009). Buzzetti (2008) cita a presença de *H. hypoxantha* para o Parque Estadual Chandless. No entanto, pela concentração dos registros de *H. hypoxantha* apenas no oeste do estado do Acre, é provável que a espécie observada pelo autor seja, na verdade, *H. subflava* (Guilherme & Santos, 2009).


cantador-galego – *Hypocnemis subflava* (Cabanis, 1873)
Yellow-breasted Warbling-Antbird




Emerson Kaseker



cantador-sinaleiro – *Hypocnemis peruviana* Taczanowski, 1884
Peruvian Warbling-Antbird



Bertrando Campos



Macho

Registros

Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001 – citado como *Hypocnemis hypoxantha*); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2008, 2010; MPEG 59855, 58903); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Isler *et al.*, 2007); Estrada Transacreeana (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61308); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal e setor norte (Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); BR 317, margem esquerda, área adjacente à Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015); Município de Porto Acre, mata ripária adjacente à Reserva Humaitá, setor norte (Marques, 2015); Município de Manoel Urbano, Rio Purus (Campos, B. 2015. [Wikiaves - WA1935314]).

Habitat

FOA com bambus, FOA aluvial com bambus.

Distribuição Geográfica

Ocorre na região central e sudeste do Peru, no norte e nordeste da Bolívia e nas terras baixas da Amazônia sul-ocidental brasileira (Acre) (Hoyo *et al.*, 2003). Espécie associada às florestas com bambus no sudoeste amazônico.

Taxonomia

Segundo Isler *et al.* (2007) a forma que ocorre no Acre é a *H. subflava collinsi*.

Status

Residente.

Comentários

Em Guilherme (2001) esta espécie aparece nominada como *H. hypoxantha* (correção feita em Guilherme & Santos, 2009).

Registros

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35723); arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35724); Rio Juruá, arredores da cidade de Cruzeiro do Sul (Novaes, 1957, MPEG 24653); arredores da cidade de Manoel Urbano, BR-364 (Humphrey, P. S., MPEG 47801); Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 24652); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48252); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80192, 80193); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60713, 60714, 60715, 60716, 60717; Silva *et al.*, 2015); Rio Liberdade, margem direita, próximo à Foz do Igarapé Novena (Guilherme, 2007, MPEG 60712); Floresta Estadual do Rio Gregório, próximo à ponte sobre o Rio Acuraua (Guilherme, 2007, MPEG 60711); Floresta Estadual do Antimary, Localidade Limoeiro (Guilherme, E., MPEG 60718); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62102); Município de Mâncio Lima, Estrada do Barão, Comunidade São Domingos (Guilherme, E., MPEG 62101); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., AC 0200. 0201, 0202, 0586; MPEG 63547, 63548; Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63370, 63371); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64384, 64550); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64494); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010, MPEG MPEG 70016); Rio Jurupari Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Jurupari Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010, MPEG 70017); ARIE Japiim/ Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Município de Senador Guiomard, BR 364, Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015); BR 317, margem esquerda, área adjacente à Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015).

cantador-sinaleiro – *Hypocnemis peruviana* Taczanowski, 1884
Peruvian Warbling-Antbird

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Sudeste do Peru, norte da Bolívia e no extremo-oeste da Amazônia sul-ocidental brasileira (Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

Este táxon foi considerado por muito tempo como uma subespécie do grupo *H. cantator* (Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 2003). Contudo, Isler *et al.* (2007) baseando-se nas diferenças morfológicas e de vocalização deste grupo, propuseram elevar o táxon *H. c. peruviana* à categoria de espécie plena. O mesmo foi proposto para o táxon *H. cantator subflava* (ver próximo táxon).


Status

Residente.

Nome anterior

Hypocnemis cantator.

rendadinho – *Willisornis poecilinotus* (Cabanis, 1847)
Common Scale-backed Antbird



Edson Guilherme



Macho

Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 24697, 24698); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48253, 48254, 48255); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 49709, 49710); Rio Tejo, a aproximadamente 5 Km da foz, REAJ (Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 52177, 52178, 52179); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52174, 52175, 52176); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, 1997, MPEG 52617, 52618, 52619, 52620); Rio das Minas, margem esquerda, Município de Porto Walter, Localidade Gustavo (Whitney *et al.*, 1997, MPEG 52908); Alto Rio Moa, margem esquerda, Serra da Jaquirana (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52773); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal e setor norte (Guilherme, E., MPEG 59990, 59991, 59992, 59993, 59994, 59995, 59996, 59997; Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); Ramal Nabor Júnior, Km 26 (Guilherme, E., MPEG 60695); BR-364 a 40 Km da ponte sobre o Rio Liberdade, margem direita (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60693, 60694); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Floresta Estadual do Antimary, Localidade Limoeiro (Guilherme, E., MPEG 60692); Floresta Estadual do Antimary, Ramal Uirapuru (Guilherme, E., MPEG 60690, 60691); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 58902, 59851, 59852); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62081, 62082); Município de Mâncio Lima, Estrada do Barão, Comunidade São Domingos (Guilherme, E., MPEG 62079, 62080); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63363, 63365, 63364, 63366); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64459); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63757); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010, MPEG 70014); ; Município de Cruzeiro do Sul, BR 307, Ramal dos Caroba (Guilherme, E. AC 348); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

rendadinho – *Willisornis poecilinotus* (Cabanis, 1847)

Common Scale-backed Antbird

Habitat


FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, campinarana.

Distribuição GeográficaEm toda a Amazônia, das Guianas até a Bolívia (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).**Taxonomia**São reconhecidas sete subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *W. p. griseiventris* (Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2003).**Status**


Residente.

Nome anterior*Hylophylax poecilinotus*.**mãe-de-taoca** – *Phlegopsis nigromaculata* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)

Black-spotted Bare-eye



Robson Czaban

**Registros**

Rio Juruá, arredores da cidade de Cruzeiro do Sul (Novaes, 1957, MPEG 24706, 24707, 24708, 24709, 24710); arredores da cidade de Rio Branco (Oren, D. C. 44218); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48243, 49671); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 48240, 48241, 48242, 49670); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52638); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80156, 80157, 80158, 80159, 80160, 80161, 80162, 80163, 80164); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); BR-364, Seringal Sardinha (Guilherme, E., obs. pess.); Rio Tejo, a aproximadamente 5 Km da foz, REAJ (Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 52187, 52188, 52189, 52190, 52191); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52186); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004, MPEG 58385); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal e setor norte (Guilherme, E., AC 0204; MPEG 60022, 60023, 60024, 60025; Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60735, 60736; Silva *et al.*, 2015); Floresta Estadual do Antimary, Ramal Uirapuru (Guilherme, E., MPEG 60733, 60734); Estrada Transacrea (AC-090) Km 60, margem esquerda (Guilherme, E., MPEG 61436, 61437); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61318, 61319, 61320; Crozariol, M. A., Melo, T. N. e Leite, G., MNRJ 49517); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 59867, 59868); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 63550, 63551); Rio Chandless, margem esquerda, a aproximadamente 3 Km da foz (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63373); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63372); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64461); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63761); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010, MPEG 70015); Rio Jurupari, localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Assis Brasil, Estrada da Pedreira, Localidade Museu (Guilherme, E., MPEG 70910, 70911); Município de Senador Guimard, Localidade Bonal (Guilherme, E. & Marques, E. L., AC 315; Guilherme, E. & Souza, G., AC 574, 576); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Município de Senador Guimard, BR 364, Fazenda Sinuelo

mãe-de-taoca – *Phlegopsis nigromaculata* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)

Black-spotted Bare-eye

Registros

(Silva *et al.*, 2015); BR 317, margem esquerda, área adjacente à Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015); Município de Plácido de Castro, BR-364, Ramal do 45 (Marques, 2015); Município de Porto Acre, mata ripária adjacente à Reserva Humaitá, setor norte (Marques, 2015).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD.

Distribuição Geográfica

Da margem sul do Amazonas (Pará) para o oeste, até a Colômbia e o Equador (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas quatro subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *P. n. nigromaculata* (Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

mãe-de-taoca-avermelhada – *Phlegopsis erythroptera* (Gould, 1855)

Reddish-winged Bare-eye



Edson Guilherme



Macho

Registros

Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48245, 48246, 48247, 48248); BR-364 a 40 Km da ponte sobre o Rio Liberdade, margem direita (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60731, 60732); Floresta Estadual do Mogno, BR-364, a 6 Km da ponte sobre o Rio Tauari (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60737).

Habitat

FOA com palmeiras.

Distribuição Geográfica

Em ambas as margens do Rio Solimões, da margem esquerda do Rio Madeira, para o oeste, até a Colômbia, o Equador, o Peru e o norte da Bolívia (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *P. e. ustulata* (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.



Macho

Edson Guilherme

**Registros**

ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); BR 317, margem esquerda, área adjacente à Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

Ao sul do Solimões, do Rio Madeira para o oeste, até o Peru e a Bolívia (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

Registros

Rio Juruá, arredores da cidade de Cruzeiro do Sul (Novaes, 1957, 1958, MPEG 24691, 24692); Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 24693, 24694, 24695); arredores da cidade de Manoel Urbano, BR-364 (Silva, G. P., MPEG 31546, 31547, 47862, 47863); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48290, 48291, 48305, 48306, 48307, 49677, 49678); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 48292, 48293, 48294, 48295, 48296, 48297, 48298, 48299, 48300, 48301, 48302, 48436, 48303, 48304); Rio Tejo, a aproximadamente 5 Km da foz, REAJ (Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 52165, 52166, 52167, 52168, 52169, 52170, 52171); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, 1997, MPEG 52628, 52629, 52630, 52634, 52635); Rio Ouro Preto, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52900, 52901); Alto Rio Moa, margem direita, Igarapé Ramon, PNSD (Whitney *et al.*, 1997, MPEG 52775); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal e setor norte (Guilherme, E., MPEG 60019, 60020; Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60722, 60723, 60724); Ramal Nabor Júnior, Km 26 (Guilherme, E., MPEG 60721); Floresta Estadual do Mogno, BR-364, a 6 Km da ponte sobre o Rio Tauari (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60725, 60726); Floresta Estadual do Antimary, Localidade Limociro (Guilherme, E., MPEG 60719, 60720); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61316); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 59848, 59849, 59850, 58895, 58896); Município de Mâncio Lima, Estrada do Barão, Comunidade São Domingos (Guilherme, E., MPEG 62098, 62099); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., AC 0203; MPEG 63546); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63368, 63369); Rio Chandless, margem esquerda, a aproximadamente 3 Km da foz (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63367); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64458, 64506); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010, MPEG 70028); Rio Jurupari, Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Cruzeiro do Sul, BR 307, Ramal dos Caroba (Guilherme, E. AC 346, 362); Município de Senador Guimard, Localidade Bonal (Guilherme, E. & Souza, G. AC 577);

mãe-de-taoca-cabeçuda – *Rhegmatorbina melanosticta* (Sclater & Salvin, 1880)

Hairy-crested Antbird



Fêmea



Edson Guilherme

chupa-dente-de-cinta – *Conopophaga aurita* (Gmelin, 1789)

Chestnut-belted Gnateater



Macho



Anselmo D'Afonseca

Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 24696); arredores da cidade de Manoel Urbano, BR-364 (Silva, G. P., MPEG 31545, 47837); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 49672, 49673, 49674); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 49675, 49676); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52172, 52173); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); BR-364 a 40 Km da ponte sobre o Rio Liberdade, margem direita (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60727, 60728, 60729); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal (Guilherme, E., MPEG 60021); Rio Jurupari, Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010, MPEG 70020, 70021).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Amazônia ocidental, do oeste do Rio Madeira até a Colômbia, Equador, Peru e Bolívia (Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *R. m. purusiana* (Hoyo *et al.*, 2003). Ver comentários em Guilherme (2009).

Status

Residente.

Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62103, 62104); Município de Mâncio Lima, Estrada do Barão, Comunidade São Domingos (Guilherme, E., MPEG 62105); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

Em quase toda a Amazônia, das Guianas ao Peru (Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas seis subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *C. a. australis* (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

Comentários

Whittaker & Oren (1999) indicam a presença desta espécie na Localidade Porongaba (Alto Juruá). Porém, ao checar o espécime MPEG 49695, identificado por eles como *Conopophaga aurita*, verifiquei que se tratava de uma fêmea de *Conopophaga peruviana*.



Tomaz Melo



Macho

Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 26650, 26651); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker & Oren, 1999, MPEG 49695); Alto Rio Moa, margem direita, Igarapé Ramon, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52776); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Alto Rio Acre, Foz do Igarapé dos Patos (Guilherme, E. AC 0036, 0037); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60885); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64385); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013, AC 715, 716); Município de Feijó, Rio Jurupari (Melo, T. N. 2015 [Wikiaves - WA1699355]).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Ocorre na Amazônia ocidental, da Bacia do Rio Purus no Brasil para o oeste, até o Equador, o Peru e o norte da Bolívia (Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.



Registros

Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Tartaruga (Whittaker & Oren, 1999); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002).

Habitat

FOA com bambus/palmeiras, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Amazônia sul-ocidental (Peru e Brasil) (Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.


Comentários

Os únicos registros desta espécie no Acre foram feitos a partir do reconhecimento de sua vocalização (Whitney *et al.*, n. p. - 1997; Whittaker *et al.*, 2002).

torom-torom – *Hylopezus berlepschi* (Hellmayr, 1903)
Amazonian Antpitta



Bertrando Campos



Registros

Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 49669); Rio Juruá, Localidade Nossa Senhora Aparecida (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52916, 52917); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, E., AC 0140); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD.

Distribuição Geográfica

Margem sul do Rio Solimões/Amazonas, da Bacia do Rio Xingu para o oeste, até o Peru e a Bolívia (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *H. b. berlepschi* (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

tovaca-patinho – *Myrmothera campanisona* (Hermann, 1783)
Thrush-like Antpitta



Tomaz Melo



Registros

Rio Juruá, arredores da cidade de Cruzeiro do Sul (Novaes, 1957, MPEG 24717); Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 24715, 24716); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 49668); Rio Juruá, margem direita, Localidade Mato Grosso (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52198); Rio Juruá, Localidade Nossa Senhora Aparecida (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52918); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Estrada Transacrea (AC-090) Km 60, margem esquerda (Guilherme, E., MPEG 61438); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Reserva Humaitá - Ufac (Melo, T. N., 2014 [Wikiaves - WA1371814]); Silva *et al.*, 2015); Município de Manoel Urbano, Alto Rio Purus, Seringal Oiapoque (Guilherme, E., 2014 [Wikiaves - WA1478929]).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Em toda a Amazônia, das Guianas até a Bolívia (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia


São reconhecidas seis subespécies (Hoyo *et al.*, 2003). Duas formas ocorrem no Acre: *M. c. minor*, na Bacia do Rio Juruá (Novaes, 1957) e uma subespécie indeterminada no leste do Estado, Bacia do Purus (Guilherme, 2009).

Status


Residente.



Leandro Moraes



Robson Czaban

**Registros**

Rio Tejo, a aproximadamente 5 Km da foz, REAJ (Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 52214); BR-364 a 40 Km da ponte sobre o Rio Liberdade, margem direita (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60873); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Jurupari Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010, MPEG 70040).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus.

Distribuição Geográfica

Da margem esquerda do Rio Tapajós para o oeste, até o Peru, o Equador e a Colômbia (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *L. t. thoracicus* (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

Registros

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35727); Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, 1958, MPEG 24686, 24687); Rio Juruá, Localidade Grajauzinho, próximo à Foz do Rio Grajaú (Novaes, 1957, MPEG 24688); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 49657); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 49658, 49659, 49660, 49661); Rio Tejo, a aproximadamente 5 Km da foz, REAJ (Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 52195, 52196, 52197); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52194); Igarapé Preto, afluente do Rio Juruá-mirim, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52913); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 59870); Município de Jordão, Localidade Távora (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63376, 63377); Rio Jurupari, Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Jurupari Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010, MPEG 70026, 70027); Município de Senador Guiomard, Localidade Bonal (Guilherme, E. & Souza, G. AC 548); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal e setor norte (Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, campinarana.

Distribuição Geográfica

Em toda a Amazônia, das Guianas até a Bolívia e também na Mata Atlântica, de Pernambuco ao Rio Grande do Sul (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia


São reconhecidas quatro subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *F. c. nigrifrons* (Pinto & Camargo, 1954; Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.



Tomaz Melo



Alexander Lees

**Registros**

Rio Juruá, arredores da cidade de Cruzeiro do Sul (Novaes, 1957, MPEG 13963, 24685); Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 24682, 24683); Rio Juruá, Localidade Grajauzinho, próximo à Foz do Rio Grajaú (Novaes, 1957, MPEG 24684); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48249, 49662, 49663, 49664); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 49665, 49666, 49667); Rio Tejo, a aproximadamente 5 Km da foz, REAJ (Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 52192); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52193); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52636, 52637); Rio Ouro Preto, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52914); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80165); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60740); Rio Liberdade, margem direita, próximo à Foz do Igarapé Novena (Guilherme, 2007, MPEG 60739); Floresta Estadual do Mogno, BR-364, a 6 Km da ponte sobre o Rio Tauari (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60738); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61321); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 59869); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão e localidades Távora, Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63375); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63374); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64462); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63762, 63763); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD.

Distribuição Geográfica

América Central e norte da América do Sul (Amazônia) (Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas 11 subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *F. a. analis* (Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

Registros

Rio Juruá, margem direita, Localidade Caipora (Whittaker & Oren, 1999); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2008, 2010); Município de Assis Brasil, Reserva Extrativista Chico Mendes (DeLuca, 2012).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Restrita a algumas localidades do sudoeste da Amazônia (Peru, Bolívia e Brasil). No Brasil, só foi registrada no estado do Acre (Hoyo *et al.*, 2003). Espécie pertencente ao centro de endemismo Inambari (Haffer, 1978, Cracraft, 1985).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.


tovaca-estriada – *Chamaeza nobilis* (Gould, 1855)
Striated Antthrush




Whaldener Endo



vira-folha-de-peito-vermelho – *Sclerurus macconnelli* Chubb, 1919
Tawny-throated Leaf-tosser



Ciro Albano



Registros

Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010; Guilherme, 2012).

Habitat

FOA com palmeiras.

Distribuição Geográfica

Região oeste da Amazônia (Colômbia, Equador, Peru Brasil e Bolívia). No Brasil, a sua distribuição estende-se para o sul da calha do Solimões/Amazonas até a margem esquerda do Rio Tapajós (Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *C. n. nobilis* (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

Comentários

Os únicos registros desta espécie no Acre foram feitos a partir do reconhecimento de sua vocalização.

Registros

Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52604); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 58883, 59825); Município de Jordão, localidades Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63326); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); Município de Senador Guimard, BR 364, Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015); BR 317, margem esquerda, área adjacente à Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015).

Habitat

FOA com bambus/palmeiras.

Distribuição Geográfica

Na América Central, no norte da América do Sul (Amazônia) e na Mata Atlântica brasileira (Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas sete subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *S. m. peruvianus* (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

Nome anterior

Sclerurus mexicanus.

vira-folha-de-bico-curto – *Sclerurus rufifularis* Pelzeln, 1868

Short-billed Leaf-tosser



Robson Czaban

**vira-folha-pardo** – *Sclerurus caudacutus* (Vieillot, 1816)

Black-tailed Leaf-tosser



Ciro Albano

**Registros**

Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A., MPEG 48225); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013, AC 697).

Habitat

FOA com palmeiras, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Em quase toda a Amazônia, das Guianas até a Bolívia (Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas quatro subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *S. r. rufifularis* (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 26600, 26601, 26602); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48223, 48224); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52602, 52603); Rio Ouro Preto, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52898); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal (Guilherme, E., MPEG 59959; Silva *et al.*, 2015); BR-364 a 40 Km da ponte sobre o Rio Liberdade, margem direita (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60620); Floresta Estadual do Antimary, Ramal Uirapuru (Guilherme, E., MPEG 60619); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada Transacreaana (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61290); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 59826); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63327, 63328, 63329); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64454); Rio Jurupari Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Município de Senador Guimard, BR 364, Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOD.

Distribuição Geográfica

Em toda a Amazônia, das Guianas até a Bolívia e na Mata Atlântica, do estado de Alagoas ao Espírito Santo (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).


Taxonomia

São reconhecidas cinco subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *S. c. brunneus* (Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

vira-folha-de-garganta-cinza – *Sclerurus albigularis* (Sclater & Salvin, 1869)
Gray-throated Leaf-tosser



Matckel Sand



arapaçu-pardo – *Dendrocincla fuliginosa* (Vieillot, 1818)
Plain-brown Woodcreeper



Anselmo D'Afonseca



Registros

Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Tartaruga (Whittaker & Oren, 1999); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2008, MPEG 58881, 58882); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61291).

Habitat

FOA com bambus/palmeiras.

Distribuição Geográfica

Sul da América Central (Costa Rica e Panamá) e na encosta andina da América do Sul, da Colômbia até a Bolívia (Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas seis subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *S. a. albicollis* (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

Registros

D. f. neglecta – Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 25965); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48166, 48167, 48168, 48169); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 48164, 48165); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52571, 52572); Igarapé Preto, afluente do Rio Juruá-mirim, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52889); Alto Rio Moa, margem direita, Município de Mâncio Lima (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52739); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Município de Mâncio Lima, Estrada do Barão, Comunidade São Domingos (Guilherme, E., MPEG 62048); Município de Cruzeiro do Sul, BR 307, Ramal dos Caroba (Guilherme, E. AC 335, 373); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013, AC 683).

D. f. atirostris - Flona Macauã (Matuscelli, P, MZUSP 76421); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, E., obs. pess.); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E. Obs. pess.); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005, Guilherme, E., MPEG 59938, 59939); Ramal Nabor Júnior, Km 26 (Guilherme, E., MPEG 60553, 60554); Floresta Estadual do Mogno, BR-364, a 6 Km da ponte sobre o Rio Tauari (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60556); Floresta Estadual do Antimary, Localidade Limoeiro (Guilherme, E., MPEG 60555); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61263); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 63652); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste e norte (Guilherme, E., MPEG 63522, 63523; Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 58879, 58880, 59796, 59797, 59798, 59799, 59800); Município de Jordão, localidades Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63300, 63301, 63302, 63303); Rio Chandless, margem esquerda, a aproximadamente 3 Km da foz (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63304); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64537, 64365, 64366, 64367); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64449, 64502, 64503); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63765, 63766, 63767);

Registros

Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Senador Guimard, Localidade Bonal (Guilherme, E. & Souza, G. AC 533, 552, 580); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); Município de Senador Guimard, BR 364, Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015); BR 317, margem esquerda, área adjacente à Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica


Na América Central, norte da América do Sul (Amazônia) e na Mata Atlântica (estados de Pernambuco e Alagoas) (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas 12 subespécies (Hoyo *et al.*, 2003). Duas formas ocorrem no estado do Acre: *D. f. atrirostris*, registrada nas regiões centro-leste e centro-oeste do Estado e *D. f. neglecta* encontrada apenas no extremo-oeste (margem esquerda do Rio Juruá) (Guilherme, 2009).

Status

Residente.



Robson Czaban

**Registros**

Município de Porto Acre, Localidade Humaitá, AC 010, Km 27 (Oren, D. C., MPEG 44215, 44216); Igarapé Preto, afluente do Rio Juruá-mirim, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52888); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52573, 52574); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48170, 48171, 48172); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 48173, 48174, 48175); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 76422, 76423, 76424, 76425); Parque Zoológico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Rio Tejo, a aproximadamente 5 Km da foz, REAJ (Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 52072); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal (Guilherme, E., AC 0205; MPEG 59936; Silva *et al.*, 2015); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60548, 60549; Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); Ramal Nabor Júnior, Km 26 (Guilherme, E., MPEG 60550, 60551, 60552); Floresta Estadual do Antimary, Ramal Uirapuru (Guilherme, E., MPEG 60547); Estrada Transacrea (AC-090), Km 60, margem esquerda (Guilherme, E., MPEG 61411, 61412); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarianl (Guilherme & Santos, 2009); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62045, 62046); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., 63520); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., AC 205; MPEG 63521); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63306); Rio Chandless, margem esquerda, a aproximadamente 3 Km da foz (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63305); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64538); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64448); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63768); Rio Jurupari Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010, MPEG 69994); Município de Senador Guimard, Localidade Bonal (Guilherme, E. & Souza, G. AC 540); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Município de Porto Acre, mata ripária adjacente à Reserva Humaitá, setor norte (Marques, 2015).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD.

Distribuição Geográfica

Em toda a Amazônia, das Guianas até a Bolívia (Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas sete subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *D. m. bartletti* (Hoyo *et al.*, 2003).


Status

Residente.

arapaçu-rabudo – *Deconychura longicauda* (Pelzeln, 1868)
Long-tailed Woodcreeper




Robson Czaban



arapaçu-verde – *Sittasomus griseicapillus* (Vieillot, 1818)
Olivaceous Woodcreeper



Robson Czaban



Registros

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35655); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52579, 52580); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48182, 48183, 48184); Rio Tejo, a aproximadamente 5 Km da foz, REAJ (Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 52076); Parque Nacional da Serra do Divisor, 106 Km a sudoeste de Cruzeiro do Sul (Aleixo, A. & Polleto, F, MPEG 58281); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Floresta Estadual do Antimary, Ramal Uirapuru (Guilherme, E., MPEG 60557, 60558); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60559, 60560); Ramal Nabor Júnior, Km 26 (Guilherme, E., MPEG 60561); Município de Jordão, localidades Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64368); Rio Jurupari, Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010, MPEG 69995).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOD.

Distribuição Geográfica

Ocorre na América Central (Honduras, Costa Rica e Panamá) e em toda a Amazônia (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas sete subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *D. l. pallida* (Pinto & Camargo, 1954; Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

Registros

Rio Juruá, Localidade Nossa Senhora Aparecida (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52892); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48188); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG. 48187); Rio Tejo, a aproximadamente 5 Km da foz, REAJ (Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 52075); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 76410, 76411, 76412); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005, Guilherme, E., MPEG 59940); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60576; Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); Rio Liberdade, margem direita, próximo à Foz do Igarapé Novena (Guilherme, 2007, MPEG 60575); Floresta Estadual do Antimary, Ramal Uirapuru (Guilherme, E., MPEG 60574); Estrada Transacreana (AC-090) Km 60, margem esquerda e direita (Guilherme, E., MPEG 61409, 61410, 61408); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada Transacreana (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61264); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 59807, 59808, 59809, 58875, 58876, 58877, 58878); Município de Jordão, localidades Távora, Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63307); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 63515); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64369); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63769); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Senador Guimard, Localidade Bonal (Guilherme, E. & Souza, G., AC 555); Município de Senador Guimard, BR 364, Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, campinarana.

Distribuição Geográfica

Do México até a Argentina e em quase todo o Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas 15 subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *S. g. amazonus* (Hoyo *et al.*, 2003).


Status

Residente.


arapaçu-de-garganta-pintada – *Certhiasomus stictolaemus* (Pelzeln, 1868)
Spot-throated Woodcreeper



Robson Czaban



arapaçu-bico-de-cunha – *Glyphorhynchus spirurus* (Vieillot, 1819)
Wedge-billed Woodcreeper



Robson Czaban



Registros

Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52581, 52582); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48185); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 48186); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Mâncio Lima, Estrada do Barão, Comunidade São Domingos (Guilherme, E., MPEG 62047, 62055); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013, AC 684).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, campinarana.

Distribuição Geográfica

Em quase toda a Amazônia, das Guianas ao Peru (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *C. s. secunda* (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

Nome anterior

Deconychura stictolaema.

Comentários

A presença desta espécie na lista das aves do Parque Zoobotânico da Ufac (Guilherme, 2001) foi baseada em uma pele de um dendrocolaptídeo, coletada em 01 de fevereiro de 1999 (AC009=MPEG 58953). No entanto, uma análise posterior desta pele mostrou tratar-se de um jovem de *Xiphorhynchus chunchotambo* (Guilherme & Aleixo, 2008).

Registros

Alto Rio Moa, margem direita, Igarapé Ramon, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52733, 52734); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52583); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48189, 48190, 48191, 48192, 48193, 48194, 48195, 48196, 48197, 48198, 49622, 49623, 49624); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 48199, 48200, 48201, 48202, 48203, 48204, 48205); Rio Tejo, a aproximadamente 5 Km da foz, REAJ (Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 52077); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52078, 52079; Whittaker *et al.*, 2002); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E. Capturada e fotografada); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., obs. pess.); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005, Guilherme, E., MPEG 59941; Lima, J., Ruan, R. & Silva, M. AC 806); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2008, MPEG 59810, 58874); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal e setor norte (Guilherme, E., MPEG 59942; Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60567, 60568, 60569; Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); Ramal Nabor Júnior, Km 26 (Guilherme, E., MPEG 60562, 60563, 60564); Rio Liberdade, margem direita, próximo à Foz do Igarapé Novena (Guilherme, 2007, MPEG 60565, 60566); BR-364 a 40 Km da ponte sobre o Rio Liberdade, margem direita (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60570); Floresta Estadual do Mogno, BR-364, a 6 Km da ponte sobre o Rio Tauari (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60571); Floresta Estadual do Antimary, Localidade Limoeiro (Guilherme, E., MPEG 60572); Floresta Estadual do Antimary, Ramal Uirapuru (Guilherme, E., MPEG 60573); Estrada Transacrea (AC-090) Km 60, margem esquerda (Guilherme, E., MPEG 61413); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Município de Jordão, localidades Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62060, 62061); Município de Mâncio Lima, Estrada do Barão, Comunidade São Domingos (Guilherme, E., MPEG 62056, 62057,

arapaçu-bico-de-cunha – *Glyphorhynchus spirurus* (Vieillot, 1819)

Wedge-billed Woodcreeper

Registros

62058, 62059); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64370, 64371, 64539); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64450, 64504); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63770, 63771); Rio Purus, localidades Santa Cruz Velha e Seringal Terra Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Município de Rio Branco, Parque Zoobotânico da Ufac (Guilherme, E., AC 622); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010, MPEG 69997); Rio Jurupari Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010, MPEG 69996); Rio Jurupari Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Assis Brasil, Estrada da Pedreira, Localidade Museu (Guilherme, E., MPEG 70913); Município de Cruzeiro do Sul, BR 307, Ramal dos Caroba (Guilherme, E. AC 354); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013, AC 689, 699); Município de Senador Guiomard, BR 364, Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015); BR 317, margem esquerda, área adjacente à Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015); Município de Plácido de Castro, BR-364, Ramal do 45 (Marques, 2015).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

América Central, norte da América do Sul (Amazônia) e na Mata Atlântica brasileira (estados da Bahia e Espírito Santo) (Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia


São reconhecidas 13 subespécies (Hoyo *et al.*, 2003). No Acre, ocorrem duas formas: *G. s. albigularis*, só encontrada no extremo sudeste do Estado (Aleixo & Guilherme, 2010) e *G. s. castelnandii*, distribuída em todo o Acre (Guilherme, 2012).

Status

Residente.

arapaçu-de-tschudi – *Xiphorhynchus chunchotambo* (Tschudi, 1844)

Tschudi's Woodcreeper



Edson Guilherme

**Registros**

Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme & Aleixo, 2008; MPEG 58953); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2008, Guilherme & Aleixo, 2008; MPEG 58864, 58865, 59806); Estrada Transacrea (AC-090) Km 60, margem direita (Guilherme & Aleixo, 2008; MPEG 61407); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008; Guilherme, E. & Marques, E., AC 0246, 0247); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61266, 61267, 61268, 61269); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Chandless, margem esquerda, a aproximadamente 3 Km da foz (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63314); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63313).

Habitat

FOA com bambus/palmeiras, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Noroeste da América do Sul. Ocorre próximo ao sopé dos Andes e das terras baixas adjacentes, desde a Colômbia até a Bolívia (Hoyo *et al.*, 2003). No Brasil, só foi registrada, até o momento, no estado do Acre (Guilherme & Aleixo, 2008).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *X. c. brevirostris* (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.


arapaçu-ocelado – *Xipborhynchus ocellatus* (Spix, 1824)
Ocellated Woodcreeper



Edson Guilherme



arapaçu-elegante – *Xipborhynchus elegans* (Pelzeln, 1868)
Elegant Woodcreeper



Robson Czaban



Registros

Arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35653); Rio Juruá, arredores da cidade de Cruzeiro do Sul (Novaes, 1957, 1958, MPEG 26628); Rio Branco, Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Rio Liberdade, margem direita, próximo à Foz do Igarapé Novena (Guilherme & Aleixo, 2008; Guilherme, 2007, MPEG 60596); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63773, 63774, 63775); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013, AC 693).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus.

Distribuição Geográfica

Em quase toda a Amazônia, da Venezuela até a Bolívia (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas quatro subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *X. o. perplexus* (Pinto & Camargo, 1954; Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

Registros

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35654; Raposo & Höfling 2003); Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 25841; Raposo & Höfling 2003); Rio Ouro Preto, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52891); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52575, 52576); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48155, 48156, 48157, 48158); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 48159, 48160, 48161, 48162, 48163); Rio Tejo, a aproximadamente 5 Km da foz, REAJ (Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 52086); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005, Guilherme, E., AC 0098, 0099; MPEG 59947) Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal (Guilherme, E., MPEG 59943, 59944, 59945, 59946); Ramal Nabor Júnior, Km 26 (Guilherme, E., MPEG 60589, 60590, 60591); BR-364 a 40 Km da ponte sobre o Rio Liberdade, margem direita (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60592); Floresta Estadual do Antimary, Localidade Limoeiro (Guilherme, E., MPEG 60593); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão e Localidade Távora (Dantas, n. p. - 2010); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62051, 62052); Município de Mâncio Lima, Estrada do Barão, Comunidade São Domingos (Guilherme, E., MPEG 62049, 62050); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste e norte (Guilherme, E., MPEG 63524; Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63308, 63609); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64376, 64377); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Jurupari Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010, MPEG 70002); Município de Cruzeiro do Sul, BR 307, Ramal dos Caroba (Guilherme, E. AC 365, 371); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013, AC 70); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Silva *et al.*, 2015); Município de Senador Guimard, BR 364, Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015); BR 317, margem esquerda, área adjacente à Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015); Município de Porto Acre, mata ripária adjacente à Reserva Humaitá, setor norte (Marques, 2015).

arapaçu-elegante – *Xiphorhynchus elegans* (Pelzeln, 1868)

Elegant Woodcreeper

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, campinarana.

Distribuição GeográficaNa Amazônia, da margem esquerda do Rio Tapajós para o oeste, até a Colômbia, o Equador, o Peru e a Bolívia (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).**Taxonomia**São reconhecidas cinco subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *X. e. juruanus* (Hoyo *et al.*, 2003).**Status**

Residente.

ComentáriosEm Pinto & Camargo (1954) e Novaes (1957) este táxon foi nominado como *Xiphorhynchus spixii juruanus*.**arapaçu-riscado** – *Xiphorhynchus obsoletus* (Lichtenstein, 1820)

Striped Woodcreeper



Sílvia Faustino Linhares

**Registros**Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48145); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Melo, T. N. 2013 [Wikiaves - WA 1025533]).**Habitat**


FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição GeográficaEm toda a Amazônia, das Guianas até a Bolívia (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).**Taxonomia**São reconhecidas quatro subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *X. o. palliatus* (Hoyo *et al.*, 2003).**Status**

Residente.



Robson Czaban



Registros

Arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35652); Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35649, 35650, 35651); Rio Juruá, arredores da cidade de Cruzeiro do Sul (Novaes, 1957, MPEG 26622, 26623); Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 26617, 26618, 26619, 26620, 26621); arredores da cidade de Rio Branco, Seringal Nova Empresa (Hidasi, J., CPJH 1256); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52577, 52578); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48146, 48147, 48148, 48149, 48150); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 48151, 48152); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 76413, 76414, 76415, 76416, 76417, 76418); Parque Zoológico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; AC 162, 628; MPEG 59948); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60577, 60578, 60579; Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); Ramal Nabor Júnior, Km 26 (Guilherme, E., MPEG 60580); Rio Liberdade, margem direita, próximo à Foz do Igarapé Novena (Guilherme, 2007, MPEG 60581); BR-364 a 40 Km da ponte sobre o Rio Liberdade, margem direita (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60582); Floresta Estadual do Antimary, Localidade Limoeiro (Guilherme, E., MPEG 60583); Estrada Transacriana (AC-090) Km 60, margem esquerda (Guilherme, E., MPEG 61531); Estrada Transacriana (AC-090), Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61270, 61271, 61272; Crozariol, M. A., Melo, T. N. e Leite, G., MNRJ 4951Mela); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 58866, 58867, 59802, 59803, 59804, 59805); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão e localidades, Veneza, Pará e Távora (Dantas, n. p. - 2010); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62053, 62054); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste e norte (Guilherme, E., MPEG 63525; Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63310, 63311, 63312); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64375, 64415); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63776, 63777, 63778, 63779); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010, MPEG 69998, 69999, 70001); Rio Jurupari, localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Senador Guiomard, Localidade Bonal (Guilherme, E. & Souza, G., AC 553); ARIE Japiim/Pentecoste

Registros

(Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Município de Senador Guiomard, BR 364, Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015); BR 317, margem esquerda, área adjacente à Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015); Município de Rio Branco, Estrada da Piçarreira (Marques, 2015); Município de Plácido de Castro, BR-364, Ramal do 45 (Marques, 2015); Município de Porto Acre, mata ripária adjacente à Reserva Humaitá, setor norte (Marques, 2015).

Habitat

FOA com bambus/palmeiras, FOA aluvial, FOD.

Distribuição Geográfica

Em quase toda a Amazônia, das Guianas até a Bolívia e no extremo leste do Brasil, do Ceará ao Rio de Janeiro (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas oito subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *X. g. guttatoides* (Pinto & Camargo, 1954; Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

arapaçu-beija-flor – *Campylorhynchus trochilirostris* (Lichtenstein, 1820)
Red-billed Scythebill



Robson Czaban



Registros

Igarapé Preto, afluente do Rio Juruá-mirim, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52890); Rio Tejo, a aproximadamente 5 Km da foz, REAJ (Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 52092); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52090, 52091; Whittaker *et al.*, 2002); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48154); BR-364, Seringal Sardinha (Guilherme, E., MPEG 61478); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal (Guilherme, E., MPEG 59949; Silva *et al.*, 2015); Floresta Estadual do Mogno, BR-364, a 6 Km da ponte sobre o Rio Tauari (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60597); Estrada Transacreaana (AC-090), Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61273, 61274, 61275, 61276); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 59811, 59812, 59813, 59814, 59815); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010, MPEG 66990); Município de Senador Guiomard, Localidade Bonal (Guilherme, E. & Souza, G. AC 537, 575); Parque Zoobotânico, Ufac (Guilherme, E. e equipe; anilhado); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013, AC 691); Município de Senador Guiomard, BR 364, Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015); Município de Porto Acre, mata ripária adjacente à Reserva Humaitá, setor norte (Marques, 2015).

Habitat

FOA com bambus/palmeiras, FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Do Panamá até a Argentina e em quase todo o Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas 12 subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *C. t. devius* (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

arapaçu-de-bico-branco – *Dendroplex picus* (Gmelin, 1788)
Straight-billed Woodcreeper



Hugo Viana



Registros

Arredores da cidade de Rio Branco (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35648); Parque Zoobotânico e *Campus* da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; AC 0012; MPEG 60594); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Rio Liberdade, margem direita, próximo à Foz do Igarapé Novena (Guilherme, 2007, MPEG 60595); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão (Dantas, n. p. - 2010); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 63516, 63517, 63518, 63519); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63772); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Município de Rio Branco, Estrada da Piçarreira (Marques, 2015); Município de Plácido de Castro, BR-364, Ramal do 45 (Marques, 2015); Município de Porto Acre, mata ripária adjacente à Reserva Humaitá, setor norte (Marques, 2015).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD submontana, área aberta com pastagem e/ou cultivares.

Distribuição Geográfica

Do Panamá até a Bolívia e nas regiões Norte e Nordeste do Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas 13 subespécies. A forma que ocorre no Acre é, provavelmente, a *D. p. peruvianus* (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

Nome anterior


Xiphorhynchus picus.

arapaçu-do-inambari – *Lepidocolaptes fatimalimae* Rodrigues, Aleixo, Whittaker & Naka, 2013

Inambari Woodcreeper



Edson Guilherme

**arapaçu-de-bico-comprido** – *Nasica longirostris* (Vieillot, 1818)

Long-billed Woodcreeper



Robson Czaban

**Registros**

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957; MZUSP 42699); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52094); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Jordão, localidades Veneza e Pará (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010, MPEG 70000).

Habitat

FOA com bambus/palmeiras, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Oeste da Amazônia (Rodrigues *et al.*, 2013).

Taxonomia

Táxon separado de *Lepidocolaptes albolineatus* (Rodrigues *et al.*, 2013).

Status

Residente.

Nome anterior

Lepidocolaptes albolineatus.

Registros

Rio Juruá, margem direita, cidade de Cruzeiro do Sul (Novaes, 1957; 1958, MPEG 25845); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52584); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Alto Rio Acre, Foz do Igarapé dos Patos (Guilherme, E. obs. pess.); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Jordão, Localidade Távora (Dantas, n. p. - 2010); Rio Jurupari Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010).

Habitat

FOA com palmeiras, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Em quase toda a Amazônia, da Venezuela até a Bolívia (Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2003).


Status

Residente.

arapaçu-galinha – *Dendrozetetes rufigula* (Lesson, 1844)
Cinnamon-throated Woodcreeper



Anselmo D'Alfonseca



arapaçu-barrado-do-juruá – *Dendrocolaptes juruanus* Ihering, 1905
Juruá Woodcreeper



Felipe Arantes



Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Rio Tejo, a aproximadamente 5 Km da foz, REAJ (Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 52093); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 58872, 58873); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Município de Jordão, Localidade Manaus (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62041); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Sena Madureira, BR-364, sentido Manuel Urbano (Campos, B., 2015 [Wikiaves - WA1896522]); Reserva Humaitá, entrada principal – Ufac (Melo, 2015b).

Habitat

FOA com bambus/palmeiras, FOA aluvial, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

Em quase toda a Amazônia, das Guianas até a Bolívia (Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas quatro subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *D. r. devillei* (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

Registros

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35645, 35646); Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, 1958, MPEG 20433, 20434); Município de Capixaba, Fazenda Campo Lindo (Hidasi, J., CPJH 1251); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48142); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 48143); Rio Tejo, a aproximadamente 5 Km da foz, REAJ (Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 52088); Rio Juruá, margem direita, Localidade Mato Grosso (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52089); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 76419); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Ramal Nabor Júnior, Km 26 (Guilherme, E., MPEG 60588); Floresta Estadual do Mogno, BR-364, a 6 Km da ponte sobre o Rio Tauari (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60586); Floresta Estadual do Antimary, Localidade Limoeiro (Guilherme, E., MPEG 60587); Floresta Estadual do Antimary, Ramal Uirapuru (Guilherme, E., MPEG 60585); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 58869, 58870, 58871, 59801); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64372, 64373, 64541); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64447, 64501); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão e localidades Veneza e Pará (Dantas, n. p. - 2010); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62042, 62043, 62044); Rio Jurupari localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Mâncio Lima, Comunidade Santa Bárbara (Guilherme, E., AC 605); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); Município de Senador Guimard, BR 364, Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015); Município de Rio Branco, Estrada da Piçarreira (Marques, 2015); Município de Plácido de Castro, BR-364, Ramal do 45 (Marques, 2015).

arapaçu-barrado-do-juruá – *Dendrocolaptes juruanus* Ihering, 1905

Juruá Woodcreeper

Habitat


FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, campinarana.

Distribuição GeográficaSudoeste da Amazônia, no leste do Peru, norte da Bolívia e sudoeste do Brasil (Hoyo *et al.*, 2003). No Brasil, está presente da margem esquerda do Rio Madeira para o oeste, ao sul do Rio Solimões (Pinto, 1978).**Taxonomia**Este táxon é considerado por muitos autores como subespécie de *Dendrocolaptes certhia* (Hoyo *et al.*, 2003). Foi recentemente elevado à espécie plena por Batista *et al.* (2013).**Status**


Residente.

Nome anterior*Dendrocolaptes certhia*.**Comentários**Guilherme & Borges (2011) citam a presença da forma *D. certhia polyzonus* no Acre. No entanto, uma análise de material genético dos espécimes coletados no Acre cujo morfotipo foi atribuído a *D. c. polyzonus* mostrou tratar-se de *D. juruanus* (Batista *et al.* 2013).Em Silva *et al.* (2015) esta espécie foi grafada como *Dendrocolaptes certhia*.**arapaçu-meio-barrado** – *Dendrocolaptes picumnus* Lichtenstein, 1820

Black-banded Woodcreeper



Robson Czaban

**Registros**

Rio Juruá, margem direita, cidade de Cruzeiro do Sul (Novaes, 1957; 1958, MPEG 20436); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48144); Rio Tejo, a aproximadamente 5 Km da foz, REAJ (Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 52087); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 76420); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61265); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 58868); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Floresta Estadual do Antimary, Localidade Limoeiro (Guilherme, E., MPEG 60584); Estrada Transacrea (AC-090) Km 60, margem esquerda (Guilherme, E., MPEG 61533); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64540); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Rio Jurupari Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015).

Habitat

FOA com bambus/palmeiras, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.


Distribuição GeográficaAmérica Central e norte e sudoeste da América do Sul, das Guianas até a Argentina (Hoyo *et al.*, 2003).**Taxonomia**São reconhecidas 10 subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *D. p. validus* (Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2003).**Status**

Residente.

arapaçu-vermelho – *Xiphocolaptes promeropirhynchus* (Lesson, 1840)
Strong-billed Woodcreeper



Robson Czaban



Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Jordão, Localidade Manaus (Dantas, n. p. - 2010); Rio Jurupari Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010).

Habitat

FOA com bambus/palmeiras, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

América Central e norte da América do Sul (Amazônia) (Hoyo *et al.*, 2003).


Taxonomia

São reconhecidas 25 subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *X. p. berlepschi* (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

arapaçu-de-barriga-pintada – *Hylexetastes stresemanni* Sneathlaga, 1925
Bar-bellied Woodcreeper



Anselmo D'Affonseca



Registros

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35647); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64374); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010).

Habitat

FOA com bambus/palmeiras, FOD, campinarana.

Distribuição Geográfica

Amazônia ocidental (Colômbia, Peru, Brasil e Bolívia) (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *H. s. undulatus* (Pinto & Camargo, 1954; Hoyo *et al.*, 2003).


Status

Residente.

bico-virado-fino – *Xenops tenuirostris* Pelzeln, 1859
Slender-billed Xenops



Ciro Albano



Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus.

Distribuição Geográfica

Em quase toda a Amazônia, das Guianas até a Bolívia (Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *X. t. tenuirostris* (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

bico-virado-miúdo – *Xenops minutus* (Sparrman, 1788)
Plain Xenops



Emerson Kaseker



Registros

Alto Rio Moa, margem direita, Igarapé Ramon, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52735); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52600, 52601); Rio Ouro Preto, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52899); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., 48221, 48222); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 48219, 48220); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52110, 52111); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; AC 421); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 59827, 58886, 58887); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal (Guilherme, E., MPEG 59960; Silva *et al.*, 2015); Estrada Transacrea (AC-090) Km 60, margem esquerda (Guilherme, E., MPEG 61415); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61288, 61289); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62065); Município de Mâncio Lima, Estrada do Barão, Comunidade São Domingos (Guilherme, E., MPEG 62066, 62067); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 63527, 63528, 63653); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., AC 0208, 0209, 0595; MPEG 63526); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63323, 63324); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63325); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64453); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 62065, 63783); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010, MPEG 70029); Rio Jurupari, Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010, MPEG 70031); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); Município de Senador Guiomard, BR 364, Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015).

Xenopidae **bico-virado-miúdo** – *Xenops minutus* (Sparrman, 1788)
Plain Xenops

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

América Central, Norte da América do Sul (Amazônia) e em quase todo o Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas dez subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *X. m. obsoletus* (Hoyo *et al.*, 2003).


Status

Residente.

bico-virado-carijó – *Xenops rutilans* Temminck, 1821
Streaked Xenops



Bertrando Campos



Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002, Suplemento); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Reserva Humaitá, Ufac (Kaseker, E. P. 2013 [Wikiaves - WA973883]).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Da Costa Rica até a Argentina e em quase todo o Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas 11 subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *X. r. purusianus* (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

limpa-folha-do-buriti – *Berlepschia rikeri* (Ridgway, 1886)

Point-tailed Palmcreeper



Bertrando Campos

**bico-virado-da-copa** – *Microxenops milleri* Chapman, 1914

Rufous-tailed Xenops



Anselmo D'Afonseca

**Registros**

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA aluvial com buritizais, FOD submontana, campinarana com buritizais.

Distribuição Geográfica

Em quase toda a Amazônia, da Venezuela até a Bolívia. No Brasil, esta espécie é encontrada também na região Nordeste (Piauí, Maranhão e Bahia), na Centro-Oeste (Mato-Grosso e Goiás) e Sudeste (Minas Gerais) (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Em quase toda a Amazônia, das Guianas até a Bolívia (Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.



Emerson Kaseker



João Quental



Registros

Arredores da cidade de Rio Branco (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35702); arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35701); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, 1997, MPEG 52597, 52598); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48206); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Rio Juruá, Foz do Rio Tejo (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52102; Whittaker *et al.*, 2002); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); arredores da cidade de Assis Brasil (Guilherme, 2004, AC 0072); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60607, 60608; Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); Estrada Transacrea (AC-090) Km 60, margem direita (Guilherme, E., MPEG 61416); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61277); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 58863, 59829, 59830); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Município de Jordão, Localidade Manaus (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62062, 62063); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64542); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63780); Rio Jurupari, localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Rio Branco, Estrada da Piçarreira (Marques, 2015); Município de Plácido de Castro, BR-364, Ramal do 45 (Marques, 2015).

Habitat

Margens de rios, açudes e lagos, FOA aluvial, FOD.

Distribuição Geográfica

Em toda a Amazônia, das Guianas até a Bolívia e no nordeste do Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas sete subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *F. l. tricolor* (Pinto & Camargo, 1954; Pinto, 1978; Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

Registros

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35703, 35704); Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52589); Rio Tejo, a aproximadamente 5 Km da foz, REAJ (Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 52100, 52101); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 59818); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010). Município de Xapuri (Melo, M. A., 2013 [Wikiaves - WA1007563]).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Da margem esquerda do Rio Tapajós para o oeste, até a Colômbia, o Equador, o Peru e a Bolívia (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2003).


Status

Residente.

barranqueiro-ferrugem-do-acre – *Clibanornis watkinsi* (Hellmayr, 1912)
Watkins's Foliage-gleaner




Edson Guilherme



barranqueiro-de-coroa-castanha – *Automolus rufipileatus* (Pelzeln, 1859)
Chestnut-crowned Foliage-gleaner



Edson Guilherme



Registros

Município de Manoel Urbano, BR-364, Km 8 (Novaes, 1978b, MPEG 31537, 34619); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Estrada Transacreaana (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61279); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2008; 2010; MPEG 58858, 58859).

Habitat

FOA com bambus/palmeiras, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Na América Central e no norte da América do Sul (Regiões andina e amazônica) (Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

Este táxon foi considerado, por muito tempo, como uma subespécie de *Automolus rubiginosus* (Novaes, 1978b; Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

Nome anterior

Automolus rubiginosus.

Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, 1958, MZUSP 42331); Alto Rio Moa, margem direita, Igarapé Ramon, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52736); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52112, 52113); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 76432); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60610, 60615; Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); Rio Liberdade, margem direita, próximo à Foz do Igarapé Novena (Guilherme, 2007, MPEG 60612, 60613, 60614); Floresta Estadual do Mogno, BR-364, a 6 Km da ponte sobre o Rio Tauari (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60611); Estrada Transacreaana (AC-090) Km 60, margem esquerda (Guilherme, E., MPEG 61414); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada Transacreaana (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61281, 61282, 61283, 61284); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010 MPEG 58860); Município de Jordão, localidades Távora, Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63321, 63322); Município de Assis Brasil, Estrada da Pedreira, Localidade Museu (Guilherme, E., MPEG 70912); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal e setor norte (Silva *et al.*, 2015); Município de Plácido de Castro, BR-364, Ramal do 45 (Marques, 2015).

Habitat

FOA com bambus/palmeiras, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Em quase toda a Amazônia, das Guianas até a Bolívia (Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies (Hoyo *et al.*, 2003). A forma que ocorre no Acre segundo Novaes (1957) é a *A. r. consobrinus*.

Status


Residente.

barranqueiro-escuro – *Automolus melanopezus* (Sclater, 1858)

Brown-rumped Foliage-gleaner



Edson Guilherme

**limpa-folha-riscado** – *Automolus subulatus* (Spix, 1824)

Striped Woodhaunter



Robson Czaban

**Registros**

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, F., & Moreira, M., MZUSP 42330); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 76431); Parque Nacional da Serra do Divisor, 106 Km a sudoeste de Cruzeiro do Sul (Aleixo, A. & Polleto, F, MPEG 58019); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005; Crozariol, M. A., Melo, T. N. e Leite, G., MNRJ 49514); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61280); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008; Guilherme, E., AC 248); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2008, 2010; MPEG 59824); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); BR 317, margem esquerda, área adjacente à Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015).

Habitat

FOA com bambus, FOA aluvial com bambus.

Distribuição Geográfica

Noroeste da Amazônia (Colômbia, Equador, Brasil, Peru e Bolívia) (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

Registros

Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52599); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48213); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A., MPEG 48214, 48215); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal (Guilherme, E., MPEG 59958); Floresta Estadual do Mogno, BR-364, a 6 Km da ponte sobre o Rio Tauari (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60617); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 59816, 59817); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Floresta Estadual do Antimary, Ramal Uirapuru (Guilherme, E., MPEG 60618); Rio Jurupari, Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

América Central e noroeste da América do Sul (Amazônia) (Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas seis subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *A. s. subulatus* (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

Nome anterior


Hyloctistes subulatus.

barranqueiro-camurça – *Automolus ochrolaemus* (Tschudi, 1844)

Buff-throated Foliage-gleaner



Edson Guilherme

**Registros**

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957); arredores da cidade de Manoel Urbano (Silva, G. P., MPEG 47728, 47729); Município de Porto Acre, Localidade Humaitá, AC 010, Km 27, (Oren, D. C., MPEG 44217); Igarapé Preto, afluente do Rio Juruá-mirim, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52897); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52591, 52592); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48212); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A., 48210, 48211); Rio Tejo, a aproximadamente 5 Km da foz, REAJ (Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 52108); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52109); BR-364, Seringal Sardinha (Guilherme, E., AC 0134); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004, MPEG 58373); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005, Guilherme, E., MPEG 59953); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal e setor norte (Guilherme, E., MPEG 59954, 59955, 59956, 59957; Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60604, 60605, 60606; Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); Floresta Estadual do Rio Gregório, próximo à ponte sobre o Rio Acuraua (Guilherme, 2007, MPEG 60603); Floresta Estadual do Antimary, Ramal Uirapuru (Guilherme, E., MPEG 60602, 60890); Estrada Transacrea (AC-090), Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61285, 61286); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 58854, 58855, 58856, 58857, 59820, 59821, 59822, 59823); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão e localidades Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63319); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63426, 63427); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Senador Guiomard, Localidade Bonal (Guilherme, E. & Marques, E. L. AC 320; Guilherme, E. & Souza, G. AC 546); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Município de Senador Guiomard, BR 364, Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015); BR 317, margem esquerda, área adjacente à Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015); Município de Porto Acre, mata ripária adjacente à Reserva Humaitá, setor norte (Marques, 2015).

barranqueiro-camurça – *Automolus ochrolaemus* (Tschudi, 1844)

Buff-throated Foliage-gleaner

Habitat


FOA com bambus/palmeiras, FOA aluvial, FOD.

Distribuição GeográficaNa América Central e no norte da América do Sul (Amazônia) (Hoyo *et al.*, 2003).**Taxonomia**São reconhecidas sete subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *A. o. ochrolaemus* (Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2003).**Status**

Residente.

barranqueiro-pardo – *Automolus infuscatus* (Sclater, 1856)

Olive-backed Foliage-gleaner



Edson Guilherme

barranqueiro-de-topete – *Anabazenops dorsalis* (Sclater & Salvin, 1880)

Dusky-cheeked Foliage-gleaner



Fernando Pacheco

**Registros**

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 26587, 26588); Rio das Minas, margem esquerda, Município de Porto Walter, Localidade Gustavo (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52895, 52896); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52590); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48207, 48208); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 48209); Rio Tejo, a aproximadamente 5 Km da foz, REAJ (Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 52115, 52116, 52117); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52114); Município de Mâncio Lima, Campina (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); BR-364 a 40 Km da ponte sobre o Rio Liberdade, margem direita (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60598, 60599); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60609); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63320); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64452); Rio Jurupari, Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010, MPEG 70032).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA/FOD aluvial, FOD, campinarana.

Distribuição Geográfica

Em toda a Amazônia, das Guianas até a Bolívia (Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas cinco subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *A. i. infuscatus* (Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

Registros

Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Tartaruga (Whittaker & Oren, 1999); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2008, 2010).

Habitat

FOA com bambus.

Distribuição Geográfica

Extremo noroeste da Amazônia, da Colômbia até a Bolívia. No Brasil, há registros pontuais no Acre, Rondônia e Mato Grosso (Whittaker & Oren, 1999; Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2003).

Status


Residente.

limpa-folha-de-cauda-ruiva – *Anabacethia ruficaudata* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)

Rufous-tailed Foliage-gleaner




Bertrando Campos

**limpa-folha-de-sobre-ruivo** – *Philydor erythrocerum* (Pelzelin, 1859)

Rufous-rumped Foliage-gleaner



Celso B. Almeida

**Registros**

Rio Juruá, margem direita, Localidade Pedra Preta (Novaes, 1957, MPEG 26589); Rio Juruá, Localidade Nossa Senhora Aparecida (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52893); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 59819); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63316); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal (Silva *et al.*, 2015).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Em quase toda a Amazônia, das Guianas até a Bolívia (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *A. r. ruficaudatum* (Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

Nome anterior

Philydor ruficaudatum.

Registros

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35706); Rio Abunã, margem esquerda (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35707); Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 26572, 26573); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52593, 52594); Rio Juruá, margem direita, Localidade Mato Grosso (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52105, 52106); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Floresta Estadual do Antimary, Localidade Limoeiro (Guilherme, E., MPEG 60888); Município de Mâncio Lima, Estrada do Barão, Comunidade São Domingos (Guilherme, E., MPEG 62068); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64544, 64378); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64520, 64451); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOD, campinarana.

Distribuição Geográfica

Em quase toda a Amazônia, das Guianas até a Bolívia (Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas cinco subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *P. e. hyra* (Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2003).

Status


Residente.

limpa-folha-de-asa-castanha – *Philydor erythropterus* (Sclater, 1856)

Chestnut-winged Foliage-gleaner



Robson Czaban

**limpa-folha-de-testa-baia** – *Philydor rufum* (Vieillot, 1818)

Buff-fronted Foliage-gleaner



Robson Czaban

**Registros**

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35705); Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 26579, 26580, 26581); Município de Capixaba, Fazenda Campo Lindo (Hidasi, J., CPJH 1299); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52595, 52596); Rio das Minas, margem esquerda, Município de Porto Walter, Localidade Gustavo (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52894); Rio Tejo, a aproximadamente 5 Km da foz, REAJ (Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 52107); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Floresta Estadual do Mogno, BR-364, a 6 Km da ponte sobre o Rio Tauari (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60616); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão e localidades Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62064); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD.

Distribuição Geográfica

Ao longo da calha do Rio Solimões/ Amazonas, da região próximo a Belém para o oeste, até a Venezuela, a Colômbia, o Equador, o Peru e a Bolívia (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *P. e. erythropterus* (Pinto & Camargo, 1954; Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2008, 2010 MPEG 58861).

Habitat

FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Do Panamá até a Argentina. No Brasil, é mais comumente encontrada na região centro-sul (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas sete subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *P. r. bolivianum* (Aleixo & Guilherme, 2008; Hoyo *et al.*, 2003).

Status


Residente.

limpa-folha-vermelho – *Philydor pyrhrhodes* (Cabanis, 1848)


Cinnamon-rumped Foliage-gleaner



Edson Guilherme

**limpa-folha-de-bico-virado** – *Syndactyla ucayalae* (Chapman, 1928)

Peruvian Recurvebill



Edson Guilherme

**Registros**

Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48216); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A., MPEG 48217, 48218, 49625); Alto Rio Moa, margem direita, Igarapé Ramon, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52737); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 76430); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63317, 63318); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64379); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63781, 63782); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010, MPEG 70030); Rio Jurupari, Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, E., obs. pess.); Parque Zoobotânico, Ufac (Guilherme, E. e equipe; anilhado); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Em toda a Amazônia, das Guianas até a Bolívia (Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

Registros

Arredores da cidade de Plácido de Castro (Forrester, 1993, observada); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Rio Juruá, Foz do Rio Tejo (Whittaker & Oren, 1999, MPEG 52095, 52096); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Whittaker & Oren, 1999, MPEG 52097, 52098, 52099); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Tartaruga (Whittaker & Oren, 1999; Whittaker *et al.*, 2002); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 76426); Estrada Transacrea (AC-090), Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61287); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 58862); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); municípios de Assis Brasil, Xapuri e Brasiléia (DeLuca, 2012); Floresta Estadual do Antimary (DeLuca, 2012); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015).

Habitat

FOA com bambus, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Amazônia sul-ocidental (Peru, Brasil e Bolívia). No Brasil, além do estado do Acre, esta espécie é encontrada pontualmente no norte de Mato Grosso e no interflúvio Tapajós/Xingu no Pará (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003). Espécie associada às florestas com bambus no sudoeste amazônico (Stotz *et al.*, 1996).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

Nome anterior


Simoxenops ucayalae.



Robson Czaban



Edson Guilherme

**Registros**

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Município de Cruzeiro do Sul (Gomes, G. C., 2013 [Wikiaves - WA959040]).

Habitat

FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Ocorre na Amazônia brasileira, da Foz do Rio Negro para o oeste até a Colômbia, o Equador e o Peru (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *S. a. albigularis* (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

Registros

Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal (Guilherme, E., MPEG 59950); Rio Branco, Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Guilherme, E., MPEG 59951, 59952); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60741; Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64543); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Senador Guimard, Localidade Bonal (Guilherme, E. & Marques, E. L., AC 321); Município de Cruzeiro do Sul, BR 307, Ramal dos Caroba (Guilherme, E. AC 396); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Município de Senador Guimard, BR 364, Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015); BR 317, margem esquerda, área adjacente à Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015); Município de Rio Branco, Estrada da Piçarreira (Marques, 2015).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOD.

Distribuição Geográfica

Em toda a Amazônia, das Guínas até a Bolívia (Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas sete subespécies. A forma que ocorre no Acre parece ser a *S. r. caquetensis* (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

puruchém – *Synallaxis cherriei* Gyldenstolpe, 1930
Chestnut-throated Spinetail



Hector Bottai



Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Estrada Transacreaana (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61278); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2008, 2010); Município de Assis Brasil e Brasília (DeLuca, 2012).

Habitat

FOA com bambus.

Distribuição Geográfica

Ocorre pontualmente na Amazônia. No Brasil, foi registrada no sudoeste do Pará, norte de Mato Grosso e nos estados de Rondônia e Acre. Ocorre, também, no Peru, Equador e Colômbia (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é, provavelmente, a *S. c. saturata* (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

joão-teneném-becuá – *Synallaxis gujanensis* (Gmelin, 1789)
Plain-crowned Spinetail



Robson Czaban



Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Rio Juruá, Foz do Rio Tejo (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52103; Whittaker *et al.*, 2002); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 76427, 76428, 76429); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011); Município de Xapuri (Godoy, F. I., 2013 ([Wikiaves - WA1004055]); arredores da cidade de Rio Branco, Ramal do Perigoso (Guilherme, E., 2015 [Wikiaves - WA1681040]).

Habitat

FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Em quase toda a Amazônia, das Guianas até a Bolívia (Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas seis subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *S. g. huallagae* (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

joão-folheiro – *Metopothrix aurantiaca* Sclater & Salvin, 1866
Orange-fronted Plushcrown



Robson Czaban



Registros

Alto Rio Moa, margem direita, Município de Mâncio Lima (Whitney *et al.*, 1997, MPEG 52813); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 58884, 58885); Município de Rio Branco, Estrada Transacrea, Km 80 (Czaban, R. E., 2015 [Wikiaves - WA1609932]).

Habitat

FOA aluvial, FOA com palmeiras/bambus.

Distribuição Geográfica

Amazônia ocidental, da Colômbia até a Bolívia (Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

arredio-do-rio – *Craniolenca vulpina* (Pelzeln, 1856)
Rusty-backed Spinetail



Robson Czaban



Registros

Município de Mâncio Lima, Foz do Igarapé Japiim, ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013; Melo, T. N., 2013 [Wikiaves - WA1172696]).

Habitat

FOA aluvial, ilhas fluviais.

Distribuição Geográfica

Região central e norte da América do Sul. Venezuela, Colômbia, Guiana inglesa e nordeste da Bolívia. Ocorre em quase todo o Brasil, desde o Paraná, ao sul do Ceará, no Nordeste (Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

São reconhecidas cinco subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *C. v. vulpina* (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.


Comentários

O registro de *C. vulpina* na ARIE Japiim/Pentecoste foi o primeiro em território acreano.

joão-pintado – *Craniolenca gutturata* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)
Speckled Spinetail



Anselmo D'Alfonseca



Registros

Arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35718); Alto Rio Moa, margem esquerda, Serra da Jaquirana (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52738); Rio Juruá, Foz do Rio Tejo (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52104; Whittaker *et al.*, 2002); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Município de Jordão, localidades Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63315); Rio Branco, Parque Zoológico da Universidade Federal do Acre (Guilherme, E. 2015 [Wikiaves - WA1740193]).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Em quase toda a Amazônia, da Guiana Francesa até a Bolívia (Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.

joão-liso – *Thriopphaga fusciceps* Sclater, 1889
Plain Softtail



Adriano Oliveira Maciel



Registros

Município de Rio Branco, Estrada Transacreana, área de Proteção Ambiental Igarapé São Francisco (Silva, G. C. 2015 [Wikiaves - WA1745200]).

Habitat

FOA com bambus/palmeiras, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Espécie rara e de ocorrência pontual na Amazônia. Ocorre no Equador, Peru, Bolívia e Brasil (Hoyo *et al.*, 2003).

Taxonomia


São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *T. f. dimorpha* (Hoyo *et al.*, 2003).

Status

Residente.



Robson Czaban



Emerson Kaseker



Registros
Arredores da cidade de Sena Madureira (Silva, G. P., MPEG 32456, 47883); Rio Juruá, margem direita, Localidade Caipora (Whittaker & Oren, 1999); Parque Nacional da Serra do Divisor, Alto Rio Moa, margem direita, Mâncio Lima (Whitney <i>et al.</i> , n. p. - 1997, MPEG 52804, 52805); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80205, 80206, 80207, 80208); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 58927, 58928, 58929); Estrada Transacreaana (AC-090) Km 60, margem esquerda (Guilherme, E., MPEG 61452, 61453, 61454, 61455); Estrada Transacreaana (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61358); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre <i>et al.</i> , 2010); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 63576, 63577, 63578, 63579, 63580); Município de Jordão, Localidade Távora (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011; MPEG 63383); Município de Porto Acre, mata ripária adjacente à Reserva Humaitá, setor norte (Marques, 2015).
Habitat
FOA com bambus/palmeiras, FOA aluvial, FOD submontana.
Distribuição Geográfica
Sudoeste da Amazônia (Peru, Bolívia e Brasil) (Sick, 1997; Hoyo <i>et al.</i> , 2004).
Taxonomia
Espécie monotípica (Hoyo <i>et al.</i> , 2004).
Status
Residente.

Registros
Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney <i>et al.</i> , n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre <i>et al.</i> , 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e Localidade Humaitá (Aleixo <i>et al.</i> , n. p. - 2010); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011; MPEG 64530); Município de Xapuri (Melo, M. A., 2013 [Wikiavces - WA1021931]); Município de Senador Guimard, Ramal Nabor Junior (Guilherme, E., 2014 [Wikiaves - WA1560264]).
Habitat
FOA com bambus/palmeiras, FOA aluvial, FOD submontana, campinarana.
Distribuição Geográfica
Em quase toda a Amazônia, da Venezuela até a Bolívia (Hoyo <i>et al.</i> , 2004).
Taxonomia
Espécie monotípica (Hoyo <i>et al.</i> , 2004).
Status
Residente.




Macho



Anselmo D'Alfonseca



Macho



Anselmo D'Alfonseca

Registros

Rio Juruá, arredores da cidade de Cruzeiro do Sul (Novaes, 1957, MPEG 27093, 27094, 27095, 27096); Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 27097); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48379, 48380, 48381, 48382); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013, AC 680, 681, 686).

Habitat

FOA/FOD aluvial.

Distribuição Geográfica

Noroeste da América do Sul, da Venezuela ao Peru (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *P. f. filicauda* (Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

Comentários

Em Novaes (1957), esta espécie foi nominada como *Teleonema f. filicauda*.

Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 25809, 25810); arredores da cidade de Manoel Urbano (Silva, G. P., MPEG 40615, 40616, 31540); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52659, 52660, 52661); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48322, 48323); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 48312, 48313, 48314, 48315, 48316, 48317, 48318, 48319, 48320, 48321); Parque Zoológico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; AC 0002, 0003, 0013, 0419, 0632, 0634, 0636, 0638, 759, 773); Rio Tejo, margem esquerda, a aproximadamente 5 Km da foz (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52223, 52224, 52225; Whittaker *et al.*, 2002); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52222); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80209, 80210, 80211, 80212, 80213, 80214, 80215, 80216, 80217); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005, Guilherme, E., MPEG 60050; AC 654); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 58935, 58936, 58937, 59881, 59882, 59883); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal e setor norte (Guilherme, E., MPEG 60040, 60041, 60042, 60043, 60044, 60045, 60046, 60047, 60048, 60049; Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60814, 60815, 60816; Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); Ramal Nabor Júnior, Km 26 (Guilherme, E., MPEG 60820); Floresta Estadual do Antimary, Localidade Limoeiro (Guilherme, E., MPEG 60818, 60819); Floresta Estadual do Antimary, Ramal Uirapuru (Guilherme, E., MPEG 60812, 60813); Estrada Transacrea (AC-090) Km 60, margem esquerda e direita (Guilherme, E., MPEG 61456, 61457, 61457); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61359, 61360); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 63583, 63584); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., obs. pess.); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63378, 63379, 63380, 63381); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64397, 64398); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64472, 64497, 64510); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63814, 63815, 63816, 63817, 63818, 63819); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010);

Registros

Rio Jurupari, Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010.) Município de Senador Guiomard, Localidade Bonal (Guilherme, E. & Marques, E. L., AC 316, 319); Município de Rio Branco, Estrada da Piçarreira (Marques, E. & Lemos, T., AC 668); Parque Estadual Chandless (Bueno, A. S., AC 736); Município de Senador Guiomard, BR 364, Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015); BR 317, margem esquerda, área adjacente à Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015); Município de Rio Branco, Estrada da Piçarreira (Marques, 2015); Município de Porto Acre, mata ripária adjacente à Reserva Humaitá, setor norte (Marques, 2015).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD.

Distribuição Geográfica

A partir da margem sul do Rio Solimões/Amazonas, do Pará ao norte da Argentina (Misiones). Ocorre pontualmente no nordeste brasileiro (Ceará e Alagoas) (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas cinco subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *P. f. purusiana* (Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2004).

Status


Residente.

Comentários

Este é o piprídeo mais comumente capturado em redes de neblina no Acre, com exceção do extremo noroeste do Estado.



Robson Czaban



Macho

Registros

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35742); Município de Senador Guiomard, Fazenda Campo Limpo (Hidasi, J., LSUMZ 65063); arredores da cidade de Manoel Urbano (Silva, G. P., MPEG 40614); Igarapé Preto, afluente do Rio Juruá-mirim, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52936); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48324, 48325, 48326, 48328); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A., MPEG 48329); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005, Guilherme, E., MPEG 61546); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal (Guilherme, E., MPEG 60051; Silva *et al.*, 2015); Ramal Nabor Júnior, Km 26 (Guilherme, E., MPEG 60821); BR-364 a 40 Km da ponte sobre o Rio Liberdade, margem direita (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60822); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62160); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64556); Município de Cruzeiro do Sul, BR 307, Ramal dos Caroba (Guilherme, E. AC 344, 410); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Cruzeiro do Sul, Estrada Canela Fina (Guilherme, E. AC 439); Município de Assis Brasil, Estrada da Pedreira, Localidade Museu (Guilherme, E., MPEG 70929); ARIE Japiim/Pentecoste campinarana (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com bambus/palmeiras, FOD, campinarana.

Distribuição Geográfica

Margem sul do Rio Solimões/Amazonas, do Pará em direção ao oeste, até o Peru e a Bolívia. Ocorre, também, no extremo leste do Brasil (de Pernambuco ao Rio de Janeiro) (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

Nome anterior


Pipra rubrocapilla

Comentários

Em Pinto & Camargo (1954), esta espécie foi nominada como *Pipra erythrocephala rubrocapilla*.



Macho



Anselmo D'Affonseca



Macho

Registros

Rio Juruá, Localidade Tapuara (Whittaker & Oren, 1999); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48327); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2008, 2010; MPEG 58949, 59884); Município de Jordão, Localidade Manaus (Dantas, n. p. - 2010).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Amazônia sul-ocidental, no leste do Peru, norte da Bolívia e no extremo sudoeste da Amazônia brasileira (Acre) (Hoyo *et al.*, 2004). Espécie pertencente ao centro de endemismo Inambari (Haffer, 1978; Crraft, 1985).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

Nome anterior

Pipra chloromeros.

Registros

L. c. coronata – Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 25811, 25812, 25813, 25814); arredores da cidade de Manoel Urbano (Silva, G. P., MPEG 31541, 31542, 47874, 47875); Rio Ouro Preto, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52935); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52662, 52663, 52664, 52665); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48345, 48346, 48347, 48348, 48349, 48350, 48351, 48352, 48353, 48354, 49721, 49722, 49723, 49724, 49725); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A., MPEG 48355, 48356); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52220, 52221; Whittaker *et al.*, 2002); Parque Nacional da Serra do Divisor, 106 Km a sudoeste de Cruzeiro do Sul (Aleixo, A. & Polletto, F, MPEG 58028); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); BR-364 a 40 Km da ponte sobre o Rio Liberdade, margem direita (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60805, 60806); Floresta Estadual do Rio Gregório, próximo à ponte sobre o Rio Acuraua (Guilherme, 2007, MPEG 60807); Município de Mâncio Lima, Estrada do Barão, Comunidade São Domingos (Guilherme, E., MPEG 62153, 62154, 62155, 62156); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63811, 63812, 63813); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, localidades Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Município de Cruzeiro do Sul, BR 307, Ramal dos Caroba (Guilherme, E. AC 364, 391); Município de Mâncio Lima, Comunidade Santa Bárbara (Lemos, T. & Marques, E., AC 602); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

L. c. exquisita – Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35743); arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35744); arredores da cidade de Rio Branco, Seringal Nova Empresa (Hidasi & Bankovics, 1997; CPJH 1433); Município de Capixaba, Fazenda Campo Lindo (Hidasi & Bankovics, 1997, CPJH 4712); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Ramal Nabor Júnior, Km 26 (Guilherme, E., MPEG 60803, 60804); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste e norte (Guilherme, E., MPEG 63656, 63590; Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Silva *et al.*, 2015). Município de Senador Guimard, BR 364, Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015); BR 317, margem esquerda, área adjacente à Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

Sul da América Central (Costa Rica e Panamá) e noroeste da Amazônia, da Venezuela até a Bolívia (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas oito subespécies (Hoyo *et al.*, 2004). Ao menos duas formas ocorrem no Acre. *L. c. coronata*, registrada no oeste do Estado (Bacia do Juruá) e *L. c. exquisita*, registrada no leste (Bacia do Rio Purus) (Guilherme, 2009; 2012).

Status

Residente.

Comentários

Piacentini *et al.*, (2015) questiona a presença de *L. c. exquisita* no leste do Acre, argumentando que o local de origem dos espécimes faz parte da região onde está a localidade tipo de *L. c. caelestipileata*. No entanto, em recente comparação dos espécimes coletados no leste do Acre com o espécime MPEG 54187, proveniente de Tarapoto, no Peru, e com o espécime MPEG 54188, proveniente de Pando, na Bolívia, ambos atribuídos à forma *L. c. exquisita*, verificamos que os espécimes machos do leste do Acre (forma predominantemente verde – Guilherme, 2009) são morfológicamente idênticos aos do Peru (Tarapoto) e da Bolívia (Pando) e significativamente diferentes dos espécimes atribuídos à forma *L. c. caelestipileata*, provenientes de diversas localidades da margem esquerda do Madeira (*e.g.* MPEG 62359). Diante do exposto, reafirmo a presença de *L. c. exquisita* no leste do Acre (Guilherme 2009, 2012). Os registros deste táxon no Estado (Guilherme 2009, 2012) são inéditos em território brasileiro (Piacentini *et al.*, 2015).



Anselmo D'Affonseca



Macho

Registros

Rio Ouro Preto, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52933); Alto Rio Moa, margem direita, Igarapé Ramon, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52801, 52802, 52803); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A. 48376); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 48375); Floresta Estadual do Mogno, BR-364, a 6 Km da ponte sobre o Rio Tauari (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60802); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62147); Município de Mâncio Lima, Estrada do Barão, Comunidade São Domingos (Guilherme, E., MPEG 62148, 62149, 62150, 62151, 62152); Cruzeiro do Sul, Estrada Canela Fina (Guilherme, E. AC 339, 342); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

Das Guianas até a Argentina. Ocorre em quase todas as regiões do Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas 15 subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *M. m. expectatus* (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.



Macho



Fêmea




Registros
Campinaranas dos municípios de Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul (Guilherme, 2012).
Habitat
Campinarana.
Distribuição Geográfica
Margem sul do Rio Solimões/Amazonas, do nordeste do Peru e Bolívia para o leste, até os estados de Mato Grosso e Pará no Brasil (Hoyo <i>et al.</i> , 2004).
Taxonomia
Espécie monotípica (Hoyo <i>et al.</i> , 2004).
Status
Residente.
Comentários
O único registro desta espécie no Acre foi feito em um enclave de Campina no Município de Mâncio Lima. É possível que esta espécie seja encontrada nas FOAs aluviais formadas pelas Florestas Ombrófilas densas submontanas e em outras manchas de campinas e campinaranas no oeste do Estado.

Registros
Arredores da cidade de Manoel Urbano (Silva, G. P., MPEG 47881, 47882; Guilherme, 2013b); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney <i>et al.</i> , n. p. - 1997, Whittaker & Oren, 1999, MPEG 52667); Rio Ouro Preto, margem esquerda, PNSD (Whitney <i>et al.</i> , n. p. - 1997, MPEG 52934); Parque Nacional da Serra do Divisor, Alto Rio Moa, margem direita, Mâncio Lima (Whitney <i>et al.</i> , n. p. - 1997, MPEG 52798); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., 48365, 48366, 48367); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 48368, 48369, 48370, 48371, 48373, 48374); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52226; Whittaker <i>et al.</i> , 2002); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62135, 62136, 62137, 62138, 62139); Rio Jurupari, Localidade Novo Oriente (Guilherme, 2013b; MPEG 70043).
Habitat
FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD submontana, campinarana.
Distribuição Geográfica
Noroeste da Amazônia, da Guiana Inglesa e Venezuela ao Peru (Sick, 1997; Hoyo <i>et al.</i> , 2004).
Taxonomia
São reconhecidas cinco subespécies. A forma que ocorre no Acre é a <i>M. s. striolatus</i> (Hoyo <i>et al.</i> , 2004).
Status
Residente.
Comentários
Em Whittaker & Oren (1999) e Whittaker <i>et al.</i> (2002), esta espécie foi nominada como <i>Machaeropterus regulus</i> .



Macho



Anselmo D'Afonseca



Fêmea



Edson Guilherme

Registros

Arredores da cidade de Manoel Urbano (Silva, G. P., MPEG 31543, 31544, 32993, 35336, 47879, 47880); Alto Rio Moa, margem direita, Igarapé Ramon, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52799); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, Whittaker & Oren, 1999, MPEG 52666); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80218); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; AC 0010, 0014, 0376, 0720); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., 48364); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 48357, 48358, 48359, 48360, 48361, 48362, 48363); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52227; Whittaker *et al.*, 2002); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80218); Parque Nacional da Serra do Divisor, 106 Km a sudoeste de Cruzeiro do Sul (Aleixo, A. & Poletto, F, MPEG 58027); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60809; Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); Floresta Estadual do Rio Gregório, próximo à ponte sobre o Rio Acuraua (Guilherme, 2007, MPEG 60808); Floresta Estadual do Antimary, Ramal Uirapuru (Guilherme, E., MPEG 60810, 60811); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62140); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 63585, 63586, 63587, 63588); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste e norte (Guilherme, E., MPEG 63589, 63655; Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Assis Brasil, Estrada da Pedreira, Localidade Museu (Guilherme, E., MPEG 70930, 70931, 70932, 70936); Município de Rio Branco, Estrada da Piçarreira (Marques, 2015); Município de Porto Acre, mata ripária adjacente à Reserva Humaitá, setor norte (Marques, 2015).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Ao sul do Rio Solimões/Amazonas (Brasil, Peru e Bolívia). Ocorre, também, pontualmente, em algumas localidades de Roraima e Venezuela (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas duas supespécies. A forma que ocorre no Acre é a *M. p. pyrocephalus* (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 27065, 27066, 27067, 27068, 27069, 27070, 27071, 27072); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52657, 52658); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 49728, 48336, 48337, 48338, 48339, 48340, 48341, 48342, 48343, 48344, 49726, 49727); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 48330, 48331, 48332, 48333, 48334, 48335); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52218, 52219; Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); BR-364 a 40 Km da ponte sobre o Rio Liberdade, margem direita (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60797, 60798, 60798); Floresta Estadual do Mogno, BR-364, a 6 Km da ponte sobre o Rio Tauari (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60801); Floresta Estadual do Rio Gregório, próximo à ponte sobre o Rio Acuraua (Guilherme, 2007, MPEG 60800); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62158, 62159); Município de Mâncio Lima, Estrada do Barão, Comunidade São Domingos (Guilherme, E., MPEG 62157); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63808, 63809, 63810); Rio Jurupari, localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010; MPEG 70041, 70044); Município de Jordão, Localidade Pará (Dantas, n. p. - 2010; MPEG 71391); Município de Mâncio Lima, Comunidade Santa Bárbara (Lemos, T. & Marques, E., AC 601); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, campinarana.

Distribuição Geográfica

No sul da América Central (Costa Rica e Panamá), norte da América do Sul (das Guianas ao leste do Peru) e no extremo leste do Brasil (da Bahia ao Rio de Janeiro) (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas 13 subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *D. p. microlopha* (Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

Comentários

Em Hidasi & Bankovics (1997), foi divulgada a presença desta espécie na Fazenda Campo Lindo (leste do Acre). Contudo, uma análise do espécime CPJH 4.712, identificado como *Pipra pipra*, mostrou tratar-se de uma fêmea de *Lepidothrix coronata* (ver Comentários em *L. coronata*).



Fêmea

Registros
Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2008, 2011; MPEG 62141, 62142, 62143, 62144, 62145, 62146); Município de Cruzeiro do Sul, BR 307, Ramal dos Caroba (Guilherme, E. AC 337, 338, 352, 358, 390, 399); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme <i>et al.</i> , n. p. - 2013).
Habitat
Campinarana.
Distribuição Geográfica
Nordeste da Amazônia, do leste da Colômbia ao Pará. Ocorre pontualmente no extremo-oeste da Amazônia (Peru, Brasil e Bolívia) (Hoyo <i>et al.</i> , 2004).
Taxonomia
Espécie monotípica (Hoyo <i>et al.</i> , 2004).
Status
Residente.
Comentários
No oeste amazônico, esta espécie é restrita ao tipo de vegetação que cresce sob solos arenosos, conhecida localmente como campina e campinarana (Stotz <i>et al.</i> , 1996, Poletto & Aleixo, 2005). No Acre, <i>Xenopipo atronitens</i> só foi registrada nas manchas de campinas e campinaranas do oeste do Estado (Guilherme & Borges, 2011; Guilherme, 2012).




Macho

Registros
Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney <i>et al.</i> , n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre <i>et al.</i> , 2010).
Habitat
FOA com palmeiras, FOD submontana, campinarana.
Distribuição Geográfica
No norte da América do Sul (em quase toda a Amazônia) e no sudeste do Brasil (do Rio Grande do Norte ao Espírito Santo) (Hoyo <i>et al.</i> , 2004).
Taxonomia
São reconhecidas quatro subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a <i>C. p. regina</i> (Hoyo <i>et al.</i> , 2004; Schulenberg <i>et al.</i> , 2007).
Status
Residente.




Macho

Edson Guilherme



Tomaz Melo



Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A., MPEG 48423, 48425); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); BR-364, Seringal Sardinha (Guilherme, E., AC 0138, 0139); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal (Guilherme, E., MPEG 60037, 60038); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60762, 60763; Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61334); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 58920, 58921); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63393); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Jurupari, Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010, MPEG 70034); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Silva *et al.*, 2015); Município de Senador Guiomard, BR 364, Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015); BR 317, margem esquerda, área adjacente à Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015).

Habitat

FOA com bambus/palmeiras, FOD, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

América Central, norte da América do Sul (Amazônia) e na Região Sudeste do Brasil (da Bahia ao Paraná) (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas seis subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *O. c. castelnaui* (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 25579, 25580); Alto Rio Moa, margem direita, Igarapé Ramon, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52794); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52649, 52650); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48409, 48410, 48411, 48412, 48413); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 48406, 48407, 48408); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52203, Whittaker *et al.*, 2002); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80223, 80224); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal e setor norte (Guilherme, E., MPEG 60039; Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); Floresta Estadual do Antimary, Ramal Uirapuru (Guilherme, E., MPEG 60772); Município de Mâncio Lima, Estrada do Barão, Comunidade São Domingos (Guilherme, E., MPEG 62129, 62130); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão e localidades Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Rio Chandless, margem esquerda, a aproximadamente 3 Km da foz (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63398, 63399); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63573; Lemos, T. & Marques, E., AC 583); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64391); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64470); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63789); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013, AC 685); Município de Senador Guiomard, BR 364, Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Do México até a Bolívia (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas oito subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *T. e. brunneifrons* (Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

assanhadinho – *Myiobius barbatu*s (Gmelin, 1789)
Whiskered Flycatcher



Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 25581); Alto Rio Moa, Igarapé Amil, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52796); Rio Ouro Preto, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52931); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Município de Jordão, Localidade Távora (Dantas, n. p. - 2010, MPEG 71385); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013, AC 714).

Habitat

FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

Norte da América do Sul (Amazônia) e no leste do Brasil (Mata Atlântica) (Hoyo *et al.*, 2004).


Taxonomia

São reconhecidas cinco subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *M. b. amazonicus* (Novaes, 1957, Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

assanhadinho-de-cauda-preta – *Myiobius atricaudus* Lawrence, 1863
Black-tailed Flycatcher



Registros

Alto Rio Moa, margem direita, Igarapé Ramon, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52795); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Reserva Humaitá - UFAC, entrada principal (Melo, T. N. 2014. [WA1460982]).

Habitat

FOA aluvial, FOD submontana, FOA com palmeiras/bambus.

Distribuição Geográfica

Da Costa Rica ao Peru. Ocorre em quase todas as regiões do Brasil (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas sete subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *M. a. adjacens* (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.



Tomaz Melo



Robson Czaban



Registros

Rio Juruá, arredores da cidade de Cruzeiro do Sul (Novaes, 1957, MPEG 27160); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48384); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A., MPEG 48385); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Rio Liberdade, margem direita, próximo à Foz do Igarapé Novena (Guilherme, 2007, MPEG 60795, 60796); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63805, 63806); Rio Jurupari, Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Noroeste da Amazônia, da margem esquerda do Rio Tapajós para o oeste, até a Calômbia, Equador, Peru e Bolívia (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *S. m. major* (Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

Registros

Rio das Minas, margem esquerda, Município de Porto Walter, Localidade Gustavo (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52937); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48377); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62163, 62164); Município de Mâncio Lima, Estrada do Barão, Comunidade São Domingos (Guilherme, E., MPEG 62165); Município de Cruzeiro do Sul, BR 307, Ramal dos Caroba (Guilherme, E. AC 367); Cruzeiro do Sul, Estrada Canela Fina (Guilherme, E. AC 370); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com palmeiras, campinarana.

Distribuição Geográfica

América Central, norte da América do Sul, das Guianas até a Bolívia e no extremo leste do Brasil, da Paraíba ao Espírito Santo (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

Táxon tratado anteriormente como subespécies de *Schiffornis turdina* (Hoyo *et al.*, 2004).

Status


Residente.

Nome anterior

Schiffornis turdina



Robson Czaban



Sílvia Faustino Linhares



Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 27186); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48388); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005, Guilherme, E., MPEG 60027); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60780); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Ramal Nabor Júnior, Km 26 (Guilherme, E., MPEG 60775, 60776); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62161); Rio Jurupari, Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, localidades Pará, Távora e Veneza (Dantas, n. p. - 2010).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, campinarana.

Distribuição Geográfica

No norte da América do Sul (Amazônia) e no sudeste do Brasil (Mata Atlântica), da Bahia ao Espírito Santo (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

Registros

Rio Juruá, Igarapé São Luiz, Localidade Valparaíso (Whittaker & Oren, 1999); Juruá, Cachoeira do Rio Bajé (Whittaker & Oren, 1999); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62134); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64516); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Assis Brasil, Estrada da Pedreira, Localidade Museu (Guilherme, E., 2010 [Wikiaves - WA784660]); Fazenda Experimental Catuaba (Kaseker, E. P. [Wikiaves - WA963093]); Município de Xapuri (Nemetz, U., 2013 [Wikiaves - WA929758]).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras, FOD, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

Em quase toda a Amazônia, da Venezuela até a Bolívia (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é *I. i. isabellae* (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

anambé-branco-de-bochecha-parda – *Tityra inquisitor* (Lichtenstein, 1823)

Black-crowned Tityra



Macho

**anambé-branco-de-rabo-preto** – *Tityra cayana* (Linnaeus, 1766)

Black-tailed Tityra



Fêmea

Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); BR-364 a 40 Km da ponte sobre o Rio Liberdade, margem direita (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60883); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Fazenda Experimental Catuaba (Kaseker, E. P. 2013 [Wikiaves - WA968211]).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Do México ao norte da Argentina (Misiones). Ocorre em quase todo o Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas seis subespécies. A forma que ocorre no Acre parece ser a *T. i. albitorques* (Zimmer, 1936; Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

Registros

Arredores da cidade de Rio Branco, Seringal Nova Empresa (Hidasi, J., FMNH: 344679); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., obs. pess.); Parque Zoológico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, E., obs. pess.); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD.

Distribuição Geográfica

Das Guianas ao norte da Argentina. Ocorre em quase todo o Brasil (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *T. c. cayana* (Hoyo *et al.*, 2004).

Status


Residente.



Macho



Robson Czaban



Macho



Marcos Melo

Registros

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35737, 35738, 35739); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E. MPEG 64396); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64498); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Município de Jordão, localidades Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD.

Distribuição Geográfica

Do México ao Paraguai. No Brasil, esta espécie ocorre a partir da margem sul do Rio Amazonas até os estados do Tocantins e Piauí (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas nove subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *T. s. semifasciata* (Pinto & Camargo, 1954; Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

Registros

Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2008, 2010; Aleixo *et al.*, 2008, MPEG 58925); Estrada Transacrea (AC-090) Km 60, margem esquerda (Aleixo *et al.*, 2008, MPEG 61447); Município de Xapuri (Melo, M. A., 2013 [Wikiaves - WA1004071]).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus.

Distribuição Geográfica

Extremo-oeste da Amazônia, do leste do Equador à região central e sudeste do Peru (Hoyo *et al.*, 2004). No Brasil, só há registro desta espécie no leste do estado do Acre (Aleixo *et al.*, 2008).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies (Hoyo *et al.*, 2004). A forma que ocorre no Acre é a *P. x. peruanus* (Aleixo *et al.*, 2008).

Status

Residente.



Macho

Emerson Kaseker



Robson Czaban




Registros
Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen <i>et al.</i> , 2005).
Habitat
FOA com palmeiras/bambus.
Distribuição Geográfica
Do Panamá ao Peru. No Brasil, ocorre nos estados do Maranhão e Pará em direção ao oeste, em ambas as margens do Rio Amazonas (Sick, 1997; Hoyo <i>et al.</i> , 2004).
Taxonomia
São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a <i>P. r. juruanus</i> (Hoyo <i>et al.</i> , 2004).
Status
Residente (provável).

Registros
Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008).
Habitat
FOA com palmeiras/bambus.
Distribuição Geográfica
Distribuição disjunta, da Venezuela ao norte da Argentina (Misiones) (Hoyo <i>et al.</i> , 2004).
Taxonomia
São reconhecidas cinco subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a <i>P. c. saturatus</i> (Hoyo <i>et al.</i> , 2004).
Status
Residente.




Macho



Robson Czaban



Macho



Robson Czaban

Registros

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35735); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52655); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80236); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 58926); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60783, 60784, 60785, 60786); Estrada Transacrea (AC-090) Km 60, margem esquerda (Guilherme, E., MPEG 61448); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61355); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62162); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme, E., & Dantas, S. M. obs. pess.); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64496, 64528); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63804); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Jurupari, Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão (Dantas, n. p. - 2010); Município de Rio Branco, *Campus* da Ufac (Guilherme, E., AC 273); Município de Senador Guionard, Localidade Bonal (Guilherme, E. & Souza, G., AC 573); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, FOD.

Distribuição Geográfica

Da Guatemala até a Argentina e em todo o Brasil (Sick, 1997, Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas oito subespécies. A forma que ocorre no Acre parece ser a *P. p. nigriventris* (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

Registros

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35736); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme, & Dantas, 2011); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, localidades Pará, Távora e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011); Reserva Humaitá – Ufac (Lemos, T. & Marques, E., AC 593).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Distribuição disjunta, na Amazônia, das Guianas até a Bolívia e no extremo leste do Brasil (Mata Atlântica) (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *P. m. nanus* (Pinto & Camargo, 1954; Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.



Fêmea



Registros

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35740, 35741); Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 23938); Município de Capixaba, Fazenda Campo Lindo (Hidasi, J., CPJH 1412); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005; Crozariol, M. A., Melo, T. N. e Leite, G., MNRJ 49515); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Jurupari, localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, Localidade Manaus (Dantas, n. p. - 2010); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64471).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOD.

Distribuição Geográfica

Em toda a Amazônia, das Guianas até a Bolívia (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

Em Pinto & Camargo (1954) e Novaes (1957) este táxon foi nominado como *Platysaris minor*.



Registros

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35729, 35730, 35731, 35732, 35733, 35734); Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 27200); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Rio Juruá, margem direita, Localidade Mato Grosso (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52216, Whittaker *et al.*, 2002); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Ramal Nabor Júnior, Km 26 (Guilherme, E., MPEG 60791); BR-364 a 40 Km da ponte sobre o Rio Liberdade, margem direita (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60790); Floresta Estadual do Antimary, Ramal Uirapuru (Guilherme, E., MPEG 60792); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme, & Dantas, 2011); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, localidades Pará, Távora, Manaus e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 63557); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

Dossel de FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

Norte da América do Sul (Amazônia), das Guianas até a Bolívia. Ocorre, também, no extremo leste do Brasil (Mata Atlântica), de Pernambuco ao Espírito Santo (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

cotinga-de-garganta-encarnada – *Porphyrolaema porphyrolaema* (Deville & Sclater, 1852)

Purple-throated Cotinga

**Registros**

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Município de Rio Branco, Transacreana, ramal do Noca (Plácido, R. A. 2015 [Wikiaves - WA1764849]).

Habitat

Dossel de FOA com palmeiras/bambus.

Distribuição Geográfica

Noroeste da Amazônia (Colômbia, Equador, Peru e Brasil) (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia


Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

anambé-pombo – *Gymnoderus foetidus* (Linnaeus, 1758)

Bare-necked Fruitcrow



Macho

Registros

Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52588); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Floresta Estadual do Antimary, Ramal Uirapuru (Guilherme, E., obs. pess.); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 62133); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63591, 64576); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64474); Parque Zoobotânico, Ufac Rio Branco (Kaseker, E. P., 2013 [Wikiaves - WA436322]); Município de Cruzeiro do Sul (Filho, J. D., 2013 [Wikiaves - WA896275]); Município de Acrelândia (Purificação, K. N. (2015). [Wikiaves - WA1674591]).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD.

Distribuição Geográfica

Em quase toda a Amazônia, das Guianas até a Bolívia (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

anambé-de-cara-preta – *Conioptilon mcilhennyi* Lowery & O'Neill, 1966

Black-faced Cotinga



Bertrando Campos

**cotinga-azul** – *Cotinga maynana* (Linnaeus, 1766)

Plum-throated Cotinga



Robson Czaban



Macho

Registros

Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whittaker & Oren, 1999, MPEG 52585, 52586); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Whittaker & Oren, 1999; Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 52215); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2008, MPEG 58938); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63657, 64575); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., obs. pess.); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Jurupari, Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, localidades Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); municípios de Assis Brasil, Brasiléia e Xapuri (DeLuca, 2012); Município de Bujari, Floresta Estadual do Antimary (DeLuca, 2012); Fazenda Experimental Catuaba (Guilherme, E., 2009 [Wikiaves - WA435675]); Crozariol, M. A., Melo, T. N. e Leite, G., MNRJ 495160).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD.

Distribuição Geográfica

No leste do Peru, norte da Bolívia e na Amazônia sul-ocidental brasileira (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2004). Espécie restrita ao centro de endemismo Inambari (Haffer, 1978, Cracraft, 1985).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002).

Habitat

Dossel de FOA com palmeiras/bambus, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Noroeste da Amazônia, da Colômbia até a Bolívia (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

anambé-azul *Cotinga cayana* (Linnaeus, 1766)
Spangled Cotinga



Robson Czaban



Macho

Registros

Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52587); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Município de Santa Rosa do Purus, Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Município de Xapuri, Resex Chico Mendes (Mestre *et al.* 2010); Rio Jurupari, Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, Localidade Manaus (Dantas, n. p. - 2010).

Habitat

Dossel de FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Em toda a Amazônia, das Guianas até a Bolívia (Hoyo *et al.*, 2004).


Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

anambé-una – *Querula purpurata* (Statius Muller, 1776)
Purple-throated Fruitcrow



Ciro Albano



Macho

Registros

Município de Capixaba, Fazenda Campo Lindo (Hidasi, J., CPJH 1419); Reserva Extrativista do Alto Juruá, Foz do Rio Tejo (Whittaker & Oren, 1999; Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 52217); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A., MPEG 48430); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60793, 60794); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64475, 64476); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, localidades Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010; MPEG 71394); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

Dossel de FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

América Central e norte da América do Sul (Amazônia), da Nicarágua até a Bolívia (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

anambé-preto – *Cephalopterus ornatus* Geoffroy Saint-Hilaire, 1809
Amazonian Umbrellabird



Robson Czaban



Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48431; Whittaker *et al.*, 2002); Município de Sena Madureira, Resex Cazumbá-Iracema (Carvalho, G. com. pess.).

Habitat

FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Em quase toda a Amazônia, das Guianas até a Bolívia (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2004).


Status

Residente.

papinho-amarelo – *Piprites chloris* (Temminck, 1822)
Wing-barred Piprites



Tomaz Melo



Registros

Alto Rio Moa, margem direita, Igarapé Ramon, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52800); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52668, 52669); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80219); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61356, 61357); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 63581, 63582); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 64586; Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, localidades Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Rio Chandless, margem esquerda, a aproximadamente 3 Km da foz (Guilherme & Dantas 2011; MPEG 63382); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63807); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Silva *et al.*, 2015); Município de Senador Guimard, BR 364, Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015).

Habitat

FOA com bambus/palmeiras, FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

No norte da América do Sul (Amazônia), das Guianas até a Bolívia e também no sul da América do Sul (Paraguai, Brasil e Argentina) (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas sete subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *P. c. boliviana* (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

enferrujadinho – *Neopipo cinnamomea* (Lawrence, 1869)
Cinnamon Manakin-Tyrant



Edson Guilherme



Registros

Arredores da cidade de Plácido de Castro (Forrester, 1993, observada); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); campinaranas dos municípios de Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul (Guilherme, 2012); Município de Mâncio Lima, Comunidade Santa Bárbara (Lemos, T. & Marques, E., AC 607); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

Em quase toda a Amazônia, das Guianas ao Peru (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *N. c. cinnamomea* (Hoyo *et al.*, 2004).


Status

Residente.

Comentários

Como se trata de uma espécie normalmente rara na Amazônia, associada quase sempre às campinas e campinaranas, considero como duvidoso o registro de *N. cinnamomea* feito por Forrester (1993) nos arredores de Plácido de Castro.

patinho-de-coroa-dourada – *Platyrrinchus coronatus* Sclater, 1858
Golden-crowned Spadebill



Wilfred Rogers



Registros

Alto Rio Moa, margem esquerda, Serra da Jaquirana (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52792, 52793); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48402, 48403, 48404, 48405); Rio Tejo, margem esquerda a aproximadamente 5 Km da foz (Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 52201); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63384, 63385); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63790, 63791); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013, AC 696).

Habitat

FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

América Central e norte da América do Sul (Amazônia) (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *P. c. coronatus* (Hoyo *et al.*, 2004).

Status


Residente.

patinho-de-coroa-branca – *Platyrinchus platyrhynchos* (Gmelin, 1788)

White-crested Spadebill



Robson Czaban

**Registros**

Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52648); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 59878); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Município de Jordão, Localidade Manaus (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Fazenda experimental Catuaba (Pinto, R. R. & Lima, J. 2015, anilhado).

Habitat

FOA com palmeiras, campinarana.

Distribuição Geográfica

Em toda a Amazônia, das Guianas até a Bolívia (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas quatro subespécies. Uma das formas que ocorrem no Acre parece ser a *P. p. senex* (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

flautim-pardo – *Cnipodectes subbrunneus* (Sclater, 1860)

Brownish Twistwing



Edson Guilherme

**Registros**

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 25597, 25598); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48393, 48394); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52202; Whittaker *et al.*, 2002); Parque Nacional da Serra do Divisor, 106 Km a sudoeste de Cruzeiro do Sul (Aleixo, A. & Polleto, F, MPEG 58025); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Município de Jordão, Localidade Távora (Dantas, n. p. - 2010); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62126); Município de Mâncio Lima, Estrada do Barão, Comunidade São Domingos (Guilherme, E., MPEG 62127, 62128); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63395, 63396); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63794); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Cruzeiro do Sul, BR 307, Ramal dos Caroba (Guilherme, E. AC 389); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013, AC 682); Município de Assis Brasil (Whittaker, A., 2009 [Wikiaves - WA533266]).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

No sul da América Central (Panamá) e no noroeste da Amazônia (Colômbia, Equador, Brasil e Peru) (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *C. s. minor* (Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.


Comentários

Guilherme (2001) cita a ocorrência de *C. subbrunneus* para o Parque Zoológico da Ufac. No entanto, a análise de uma pele coletada por mim em 2003 (MPEG 60001) revelou que a espécie presente no PZ é *C. superrufus* (Tobias *et al.*, 2008). Tratava-se, à época, de um táxon novo, cuja descrição científica só viria a ser revelada quatro anos depois (Lane *et al.*, 2007; próximo *account*).

flautim-rufo – *Cnipodectes superrufus* Lane, Servat, Valqui & Lambert, 2007
Rufous Twistwing



Tomaz Melo



abre-asa-do-acre – *Mionectes amazonus* (Todd, 1921)
Western MacConnell's Flycatcher



Registros

Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Tobias *et al.*, 2008, {Guilherme, 2001 – citado como *Cnipodectes subbrunneus* }, MPEG 60000, 60001); ESEC – Rio Acre (Tobias *et al.*, 2008, Aleixo & Guilherme, 2008; 2010); Estrada Transacreeana (AC-090), Ramal Jarinal (Tobias *et al.*, 2008, Guilherme & Santos, 2009; MPEG 61351); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010, MPEG 66991; DeLuca, 2012); municípios de Assis Brasil e Brasiléia (DeLuca, 2012); Reserva Humaitá – Ufac (Melo *et al.*, 2015); Município de Senador Guiomard, Ramal do Japonês (Guilherme, E., obs. pess.).

Habitat

FOA com bambus.

Distribuição Geográfica

Noroeste da Bolívia (Pando) e sudeste do Peru. No Brasil, só foi registrada no estado do Acre (Lane *et al.*, 2007; Tobias *et al.*, 2008).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2013).

Status

Residente.

Comentários

Esta espécie foi recentemente descrita para a ciência. Trata-se de uma ave associada às florestas com bambus na Amazônia sul-ocidental. É, certamente, mais uma espécie restrita ao centro de endemismo Inambari. As primeiras informações sobre o seu comportamento, distribuição geográfica e conservação podem ser encontradas em Lane *et al.* (2007) e Tobias *et al.* (2008).

Registros

Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52654).

Habitat

FOA com palmeiras.

Distribuição Geográfica

Em quase toda a Amazônia, das Guianas até a Bolívia (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

Este táxon era considerado como subespécie de *M. macconnelli* (Hoyo *et al.*, 2004).


Status

Residente.

Nome anterior

M. macconnelli.

abre-asa – *Mionectes oleagineus* (Lichtenstein, 1823)
Ochre-bellied Flycatcher




abre-asa – *Mionectes oleagineus* (Lichtenstein, 1823)
Ochre-bellied Flycatcher

Habitat
FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.
Distribuição Geográfica
Na América Central, no norte da América do Sul (Amazônia) e na Mata Atlântica brasileira (de Alagoas ao Rio de Janeiro) (Sick, 1997; Hoyo <i>et al.</i> , 2004).
Taxonomia
São reconhecidas sete subespécies. A forma que ocorre no Acre é a <i>M. o. oleagineus</i> (Hoyo <i>et al.</i> , 2004).
Status
Residente.

Registros

Alto Rio Moa, margem direita, Igarapé Ramon, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52777); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52651, 52652, 52653); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., 48414, 48415, 48416, 48417, 48418, 48419, 48420, 49729); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 48421, 48422); Rio Tejo, margem esquerda, a aproximadamente 5 Km da foz (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52212, 52213); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52211); arredores da cidade de Assis Brasil (Guilherme, 2004, AC 0091); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal (Guilherme, E., MPEG 60035, 60036; Lemos, T. & Marques, E., 594; Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); Ramal Nabor Júnior, Km 26 (Guilherme, E., MPEG 60744); Rio Liberdade, margem direita, próximo à Foz do Igarapé Novena (Guilherme, 2007, MPEG 60743); Floresta Estadual do Mogno, BR-364, a 6 Km da ponte sobre o Rio Tauari (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60747); Floresta Estadual do Rio Gregório, próximo à ponte sobre o Rio Acuraua (Guilherme, 2007, MPEG 60745, 60746); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008; Bueno, A. S., AC 0739, 0744); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62109, 62110); Município de Mâncio Lima, Estrada do Barão, Comunidade São Domingos (Guilherme, E., MPEG 62106, 62107, 62108); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63785); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste e norte (Guilherme, E., MPEG 63572); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Jurupari, Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010, MPEG 70036, 70037); Rio Jurupari, Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010, MPEG 70035); Município de Cruzeiro do Sul, BR 307, Ramal dos Caroba (Guilherme, E. AC 343); Município de Senador Guiomard, Localidade Bonal (Guilherme, E. & Marques, E. L., AC 313); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Silva *et al.*, 2015); Município de Senador Guiomard, BR 364, Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015); Município de Porto Acre, mata ripária adjacente à Reserva Humaitá, setor norte (Marques, 2015).



Registros

Arredores da cidade de Manoel Urbano (Silva, G. P., MPEG 31538, 47922); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52645, 52646); Alto Rio Moa, margem direita, Igarapé Ramon, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52778, 52779); Alto Rio Moa, margem esquerda, Serra da Jaquirana (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52780); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 48428); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52204, 52205); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80220); Parque Zoológico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; AC 424); arredores da cidade de Assis Brasil (Guilherme, 2004, MPEG 61489); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005, Guilherme, E., MPEG 61543); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal (Guilherme, E., MPEG 60032, 60033, 60034; Lemos, T. & Marques, E., AC 589; Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60753, 60754, 60755; Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); Rio Liberdade, margem direita, próximo à Foz do Igarapé Novena (Guilherme, 2007, MPEG 60751, 60752); Floresta Estadual do Mogno, BR-364, a 6 Km da ponte sobre o Rio Tauari (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60748, 60749); Floresta Estadual do Antimary, Ramal Uirapuru (Guilherme, E., MPEG 60750); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61323, 61324, 61325); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 59871, 58909, 58910); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Município de Jordão, localidades Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62111); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 63575); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63574, 64572); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63392); Município de Senador Guiomard, Localidade Bonal (Guilherme, E. & Souza, G., AC 544); Município de Senador Guiomard, BR 364, Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015); BR 317, margem esquerda, área adjacente à Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015); Município de Rio Branco, Estrada da Piçarreira (Marques, 2015); Município de Plácido de Castro, BR-364, Ramal do 45 (Marques, 2015); Município de Porto Acre, mata ripária adjacente à Reserva Humaitá, setor norte (Marques, 2015).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Do México ao norte da Argentina e em quase todo o Brasil (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas seis subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *L. a. peruvianus* (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.



Anselmo D'Alfonseca



Edson Guilherme

Registros

Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 48309, 48310, 48311); Rio Tejo, margem esquerda, a aproximadamente 5 Km da foz (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52230); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52228, 52229); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60756); Floresta Estadual do Antimary, Localidade Limoeiro (Guilherme, E., MPEG 60757); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Estrada Transacreaana (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61322); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 59872, 59873); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 63559); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63390, 63391); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63432); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63784); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Jurupari, Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010, MPEG 70033); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Município de Senador Guimard, Localidade Bonal (Guilherme, E. & Marques, E. L., AC 318); Município de Rio Branco, Estrada da Piçarreira (Marques, 2015).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Em toda a Amazônia (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *C. t. torquatus* (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48390, 48391); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52206); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; MPEG 60026; AC 0765, 0787); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 58915, 58916); Floresta Estadual do Antimary, Ramal Uirapuru (Guilherme, E., MPEG 60773); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 63555, 63556, 63557, 63558); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64389, 64390); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63792, 63793); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63386); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); BR 317, margem esquerda, área adjacente à Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015); Município de Rio Branco, Estrada da Piçarreira (Marques, 2015).

Habitat

FOA com bambus/palmeiras, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Sul da América Central e norte da América do Sul, do Panamá até a Bolívia. Ocorre, também, no leste do Brasil, de Pernambuco ao Rio de Janeiro (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas nove subespécies. A forma que ocorre no Acre é, possivelmente, a *R. o. aequinoctialis* (Hoyo *et al.*, 2004).

Status


Residente.



Robson Czuban



Anselmo D'Afonseca



Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Rio Jurupari, localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Reserva Humaitá – Ufac (Lemos, T. & Marques, E., AC 587); Cruzeiro do Sul (Melo, T. N., 2014 [Wikiaves - WA1240948]).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus.

Distribuição Geográfica

Do México até a Argentina e em quase todo o Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas 16 subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *T. s. insignis* (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

Registros

Igarapé Preto, afluente do Rio Juruá-mirim, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52927, 52928); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004, MPEG 58389); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada Transacreana (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61332); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 64569); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão e localidades Távora, Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013, AC 705).

Habitat

FOA com bambus/palmeiras, FOA aluvial, campinarana.

Distribuição Geográfica

Na América Central e no norte da América do Sul (Amazônia) (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia


São reconhecidas oito subespécies. A forma que ocorre no Acre é, possivelmente, a *T. a. assimilis* (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

bico-chato-de-cabeça-cinza – *Tolmomyias poliocephalus* (Taczanowski, 1884)
Gray-crowned Flycatcher

Tomaz Melo

**Registros**

Arredores da cidade de Cruzeiro do Sul (Novaes, 1957, 1958); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52647); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A., MPEG 48427); Parque Nacional da Serra do Divisor, 106 Km a sudoeste de Cruzeiro do Sul (Aleixo, A. & Polletto, F, MPEG 58024); Rio Paratari, margem sul, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão e localidades Távora, Pará, Manaus e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); Município de Plácido de Castro, BR-364, Ramal do 45 (Marques, 2015); Município de Porto Acre, mata ripária adjacente à Reserva Humaitá, setor norte (Marques, 2015).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus.

Distribuição Geográfica

Norte da América do Sul (Amazônia) e também na Mata Atlântica brasileira (de Pernambuco ao Espírito Santo) (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies (Hoyo *et al.*, 2004). Novaes (1957), registrou para o Acre a forma *T. p. poliocephalus*. No entanto, em virtude do tom mais acinzentado da garganta, acredito que os espécimes do Acre pertençam à forma *T. p. sclateri* (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

bico-chato-amarelo – *Tolmomyias flaviventris* (Wied, 1831)
Yellow-breasted Flycatcher

Emerson Kaseker

**Registros**

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80221, 80222); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64469); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão (Dantas, n. p. - 2010).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, borda de FOA aluvial, FOD submontana, área aberta com pastagens ou cultivares.

Distribuição Geográfica

Das Guianas até a Bolívia. Ocorre em toda a Região Norte, Nordeste e parte do Sudeste do Brasil (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas seis subespécies. A forma que ocorre no Acre parece ser a *T. f. viridiceps* (Hoyo *et al.*, 2004).

Status


Residente.

ferreirinho-estriado – *Todirostrum maculatum* (Desmarest, 1806)


Spotted Tody-Flycatcher



Emerson Kaseker

**ferreirinho-de-sobrancelha** – *Todirostrum chrysocrotaphum* (Strickland, 1850)

Yellow-browed Tody-Flycatcher



Robson Czaban

**Registros**

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 25630); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Estrada Transacrea (AC-090) Km 60, margem direita (Guilherme, E., MPEG 61441); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63788); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Município de Mâncio Lima, Comunidade Santa Bárbara (Lemos, T. & Marques, E., AC 611); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD submontana, área aberta com cultivares ou pastagens.

Distribuição Geográfica

Em toda a Amazônia, das Guianas até a Bolívia.

Taxonomia

São reconhecidas cinco subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *T. m. signatum* (Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

Comentários

Espécie de vocalização facilmente reconhecível. Ocorre em todo o estado do Acre, inclusive em ambientes urbanos (quintais e praças).

Registros

Arredores da cidade de Rio Branco, Seringal Nova Empresa (Hidasi, J., CPJH 1506); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52643); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, E., Dantas, S. M., obs. pess.); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 64568, 64574); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64509); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., obs. pess.); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão e localidades Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Senador Guimard, Localidade Bonal (Guilherme, E. & Marques, E. L., AC 322).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, borda de FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Da Foz do Rio Amazonas para o oeste, até a Colômbia, o Peru, o Equador e a Bolívia (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas cinco subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *T. c. neglectum* (Hoyo *et al.*, 2004).

Status


Residente.

ferreirinho-de-cara-branca – *Poecilatriccus albifacies* (Blake, 1959)

White-cheeked Tody-Tyrant



Tomaz Melo

**maria-picaça** – *Poecilatriccus capitalis* (Sclater, 1857)

Black-and-white Tody-Tyrant *



Ciro Albano

**Registros**

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002, Suplemento); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80226, 80227); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Zimmer *et al.*, 2010); Fazenda Experimental Catuaba (Singer, M., 2015 [Wikiaves - WA1687450]).

Habitat

FOA com bambus.

Distribuição Geográfica

Sudeste do Peru (Clements & Shany, 2001; Schulenberg *et al.*, 2007) e no estado do Acre, no Brasil (Zimmer *et al.*, 2010). Espécie restrita ao centro de endemismo Inambari (Haffer, 1978, Cracraft, 1985). Esta espécie está associada às florestas dominadas por bambus no sudoeste amazônico (Stotz *et al.*, 1996).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

Comentários

O registro desta espécie na Reserva Extrativista do Alto Juruá, oeste do Acre, é de caráter duvidoso, necessitando de uma confirmação formal.

Registros

Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus.

Distribuição Geográfica

Oeste da Amazônia (Brasil, Colômbia, Equador e Peru). No Brasil, já foi registrada também em Rondônia e no Pará (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

Ver Comentários.

Status

Ver Comentários.

Comentários

(*) Este registro pode ser um erro de identificação. Possivelmente T. B. Rasmussen (autor do registro) confundiu esta espécie com *P. albifacies*.

ferreirinho-de-cara-parda – *Poecilatriccus latirostris* (Pelzeln, 1868)

Rusty-fronted Tody-Flycatcher




Robson Czaban

**caçula** – *Myiornis ecaudatus* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)

Short-tailed Pygmy-Tyrant



Anselmo D'Afonseca

**Registros**

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Município de Senador Guiomard, Localidade Bonal (Guilherme, E. & Souza, G., AC 543); Reserva Humaitá – Ufac (Lemos, T. & Marques, E., AC 592); Município de Plácido de Castro, BR-364, Ramal do 45 (Marques, 2015).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Oeste da América do Sul, da Colômbia até a Bolívia. No Brasil, ocorre nas regiões Norte, Centro-Oeste e parte da Sudeste (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas sete subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *P. l. latirostris* (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

Registros

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35788); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64491); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão e localidades Távora, Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, FOD, campinarana.

Distribuição Geográfica

Norte da América do Sul (Amazônia) (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

Duas subespécies são reconhecidas. A forma que ocorre no Acre é a *M. e. ecaudatus* (Pinto & Camargo, 1954; Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

maria-sebinha-do-acre – *Hemitriccus cobnhafti* Zimmer, Whittaker, Sardelli, Guilherme & Aleixo, 2013
Tody-Tyrant



Tomaz Melo



Registros

Município de Assis Brasil, Estrada da Pedreira, Localidade Museu (Zimmer *et al.*, 2013, MPEG 70053, 74531, 74532); Município de Rio Branco, Ramal Jarinal (Melo *et al.*, 2015).

Habitat

FOA com bambus.

Distribuição Geográfica

Sudoeste da Amazônia. Leste do estado do Acre, sudeste do Peru e noroeste da Bolívia (Zimmer *et al.*, 2013; Harvey *et al.*, 2014; Melo *et al.*, 2015).

Taxonomia

Espécie monotípica (Zimmer *et al.*, 2013).

Status

Residente.

maria-sebinha – *Hemitriccus* aff. *minor* (Sneathlage, 1907)
Sneathlage's Tody-Tyrant



Edson Guilherme



Registros

Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Ramal Nabor Júnior, Km 26 (Guilherme, E., MPEG 60759); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64388, 64554); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Município de Senador Guiomard, Localidade Bonal (Guilherme, E. & Souza, G. AC 579).

Habitat

FOA com bambus/palmeiras, capoeira.

Distribuição Geográfica

Da margem sul do Rio Amazonas (Baixo Rio Xingu) para o oeste, até o Peru e a Bolívia (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

O ornitólogo Mario Cohn-Haft, após analisar fotos e vocalização do espécime AC 579, depositado na coleção ornitológica da Ufac, me informou tratar-se, possivelmente, de um “*taxon novum*” do grupo “*minor*”, restrito ao interflúvio Madeira/Purus que, em breve, será nominado por sua equipe (INPA/Manaus).

Status

Residente.


Comentários

A ocorrência do táxon *Hemitriccus* aff. *minor* no leste do Acre está comprovada através de espécimes testemunhos. A citação desta espécie por Whittaker *et al.* (2002, suplemento), no oeste do Acre, representa um possível erro de identificação. Diante da informação de que os espécimes atribuídos a *H. minor* no leste do Acre pertencem a um táxon novo, muito provavelmente todos os demais registros (visuais e sonoros) atribuídos a *H. minor* no leste do Estado também pertençam a este novo táxon.

maria-de-peito-machetado – *Hemitriccus flammulatus* Berlepsch, 1901
Flammulated Pygmy-Tyrant




Tomaz Melo



maria-de-barriga-branca – *Hemitriccus griseipectus* (Sneath, 1907)
White-bellied Tody-Tyrant



Tomaz Melo



Registros

Rio das Minas, margem esquerda, Município de Porto Walter, Localidade Gustavo (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52923); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 48399); Rio Tejo, margem esquerda, a aproximadamente 5 Km da foz (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52208; Whittaker *et al.*, 2002); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80231); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; AC 0006); Parque Nacional da Serra do Divisor, 106 Km a sudoeste de Cruzeiro do Sul (Aleixo, A. & Polletto, F, MPEG 58020); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Guilherme *et al.*, 2003; Rasmussen *et al.*, 2005, Guilherme, E., MPEG 61541, 61542); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2008; 2009); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 63552, 63553, 63554); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2008, 2010; MPEG 59874, 59875, 58919); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2008a; 2011); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64507); Município de Assis Brasil, Estrada da Pedreira, Localidade Museu (Aleixo, A.; Guilherme, E. & Whittaker, A., MPEG 70052; Guilherme, E., MPEG 70914); Município de Senador Guiomard, Localidade Bonal (Guilherme, E. & Souza, G. AC 569, 570); Município de Rio Branco, Estrada da Piçarreira (Marques, E. & Lemos, T., AC 669, 670); Reserva Humaitá – Ufac (Lemos, T. & Marques, E., AC 722; Silva *et al.*, 2015); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Silva *et al.*, 2015); Município de Senador Guiomard, BR 364, Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015); BR 317, margem esquerda, área adjacente à Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015).

Habitat

FOA com bambus, FOA aluvial com bambus.

Distribuição Geográfica

Amazônia sul-ocidental (Brasil, Peru e Bolívia) (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *H. f. flammulatus* (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

Registros

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35786); arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35787); Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 25635); Rio Juruá, Localidade Nossa Senhora Aparecida (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52920, 52921); Rio das Minas, margem esquerda, Município de Porto Walter, Localidade Gustavo (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52922); Alto Rio Moa, margem esquerda, Localidade Morro Queimado, Serra da Jaquirana (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52781, 52782, 52783, 52784, 52785); Rio Juruá, margem direita, Localidade Mato Grosso (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52209; Whittaker *et al.*, 2002); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Município de Jordão, localidades Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62116); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Cruzeiro do Sul, BR 307, Ramal dos Caroba (Guilherme, E. AC 366, 368); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013, AC 679).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOD, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

Margem sul do Rio Solimões/Amazonas, da margem esquerda do Rio Xingu para o oeste, até o Peru e a Bolívia (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.


Em Pinto & Camargo (1954) e Novaes (1957), este táxon foi nominado como *Euscarthmornis zosterops griseipectus*. Já em Whitney *et al.* n.p. (1997) e Whittaker *et al.* (2002), este táxon aparece nominado como *H. zosterops*.

maria-peruviana – *Hemitriccus iobannis* (Sneath, 1907)


Johannes's Tody-Tyrant



Robson Czaban

**maria-mirim** – *Hemitriccus minimus* (Todd, 1925)

Zimmer's Tody-Tyrant



Ciro Albano

**Registros**

Arredores da cidade de Rio Branco, Seringal Nova Empresa (Hidasi, J., CPJH 1509); arredores da cidade de Plácido de Castro (Forrester, 1993, observada); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, E., Dantas, S. M., obs. pess.); Município de Rio Branco, Estrada da Piçarreira (Marques, E. & Lemos, T., AC 675; Marques, 2015); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Silva *et al.*, 2015); Reserva Humaitá – Ufac, setor norte (Silva *et al.*, 2015); Município de Plácido de Castro, BR-364, Ramal do 45 (Marques, 2015).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus.

Distribuição Geográfica

Sudoeste da Amazônia, da margem esquerda do rio Madeira para o oeste, até a Colômbia, o Equador, o Peru e a Bolívia (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

Registros

Alto Rio Moa, margem esquerda, Localidade Morro Queimado, Serra da Jaquirana (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52786); Estrada Transacreaana (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61326); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62117); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com bambus/palmeiras, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

Esta espécie é encontrada pontualmente em diversas regiões da Amazônia (Equador, Brasil, Peru e Bolívia) (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

maria-fiteira – *Lophotriccus vitioides* (Bangs & Penard, 1921)

Double-banded Pygmy-Tyrant




Robson Czaban

**maria-topetuda** – *Lophotriccus enlophotes* Todd, 1925

Long-crested Pygmy-Tyrant



Tomaz Melo

**Registros**

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 25738); Rio das Minas, margem esquerda, Município de Porto Walter, localidade Gustavo (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52924); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52207; Whittaker *et al.*, 2002); Parque Nacional da Serra do Divisor, 106 Km a sudoeste de Cruzeiro do Sul (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004, MPEG 58022).

Habitat

FOA com palmeiras.

Distribuição Geográfica

Da margem norte do Amazonas (Guiana Francesa e Amapá no Brasil) para o oeste, até o Equador e o Peru (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas quatro subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *L. v. congener* (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

Comentários

Em Novaes (1957), este táxon foi nominado como *L. congener*.

Registros

Igarapé Preto, afluente do Rio Juruá-mirim, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52925); Rio Juruá, margem direita, localidade Porongaba (Whittaker & Oren, 1999, MPEG 48400); Rio Juruá, Foz do Rio Tejo (Whittaker & Oren, 1999); Rio Amônia, localidade Quieto (Whittaker & Oren, 1999); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004, MPEG 58387); Parque Nacional da Serra do Divisor, 106 Km a sudoeste de Cruzeiro do Sul (Aleixo, A. & Polletto, F, MPEG 58021); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005, Guilherme, E., MPEG 60029); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal (Guilherme, E., MPEG 60030, 60031; Aleixo e equipe, AC 0425, 0426); Floresta Estadual do Antimary, Localidade Limoeiro (Guilherme, E., MPEG 60758); Estrada Transacrea (AC-090) Km 60, margem esquerda (Guilherme, E., MPEG 61443); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61327); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2008, 2010; MPEG 59876, 59877); Município de Jordão, localidades Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Rio Chandless, margem esquerda, a aproximadamente 3 Km da foz (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63400); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste e norte (Guilherme, E., MPEG 63641; Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); municípios de Brasiléia, Xapuri e Assis Brasil (DeLuca, 2012); Município de Bujari, Floresta Estadual do Antimary (DeLuca, 2012); Rio Jurupari, Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Parque Zoobotânico da Universidade Federal do Acre (Melo, T. N., com. pess.; Guilherme, E. 2014. [Wikiaves - WA1390889]); Município de Senador Guiomard, BR 364, Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015).

Habitat

FOA com bambus/palmeiras.

Distribuição Geográfica

Amazônia sul-ocidental, interflúvio Madeira/Juruá (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2004).


Status

Residente.

poiaeiro-de-pata-fina – *Zimmerius gracilipes* (Sclater & Salvin, 1868)
Slender-footed Tyrannulet



Emerson Kaseker



alegrinho-do-chaco – *Inezia inornata* (Salvadori, 1897)
Plain Tyrannulet



Oscar Abener Fenalti



Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Rio Tejo, a aproximadamente 5 Km da foz, REAJ (Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 52210); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão e localidades Távora, Pará, Manaus e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras, FOD submontana, área aberta com cultivos ou pastagens.

Distribuição Geográfica

Norte da América do Sul (Amazônia) e também nos estados do Ceará e Alagoas no Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *Z. g. gihvus* (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

Registros

Arredores da cidade de Rio Branco, Seringal Nova Empresa (Hidasi, J., CPJH 1515); arredores da cidade de Plácido de Castro (Forrester, 1993, observada); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Município de Rio Branco, *Campus* da Ufac (Guilherme, E., AC 182, 265).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Do norte da Argentina até o Peru (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Migrante austral.

amarelinho – *Inezia subflava* (Sclater & Salvin, 1873)
Amazonian Tyrannulet



Robson Czaban



Registros

Município de Sena Madureira, Rio Caeté (Moss, M. 2013 [Wikiaves - WA1065636]).

Habitat

Borda de FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Da Amazônia central, Baixo Rio Negro para o leste, até o Pará. Ocorre, também, no norte da Bolívia (Beni) e regiões adjacentes da Amazônia brasileira (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *I. s. subflava* (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

poiaeiro-de-sobrancelha – *Ornithion inerme* Hartlaub, 1853
White-lored Tyrannulet



Anselmo D'Afonseca



Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Município de Jordão localidades Távora, Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Xapuri (Godoy, F. I., 2013 [Wikiaves - WA1004838]); *Campus* e Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, E., 2014 [Wikiaves - WA1324029]).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

Norte da América do Sul (Amazônia) e também no extremo leste do Brasil (Mata Atlântica) (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2004).


Status

Residente.

risadinha – *Camptostoma obsoletum* (Temminck, 1824)
Southern Beardless-Tyrannulet



Robson Czaban



Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Município de Acrelândia (Purificação, K. N., 2015 [Wikiaves - WA1674587]).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras, FOD submontana, área aberta com cultivares ou pastagens.

Distribuição Geográfica

Da Costa Rica até a Argentina. Ocorre em todo o Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas 13 subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *C. o. olivaceum* (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

guaracava-de-barriga-amarela – *Elaenia flavogaster* (Thunberg, 1822)
Yellow-bellied Elaenia



Robson Czaban



Registros

Arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35789); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus.

Distribuição Geográfica

Do México até a Argentina. Ocorre em todas as regiões do Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas quatro subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *E. f. flavogaster* (Pinto & Camargo, 1954; Hoyo *et al.*, 2004).

Status


Migrante austral.

guaracava-grande – *Elaenia spectabilis* Pelzeln, 1868

Large Elaenia



Anselmo D'Alfonseca

**Registros**

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 24504, 25599); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); arredores da cidade de Rio Branco (Guilherme, E., MPEG 61484); BR-364 a 40 Km da ponte sobre o Rio Liberdade, margem direita (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60765); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63389); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63388, 63431); Cruzeiro do Sul, Estrada Canela Fina (Guilherme, E. AC 355, 392, 437); Município de Rio Branco, *Campus* da Ufac (Guilherme, E., AC 332).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, FOD submontana, área aberta com cultivares ou pastagens.

Distribuição Geográfica

Da Argentina e Uruguai para o norte, até a Colômbia. Ocorre pontualmente em quase todo o Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Migrante austral.

guaracava-de-crista-branca – *Elaenia chilensis* Hellmayr, 1927

Chilean Elaenia



Celso B. Almeida

**Registros**

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, área aberta com cultivares ou pastagens.

Distribuição Geográfica

Em quase toda a América do Sul (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

Táxon tratado por alguns autores como subespécie de *E. albiceps* (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Migrante austral.

Nome anterior

Elaenia albiceps.

guaracava-de-bico-curto – *Elaenia parvirostris* Pelzeln, 1868
Small-billed Elaenia



Anselmo D'Alfonseca



Registros

Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52642); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60764); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64463); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Município de Assis Brasil, Estrada da Pedreira, Localidade Museu (Guilherme, E., MPEG 70915, 70916); Município de Rio Branco, *Campus* da Ufac (Guilherme, E., AC 672, 760).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, área aberta com cultivares ou pastagens.

Distribuição Geográfica

Da Argentina em direção ao norte da América do Sul, até as Guianas (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2004).


Status

Migrante austral.

maria-pechim – *Myiopagis gaimardii* (d'Orbigny, 1839)
Forest Elaenia



Emerson Kaseker



Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Ramal Nabor Júnior, Km 26 (Guilherme, E., MPEG 60760); Estrada Transacrea (AC-090) Km 60, margem direita (Guilherme, E., MPEG 61440); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão e localidades Veneza, Manaus, Pará e Távora (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62112, 62113); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Senador Guimard, Localidade Bonal (Guilherme, E. & Souza, G., AC 571).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, campinarana, área aberta com cultivares, ambientes urbanos.

Distribuição Geográfica

Sul da América Central e norte da América do Sul (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas cinco subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *M. g. gaimardii* (Hoyo *et al.*, 2004).

Status


Residente.

guaracava-cinzenta – *Myiopagis caniceps* (Swainson, 1835)

Gray Elaenia



Anselmo D'Alfonseca

**Registros**

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Jordão, localidades Veneza e Pará (Dantas, n. p. - 2010).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Do Panamá até a Argentina e em quase todo o Brasil (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas quatro subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *M. c. cinerea* (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

guaracava-de-penacho-amarelo – *Myiopagis flavivertex* (Sclater, 1887)

Yellow-crowned Elaenia



Robson Czaban

**Registros**

Rio Juruá, arredores da cidade de Cruzeiro do Sul (Novaes, 1957, 1958, MPEG 25685); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 64571).

Habitat

FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Das Guianas ao Peru, ao longo da calha do Rio Solimões/Amazonas, em ambas as margens (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

guaracava-de-crista-alaranjada – *Myiopagis viridicata* (Vieillot, 1817)
Greenish Elaenia




Robson Czaban



maria-te-viu – *Tyrannulus elatus* (Latham, 1790)
Yellow-crowned Tyrannulet



Edson Guilherme



Registros

Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60761).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus.

Distribuição Geográfica

Do México até a Argentina. Ocorre localmente em quase todo o Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas dez subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *M. v. viridicata* (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Migrante austral (Stotz *et al.*, 1996; Schulenberg *et al.*, 2007).

Registros

Rio Juruá, localidade Walkiria (Novaes, 1957, MPEG 25737); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; AC 382); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 61439); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62114, 62115); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63644, 64573); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão e Localidade Távora (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Cruzeiro do Sul, Estrada Canela Fina (Guilherme, E. AC 401); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, borda de FOA aluvial, FOD, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

No sul da América Central e no norte da América do Sul (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

marianinha-amarela – *Capsiempis flaveola* (Lichtenstein, 1823)

Yellow Tyrannulet



Tomaz Melo

**Registros**

Município de Xapuri (Melo, M. A., 2013 [Wikiaves - WA1280582]); Município de Rio Branco, Ramal do Noca (Plácido, R. A. 2015 [Wikiaves - WA1808959]).

Habitat

FOA com bambus.

Distribuição Geográfica

Da América Central até a Argentina. Possui distribuição pontual no oeste da Amazônia (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas cinco subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *C. f. cerula* (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

bagageiro – *Phaeomyias murina* (Spix, 1825)

Mouse-colored Tyrannulet



Tancredo Maia Filho

**Registros**

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Parque Zoobotânico e *Campus* da Ufac, Rio Branco (Guilherme, E., AC 447); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64386, 64387); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63786); Parque Estadual Chandless (Guilherme, E. & Marques, E., AC 0255); Município de Senador Guiomard, Localidade Bonal (Guilherme, E. & Marques, E. L., AC 326); Cruzeiro do Sul, Estrada Canela Fina (Guilherme, E. AC 404); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras, FOA aluvial, área aberta com cultivos ou pastagens, ambientes urbanos.

Distribuição Geográfica

Do Panamá ao norte da Argentina e em quase todo o Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas sete subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *P. m. wagaie* (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

tricolino-oliváceo – *Pseudocolopteryx acutipennis* (Sclater & Salvin, 1873)

Subtropical Doradito



Geiser Tirvelato



Peru

Bolivia

Registros

Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008).

Habitat

FOA com Palmeiras.

Distribuição Geográfica


Região central e leste da cordilheira andina, desde a Colômbia até o noroeste da Argentina. Ocorre, também, nas terras baixas do Paraguai, sudeste do Peru e nordeste da Bolívia (Hoyo *et al.*, 2004). No Brasil, foi registrada no noroeste de Rondônia (Whittaker, 2004).

TaxonomiaEspécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2004).**Status**

Migrante austral.

tinguaçu-ferrugem – *Attila cinnamomeus* (Gmelin, 1789)

Cinnamon Attila



Celso B. Almeida



Peru

Bolivia

RegistrosRio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 27179); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).**Habitat**

Borda de FOA/FOD aluvial.

Distribuição GeográficaEm toda a Amazônia, das Guianas até a Bolívia (Hoyo *et al.*, 2004).**Taxonomia**Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2004).**Status**

Residente.

tinguaçu-de-barriga-amarela – *Attila citriniventris* Sclater, 1859

Citron-bellied Attila



Anselmo D'Alfonseca

**bate-pára** – *Attila bolivianus* Lafresnaye, 1848

Dull-capped Attila



Edson Guilherme

**Registros**

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62124, 62125).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, campinarana.

Distribuição Geográfica

Noroeste da Amazônia, da Venezuela ao Peru (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 27175); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 58930, 59880); Floresta Estadual do Antimary, Ramal Uirapuru (Guilherme, E., MPEG 60787); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 63560; 63561); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Parque Zoológico da Ufac, Rio Branco (obs. pess.); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., obs. pess.); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão (Dantas, n. p. - 2010); Município de Rio Branco, Estrada da Piçarreira (Marques, 2015).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Margem sul do Rio Amazonas/Solimões, da sua foz para o oeste, até a Colômbia e a Bolívia (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *A. b. bolivianus* (Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2004).

Status


Residente.

capitão-de-saíra-amarelo – *Attila spadiceus* (Gmelin, 1789)

Bright-rumped Attila



Sílvia Faustino Linhares

**Registros**

Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52640); Rio Juruá, margem esquerda, localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48387); Rio Juruá, margem direita, localidade Porongaba (Whittaker, A., MPEG 48386); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 58931, 58932); BR-364 a 40 Km da ponte sobre o Rio Liberdade, margem direita (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60788, 60789); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Guilherme, E., MPEG 61544); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste e norte (Guilherme, E., MPEG 63571; Silva *et al.*, 2015); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63406); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63797); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre, L. A. & Silva, G. T., MPEG 66993; Mestre *et al.*, 2010); Rio Jurupari, localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão localidades Távora, Pará, Belém, Manaus e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Município de Senador Guiomard, localidade Bonal (Guilherme, E. & Souza, G. AC 531, 556, 560); Cruzeiro do Sul, Estrada Canela Fina (Guilherme, E. AC 341); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Município de Senador Guiomard, BR 364, Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015); Município de Porto Acre, mata ripária adjacente à Reserva Humaitá, setor norte (Marques, 2015).

Habitat

FOA com bambus/palmeiras, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Do México até a Bolívia e na Região Sudeste do Brasil (de Alagoas até o Rio de Janeiro) (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas 12 subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *A. s. spadiceus* (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

bem-te-vi-pirata – *Legatus leucophaius* (Vieillot, 1818)

Piratic Flycatcher



Marco Guedes

**Registros**

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35770); Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63787); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão e Localidade Távora (Dantas, n. p. - 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras, FOD, FOD submontana, área aberta com cultivares ou pastagens.

Distribuição Geográfica

Do México até a Argentina e em quase todas as regiões do Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *L. l. leucophaius* (Pinto & Camargo, 1954; Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2004).

Status


Residente.

maria-cabeçuda – *Ramphotrigon megacephalum* (Swainson, 1835)

Large-headed Flatbill



Tomaz Melo

**Registros**

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, F., & Moreira, M., MZUSP 42722); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80235); Parque Nacional da Serra do Divisor, 106 Km a sudoeste de Cruzeiro do Sul (Aleixo, A. & Polleto, F, MPEG 58023); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61328, 61329); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 64403); Rio Chandless, margem esquerda, a aproximadamente 3 Km da foz (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63401, 63402); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Santos, 2011, MPEG 63433); Rio Jurupari, localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64468); Fazenda Experimental Catuaba (Melo, T. N., 2013 [Wikiaves - WA954135]); Melo, 2015); Reserva Florestal Humaitá, Ufac (Melo, T. N., 2014 [Wikiaves - WA1586489]); Melo, 2015a; Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Portela, R. 2014 - anilhado).

Habitat

FOA com bambus/palmeiras, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

No norte (Amazônia ocidental) e no extremo Sudeste da América do Sul (Brasil Paraguai e Argentina) (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas quatro subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *R. m. bolivianum* (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

bico-chato-de-rabo-vermelho – *Ramphotrigon ruficauda* (Spix, 1825)

Rufous-tailed Flatbill



Robson Czaban

**Registros**

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35791, 35792, 35793); Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 25606, 25607, 25609, 25611); Município de Capixaba, Fazenda Campo Lindo (Hidasi, J., LSUMZ 65067); Alto Rio Moa, margem direita, Igarapé Ramon, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52790, 52791); Igarapé Preto, afluente do Rio Juruá-mirim, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52929, 52930); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52641); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Ramal Nabor Júnior, Km 26 (Guilherme, E., MPEG 60884); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62120, 62121, 62122); Município de Mâncio Lima, Estrada do Barão, Comunidade São Domingos (Guilherme, E., MPEG 62131); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Município de Jordão, localidades Távora, Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOD, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

Em toda a Amazônia, das Guianas até a Bolívia (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2004).

Status


Residente.

maria-de-cauda-escura – *Ramphotrigon fuscicauda* Chapman, 1925


Dusky-tailed Flatbill



Tomaz Melo

**maria-cavaleira-pequena** – *Myiarchus tuberculifer* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)

Dusky-capped Flycatcher



Anselmo D'Affonseca

**Registros**

Alto Rio Moa, margem direita, Igarapé Ramon, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52788, 52789); Parque Nacional da Serra do Divisor, Alto Rio Moa, margem direita, Mâncio Lima (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52787); Reserva Extrativista do Alto Juruá, Rio Tejo, Localidade Alegria (Whittaker & Oren, 1999, Whittaker *et al.*, 2002); Reserva Extrativista do Alto Juruá, Rio Amônia, Localidade Quietto (Whittaker & Oren, 1999); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80233, 80234); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004, MPEG 58388); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Guilherme *et al.*, 2003; Rasmussen *et al.*, 2005); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 58912, 58913, 58914); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60768); Floresta Estadual do Rio Gregório, próximo à ponte sobre o Rio Acuraua (Guilherme, 2007, MPEG 60769, 60770); Estrada Transacrea (AC-090) Km 60, margem esquerda (Guilherme, E., MPEG 61444, 61445, 61446); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61330, 61331); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 63567, 63568, 63569); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste e norte (Guilherme, E., MPEG 63570, 63646, 63647; Melo, 2015a; Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre, L. A. & Silva, G. T., MPEG 66994; Mestre *et al.*, 2010); Rio Jurupari, localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, localidades Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Município de Senador Guimard, Localidade Bonal (Guilherme, E. & Souza, G., AC 541, 557, 559); Município de Senador Guimard, BR 364, Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015); BR 317, margem esquerda, área adjacente à Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015).

Habitat

FOA com bambus/palmeiras. FOA/FOD com bambus, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Na Amazônia ocidental, da Colômbia até a Bolívia. No Brasil, já foi registrada pontualmente nos estados do Pará, Mato Grosso, Rondônia e Acre (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 58923, 58924); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63642, 63643); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63397); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63800); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, localidades Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD submontana, área aberta com pastagem ou cultivares.

Distribuição Geográfica

Do Arizona (EUA) ao norte da Argentina (Tucuman). Ocorre em quase todo o Brasil (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas 13 subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *M. t. tuberculifer* (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

irré – *Myiarchus swainsoni* Cabanis & Heine, 1859
Swainson's Flycatcher



Sílvia Faustino Linhares



maria-cavaleira – *Myiarchus ferox* (Gmelin, 1789)
Short-crested Flycatcher



Celso B. Almeida



Registros

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35784); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Das Guianas até a Argentina e em quase todo o Brasil (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas quatro subespécies. A forma que ocorre no Acre é, provavelmente, a *M. s. pelzelni* (Pinto & Camargo, 1954; Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Migrante austral.

Registros

Arredores da cidade de Rio Branco (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35781); arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35782, 35783); Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 25524, 25525); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Floresta Estadual do Antimary, Localidade Limoeiro (Guilherme, E., MPEG 60887); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61352); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64392, 64551); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 64570); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64464); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63798, 63799); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão (Dantas, n. p. - 2010); Município de Senador Guimard, Localidade Bonal (Guilherme, E. & Souza, G., AC 551); Cruzeiro do Sul, Estrada Canela Fina (Guilherme, E. AC 407); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, área aberta com pastagem ou cultivares, ambientes urbanos.

Distribuição Geográfica

Das Guianas até a Argentina e em quase todo o Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *M. f. ferox* (Pinto & Camargo, 1954; Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado – *Myiarchus tyrannulus* (Statius Muller, 1776)

Brown-crested Flycatcher



Anselmo D'Alfonseca

**Registros**

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35780); arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35779); Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 25550); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); *Campus* da Universidade Federal do Acre (Guilherme, E. 2015 [Wikiaves - WA1730798]).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, FOD aluvial, FOD.

Distribuição Geográfica

Do sul dos Estados Unidos (Califórnia) até a Argentina. Ocorre em quase todo o Brasil (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas sete subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *M. t. tyrannulus* (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Populações residentes e populações migratórias austrais.

gritador – *Sirystes sibilator* (Vieillot, 1818)

Sirystes



Anselmo D'Alfonseca

**Registros**

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35763); Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 26485, 26486); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Parque Nacional da Serra do Divisor, 106 Km a sudoeste de Cruzeiro do Sul (Aleixo, A. & Polleto, F, MPEG 58026); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão e localidades Távora, Belém, Manaus e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Município de Senador Guimard, Localidade Bonal (Guilherme, 2012 [Wikiaves - WA730793]); Município de Brasília (Melo, M. A., 2013 [Wikiaves - WA1005766]); Reserva Humaitá – Ufac (Melo, T. N., 2014 [Wikiaves - WA1374005]).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Do Panamá até a Argentina e em quase todas as regiões do Brasil (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas cinco subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *S. s. albocinereus* (Pinto & Camargo, 1954; Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2004).


Status

Residente.

vissia – *Rhytipterna simplex* (Lichtenstein, 1823)
Grayish Mourner



Robson Czaban



maria-ferrugem – *Casiornis rufus* (Vieillot, 1816)
Rufous Casiornis



Marco Guedes




Registros
Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35728); arredores da cidade de Manoel Urbano (Silva, G. P., MPEG 40618); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 58933, 58934); Floresta Estadual do Antimary, Ramal Uirapuru (Guilherme, E., MPEG 60774); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63648, 63649); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre <i>et al.</i> , 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e Localidade Novo Oriente (Aleixo <i>et al.</i> , n. p. - 2010).
Habitat
FOA com palmeiras/bambus, campinarana.
Distribuição Geográfica
Em toda a Amazônia, das Guianas até a Bolívia e também no extremo leste do Brasil (Mata Atlântica) (Hoyo <i>et al.</i> , 2004).
Taxonomia
São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a <i>R. s. frederici</i> (Pinto & Camargo, 1954; Hoyo <i>et al.</i> , 2004).
Status
Residente.

Registros
Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63645).
Habitat
Borda de FOA aluvial.
Distribuição Geográfica
Da Bolívia até a Argentina. No Brasil, ocorre nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e parte da Região Sul (Paraná). Algumas populações migram para o norte durante o inverno austral (Sick, 1997; Hoyo <i>et al.</i> , 2004).
Taxonomia
Espécie monotípica (Hoyo <i>et al.</i> , 2004).
Status
Migrante austral.

bem-te-vi – *Pitangus sulphuratus* (Linnaeus, 1766)
Great Kiskadee

Tancredo Maia Filho



Peru

Bolívia

Registros

Arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35778); Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35775, 35776, 35777); Município de Capixaba, Fazenda Campo Lindo (Hidasi, J., CPJH 1479); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Parque Zoobotânico e *Campus* da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; AC 639, 754, 761); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60781, 60782); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão e Localidade Távora (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme, & Dantas, 2011, MPEG 63404); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64394); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63803); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Município de Senador Guimard, BR 364, Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015); Município de Plácido de Castro, BR-364, Ramal do 45 (Marques, 2015).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, área aberta com cultivos ou pastagens, ambientes urbanos.

Distribuição Geográfica

Do Sul dos Estados Unidos até a Argentina. Ocorre em todo o Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas 10 subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *P. s. maximiliani* (Pinto & Camargo, 1954; Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

bentevizinho-do-brejo – *Philohydor lictor* (Lichtenstein, 1823)
Lesser Kiskadee

Edson Guilherme



Peru

Bolívia

**Registros**

Arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35774); Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35773); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., obs. pess.); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010). *Campus* e Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, E., 2014 [Wikiaves - WA1355099]).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD, área aberta com cultivos ou pastagens (sempre à beira d'água).

Distribuição Geográfica

Do Panamá até a Bolívia (Amazônia) e na Região Sudeste do Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *P. l. lictor* (Pinto & Camargo, 1954; Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

Comentários

Em Pinto & Camargo (1954) este táxon foi nominado como *Pitangus lictor*.

suiriri-cavaleiro – *Machetornis rixosa* (Vieillot, 1819)
Cattle Tyrant *



Celso B. Almeida



Registros
Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002, Suplemento).
Habitat
Borda de FOA com palmeiras, área aberta com pastagem (provável).
Distribuição Geográfica
Do Panamá ao Uruguai. Ocorre em quase todo o Brasil, porém, com raros registros na Região Norte do país (Hoyo <i>et al.</i> , 2004).
Taxonomia
Ver Comentários.
Status
Ver Comentários.
Comentários
(*) Este registro precisa de confirmação (Guilherme, 2009; 2012).

bem-te-vi-de-barriga-sulfúrea – *Myiodynastes luteiventris* Sclater, 1859
Sulphur-bellied Flycatcher



Lawrence Thompson




Registros
Rio Juruá, margem direita, localidade Porongaba (Whittaker & Oren, 1999); Reserva extrativista do Alto Juruá, Rio Tejo (Whittaker & Oren, 1999; Whittaker <i>et al.</i> , 2002); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004).
Habitat
Borda de FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial.
Distribuição Geográfica
Na América Central e no noroeste da América do Sul, do México até a Bolívia (Hoyo <i>et al.</i> , 2004).
Taxonomia
Espécie monotípica (Hoyo <i>et al.</i> , 2004).
Status
Migrante intratropical.
Comentários
Esta espécie é uma visitante setentrional no estado do Acre (Sick, 1997; Hoyo <i>et al.</i> , 2004).

bem-te-vi-rajado – *Myiodynastes maculatus* (Statius Muller, 1776)
Streaked Flycatcher



Edson Guilherme



suiriri-de-garganta-rajada – *Tyrannopsis sulphurea* (Spix, 1825)
Sulphury Flycatcher



Edson Guilherme



Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001, AC 020); arredores da cidade de Assis Brasil (Guilherme, 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005, Guilherme, E., MPEG 60028); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60886); Estrada Transacrea (AC-090) Km 60, margem direita (Guilherme, E., MPEG 61442); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63650); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64473, 64466); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Município de Jordão, localidades Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Cruzeiro do Sul, Estrada Canela Fina (Guilherme, E. AC 405); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, área aberta com pastagem ou cultivares, área urbana.

Distribuição Geográfica

Do México até a Argentina e Uruguai. Ocorre em todo o Brasil (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas sete subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *M. m. solitarius* (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002, Suplemento); Rio Branco, *Campus* da Universidade Federal do Acre (Guilherme, E., AC 0126); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Rio Jurupari, Localidade Humaitá (Aleixo & Guilherme, MPEG 70038); Rio Jurupari, Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras, FOD submontana, área aberta com pastagem ou cultivares, ambientes urbanos.

Distribuição Geográfica

Norte da América do Sul (Amazônia) (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

neinei – *Megarynchus pitangua* (Linnaeus, 1766)
Boat-billed Flycatcher



Leninha Caldas



bentevizinho-de-asa-ferrugínea – *Myiozetetes cayanensis* (Linnaeus, 1766)
Rusty-margined Flycatcher



Edson Guilherme



Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 26504, 26506); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); arredores da cidade de Assis Brasil (Guilherme, 2004, AC 0080); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Estrada Transacrea (AC-090) Km 60, margem esquerda (Guilherme, E., MPEG 61451); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 62132); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011; MPEG 63387); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., obs. pess.); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., obs. pess.); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, Localidade Manaus (Dantas, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Cruzeiro do Sul, BR-307, Estrada da Variante (Pinheiro & Turci, 2013); Rio Branco, Bairro Joafra (Doação IBAMA/CETAS; AC 796).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, área aberta com pastagem ou cultivares, ambientes urbanos.

Distribuição Geográfica

Do México até a Argentina e em quase todo o Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas seis subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *M. p. pitangua* (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Parque Zoobotânico e Campus da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; MPEG 60777; AC 0237, 0268, 0727, 0781); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61354); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64395); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, área aberta com cultivares ou pastagem, ambientes urbanos.

Distribuição Geográfica

Do Panamá até a Bolívia. Ocorre do norte ao sudeste do Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas quatro subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *M. c. cayanensis* (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

bentevizinho-de-penacho-vermelho – *Myiozetetes similis* (Spix, 1825)

Social Flycatcher




Tomaz Melo

**bem-te-vi-de-cabeça-cinza** – *Myiozetetes granadensis* Lawrence, 1862

Gray-capped Flycatcher



Ricardo Plácido

**Registros**

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 26551); arredores da cidade de Rio Branco, Seringal Nova Empresa (Hidasi, J., CPJH 3770); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; AC 0032, 0258, 0269, 0330, 0331, 0379; MPEG 60778); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Estrada Transacreana (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61353); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 58922); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 63651); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64552, 64553); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, MPEG 63801); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Cruzeiro do Sul, Estrada Canela Fina (Guilherme, E. AC 360, 438); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Rio Branco, Bairro Jardim de Alah (Guilherme, E., AC 0790).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, área aberta com cultivos ou pastagem, ambientes urbanos.

Distribuição Geográfica

Do México ao norte da Argentina. Ocorre em quase todo o Brasil (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas sete subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *M. s. similis* (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A., MPEG 48392); Município de Marechal Thaumaturgo, Foz do Rio Tejo (Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 52199); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2008, MPEG 59879); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62123); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Município de Rio Branco, Riozinho do Rola, Ramal do Noca (Plácido, R. A. 2015 [Wikiaves - WA1766227]).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras, FOA aluvial, campinarana.

Distribuição Geográfica

De Honduras até a Bolívia (no noroeste da América do Sul) (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *M. g. obscurior* (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

bem-te-vi-barulhento – *Myiozetetes luteiventris* (Sclater, 1858)

Dusky-chested Flycatcher



Emerson Kaseker

**Registros**

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35770, 35771); Rio Juruá, Seringal Oriente (MPEG 14247); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Fazenda Experimental Catuaba (Kaseker, E. P., 2013 [Wikiaves - WA978717]).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD submontana, área aberta com cultivos ou pastagens.

Distribuição Geográfica

Norte da América do Sul, das Guianas até a Bolívia (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *M. l. luteiventris* (Pinto & Camargo, 1954; Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

suiriri-de-garganta-branca – *Tyrannus albogularis* Burmeister, 1856

White-throated Kingbird



Celso B. Almeida

**Registros**

Rio Branco, *Campus* da Universidade Federal do Acre (Guilherme, E., AC 0142; MPEG 61483); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, área aberta com pastagem ou cultivos, ambientes urbanos.

Distribuição Geográfica

Das Guianas até a Bolívia. Ocorre nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Migrante austral.

suiriri – *Tyrannus melancholicus* Vieillot, 1819
Tropical Kingbird



Edson Guilherme



tesourinha – *Tyrannus savana* Vieillot, 1808
Fork-tailed Flycatcher



Roseanne Almeida



Registros

Arredores da cidade de Rio Branco (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35764); Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35765, 35766); arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35767, 35768, 35769); Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 26446, 26448, 26449, 26450); Rio Juruá, localidade Esperança (Novaes, 1957, MPEG 26447); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52639); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; AC 021, 0771; MPEG 60779); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Estrada Transacrea (AC-090) Km 60, margem esquerda (Guilherme, E., MPEG 61449, 61450); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63405); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64393); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64467); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63802); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, localidades Távora, Veneza e Pará (Dantas, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Cruzeiro do Sul, Estrada Canela Fina (Guilherme, E. AC 334); Cruzeiro do Sul, BR-307, Estrada da Variante (Pinheiro & Turci, 2013).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, campinarana, área aberta com pastagem ou cultivares, ambientes urbanos.

Distribuição Geográfica

Do Arizona (EUA) até a Argentina e em todo o Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *T. m. melancholicus* (Pinto & Camargo, 1954; Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

Registros

Arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35755, 35756, 35757, 35758, 35759, 35760, 35761, 35762); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Jurupari, Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, área aberta com pastagem ou cultivares, ambientes urbanos.

Distribuição Geográfica

Do México até a Argentina e Uruguai. Ocorre em todo o Brasil (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas quatro subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *T. s. savana* (Pinto & Camargo, 1954; Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Migrante austral.


Comentários

Em Pinto & Camargo (1954) este táxon foi nominado como *Muscivora tyrannus tyrannus*.

suiriri-valente – *Tyrannus tyrannus* (Linnaeus, 1758)
Eastern Kingbird



Edson Guilherme



Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá, Rio Tejo (Whittaker & Oren, 1999; Whittaker *et al.*, 2002); Rio Juruá, a 10 Km da cidade de Porto Valter (Whittaker & Oren, 1999); arredores da cidade de Assis Brasil (Guilherme, 2004); Município de Marechal Thaumaturgo, Comunidade Tabocal, Baixo Rio Paratari (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Município de Assis Brasil, Estrada da Pedreira, Localidade Museu (Aleixo, A., Guilherme, E. & Whittaker, A., MPEG 70050, 70051); *Campus* e Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, E., 2014 [Wikiaves - WA1500596]).

Habitat

Dossel e borda de FOA com palmeiras, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Do Canadá ao norte da Argentina. Trata-se de uma espécie visitante setentrional na América do Sul (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Migrante neártica.

peitica-de-chapéu-preto – *Griseotyrannus aurantioatrocristatus* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)
Crowned Slaty Flycatcher



Robson Czaban



Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80225); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64465); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); *Campus* e Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, E., 2014 [Wikiaves - WA1344700]).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, FOD, FOD submontana, área aberta com pastagem ou cultivares, ambientes urbanos.

Distribuição Geográfica

Da Venezuela até a Argentina e Uruguai. Ocorre em quase todas as regiões do Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *G. a. aurantioatrocristatus* (Hoyo *et al.*, 2004).


Status

Migrante austral.

peitica – *Empidonomus varius* (Vieillot, 1818)
Variegated Flycatcher



Tancredo Maia Filho



Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Cruzeiro do Sul, Estrada Canela Fina (Guilherme, E. AC 374, 406); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); *Campus* da Ufac (Guilherme, E. 2015 [Wikiaves - WA1672039]).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus.

Distribuição Geográfica

Das Guianas até a Argentina e em todo o Brasil (Hoyo *et al.*, 2004).


Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *E. v. varius* (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Migrante austral.

bem-te-vi-pequeno – *Conopias trivirgatus* (Wied, 1831)
Three-striped Flycatcher



Anselmo D'Affonseca



Registros

Juruá, Cachoeira do Rio Bajé (Whittaker & Oren, 1999); Rio Juruá, Localidade Tapuara (Whittaker & Oren, 1999); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Ocorre localmente no norte da América do Sul (Amazônia) e no Sudeste do Brasil, até o Paraguai e Argentina (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *C. t. berlepschi* (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

Tyrannidae – Sub-Família Tyranninae
bem-te-vi-da-copa – *Conopias parvus* (Pelzeln, 1868)
 Yellow-throated Flycatcher



Anselmo D'Alfonseca



Registros

Rio Juruá, localidade Paraíso Dois (Whittaker & Oren, 1999); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Município de Cruzeiro do Sul, BR 307, Ramal dos Caroba (Guilherme, E., e equipe, MPEG 74505).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

Pontual, em todo o norte da América do Sul (Amazônia) (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2004).


Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

Tyrannidae – Sub-Família Tyranninae
viuvinha – *Colonia colonus* (Vieillot, 1818)
 Long-tailed Tyrant



Emerson Kaseker



Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011); Município de Mâncio Lima (Biancalana, R. N., 2014 [Wikiaves - WA1393770]).

Habitat

Margens de rios, igarapés, açudes e lagos.

Distribuição Geográfica

Ocorre de Honduras (América Central) ao norte da Argentina (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas cinco subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *C. c. niveiceps* (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

filipe – *Myiophobus fasciatus* (Statius Muller, 1776)
Bran-colored Flycatcher



Tancredo Maia Filho



Registros

Arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35785); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Floresta Estadual do Rio Gregório, próximo à ponte sobre o Rio Acuraua (Guilherme, 2007, MPEG 60771); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63394); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão (Dantas, n. p. - 2010). Município de Assis Brasil, Estrada da Pedreira, Localidade Museu (Guilherme, E., MPEG 70920; 70921; 70922; 70923; 70924).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras, FOD submontana, área aberta com cultivares ou pastagens.

Distribuição Geográfica

Da Costa Rica até a Argentina e em quase todo o Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas sete subespécies. A forma que ocorre no Acre é, de acordo com a distribuição geográfica, a *M. f. auriceps* (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Migrante austral.

guaracava-modesta – *Sublegatus modestus* (Wied, 1831)
Southern Scrub-Flycatcher



Tancredo Maia Filho



Registros

Arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35790); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão (Dantas, n. p. - 2010).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD submontana, área aberta com cultivares ou pastagens.

Distribuição Geográfica

Da Argentina ao Peru. Ocorre em quase todo o Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *S. m. modestus* (Pinto & Camargo, 1954; Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Migrante austral.

sertanejo-escuro – *Sublegatus obscurior* Todd, 1920
Amazonian Scrub-Flycatcher



Silvia Faustino Linhares



Registros

Campus da Universidade Federal do Acre (Guilherme, E. 2015 [Wikiaves - WA1750174]).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras, área aberta com cultivares ou pastagens, ambientes urbanos.

Distribuição Geográfica

Ocorre em todo o Bioma Amazônia. Desde as Guianas até a Bolívia (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2004).

Status


Residente.

príncipe – *Pyrocephalus rubinus* (Boddaert, 1783)
Vermilion Flycatcher

Edson Guilherme



Macho



Registros

Arredores da cidade de Rio Branco (Pinto & Camargo, 1954 MZUSP 35746); arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954 MZUSP 35747, 35748); Rio Juruá, Localidade Apertada Hora, próxima à Foz do Rio Grajaú (Novaes, 1957, MPEG 25982); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80232); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001, AC 423); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Rio Branco, Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Floresta Estadual do Rio Gregório, próximo à ponte sobre o Rio Acuraua (Guilherme, 2007, MPEG 60882); Estrada Transacreana (AC-090) Km 60, margem direita (Guilherme, E., MPEG 61473); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64555); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 58918); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão (Dantas, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras, borda de FOA aluvial, FOD, FOD submontana, área aberta com pastagens ou cultivares, ambientes urbanos.

Distribuição Geográfica

Do sul dos Estados Unidos (Califórnia) até a Argentina (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas 12 subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *P. r. rubinus* (Pinto & Camargo, 1954; Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Migrante austral.

lavadeira-de-cara-branca – *Fluvicola albiventer* (Spix, 1825)

Black-backed Water-Tyrant



Anselmo D'Alfonseca



freirinha – *Arundinicola leucocephala* (Linnaeus, 1764)

White-headed Marsh Tyrant *



Silvia Faustino Linhares



Registros
Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35745); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002).
Habitat
Margens de rios, igarapés, açudes e lagos, borda de FOA aluvial.
Distribuição Geográfica
Do Sudeste do Peru até a Argentina. Ocorre em quase todo o Brasil (Hoyo <i>et al.</i> , 2004).
Taxonomia
Espécie monotípica (Hoyo <i>et al.</i> , 2004).
Status
Migrante austral.
Comentários
Em Pinto & Camargo (1954) este táxon foi nominado como <i>Fluvicola pica albiventer</i> .

Registros
Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002, Suplemento).
Habitat
Margens de rios, igarapés, açudes e lagos.
Distribuição Geográfica
Em quase toda a América do Sul cisandina, das Guianas ao norte da Argentina e em quase todo o Brasil (Hoyo <i>et al.</i> , 2004).
Taxonomia
Espécie monotípica (Hoyo <i>et al.</i> , 2004).
Status
Residente.
Comentários
(*) Registro a ser confirmado. (Guilherme, 2009; 2012).

maria-da-praia – *Ochthornis littoralis* (Pelzeln, 1868)
Drab Water-Tyrant



Tancredo Maia Filho



guaracavuçu – *Cnemotriccus fuscatus* (Wied, 1831)
Fuscous Flycatcher



Emerson Kaseker



Registros

Arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954 MZUSP 35749, 35750, 35751, 35752, 35753, 35754); Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 26009, 26010, 26012); Rio Juruá, Localidade Tabocal (Novaes, 1957, MPEG 26011); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52656); Rio Juruá, arredores da cidade de Cruzeiro do Sul (Whittaker, A., MPEG 48425); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80228, 80229, 80230); arredores da cidade de Assis Brasil (Guilherme, 2004); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 58917); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., obs. pess); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Rio Branco, *Campus* da Ufac (Guilherme, E., AC 267); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013, AC 718).

Habitat

FOA aluvial, margem de rios e igarapés.

Distribuição Geográfica

Das Guianas até a Bolívia (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

Registros

C. f. duidae - Alto Rio Moa, margem esquerda, Localidade Morro Queimado, Serra da Jaquirana (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52797); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62119, 62175); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Município de Mâncio Lima, campinarana (Guilherme, E., Melo, T. N. & Portela, R., AC 709).

C. f. cf. beniensis – Rio Branco, Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60767; Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 63562, 63563, 63564, 63565, 63566); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Município de Assis Brasil, Estrada da Pedreira, Localidade Museu (Guilherme, E., MPEG 70917, 70918, 70919); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, E., anilhado); ARIE Japiim/Pentecoste, várzea (Guilherme, E., Melo, T. N. & Portela, R., AC 706); BR 317, margem esquerda, área adjacente à Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015); Município de Rio Branco, Estrada da Piçarreira (Marques, 2015).

Habitat

FOA com bambus/palmeiras, FOA aluvial com bambus e cipós, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

Das Guianas até a Argentina e em todo o Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas sete subespécies (Hoyo *et al.*, 2004). Duas formas ocorrem no Acre: *C. f. duidae* e *C. f. cf. beniensis* (Guilherme, 2012).

Status

Populações residentes e populações migratórias regionais.

enferrujado – *Lathrotriccus euleri* (Cabanis, 1868)
Euler's Flycatcher



Celso B. Almeida



papa-moscas-de-alder – *Empidonax alnorum* Brewster, 1895
Alder Flycatcher



Geovane Gomes



Registros

Rio Juruá, arredores da cidade de Cruzeiro do Sul (Novaes, 1957, MPEG 25577); Rio Juruá, Localidade Nossa Senhora Aparecida (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52919); Rio Ouro Preto, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52932); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52644); Rio Juruá, margem esquerda, localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48395, 48396); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A., MPEG 48398); Rio Paratari, margem sul, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004, MPEG 58390); Floresta Estadual do Mogno, BR-364, a 6 Km da ponte sobre o Rio Tauari (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60766); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 58911); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61333); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Município de Jordão, localidades Pará, Veneza e Távora (Dantas, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com bambus/palmeiras, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Da Venezuela até a Argentina e em quase todo o Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas cinco subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *E. e. bolivianus* (Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Populações residentes e populações migratórias austrais.

Comentários

Em Novaes (1957), este táxon foi nominado como *Empidonax lawrencei bolivianus*. Em seu artigo, F. Novaes cita a localidade do espécime coletado por ele como sendo proveniente do Seringal Oriente. Contudo, ao revisarmos a etiqueta do espécime MPEG 25577, verifiquei que, nela, a localidade de coleta deste indivíduo figura como sendo em Cruzeiro do Sul. Como tive acesso ao caderno de campo de Novaes, foi possível confirmar que o espécime em questão provém mesmo dos arredores da cidade de Cruzeiro do Sul.

Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Rio Tejo, REAJ (Whittaker & Oren, 1999; Whittaker *et al.*, 2002); BR-364, Seringal Sardinha (Guilherme, E., MPEG 61482); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63796); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Parque Estadual Chandless (Guilherme, E., AC 0249); Município de Rio Branco, *Campus* da Ufac (Guilherme, E., AC 729); Município de Plácido de Castro, BR-364, Ramal do 45 (Marques, 2015); BR-364, Ramal Novo Horizonte, margem esquerda, sentido Plácido de Castro (Marques, 2015).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Do Alasca ao norte da Argentina (provável) (Hoyo *et al.*, 2004). Trata-se de uma espécie migrante neártica (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Migrante neártica.

Comentários

Em Whittaker *et al.* (2002) este táxon foi nominado como *E. traillii*.

piui-boreal – *Contopus cooperi* (Nuttall, 1831)
Olive-sided Flycatcher




Robson Czaban



piui-verdadeiro – *Contopus virens* (Linnaeus, 1766)
Eastern Wood-Pewee



Margi Moss



Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras.

Distribuição Geográfica

Do Alasca ao Sudeste do Brasil. Esta é uma espécie visitante setentrional na América do Sul (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Migrante neártica.

Registros

Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A., MPEG 48429); Igarapé Preto, afluente do Rio Juruá-mirim, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52926); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52200); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62118); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63795); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010, MPEG 70039); Rio Jurupari, localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); *Campus* da Universidade Federal do Acre (Guilherme, E. 2015 [Wikiaves - WA1514056]).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras.

Distribuição Geográfica

Ocorre no leste da América do Norte e no norte da América do Sul (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2004). Esta é uma espécie visitante neártica na América do Sul (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Migrante neártica.

Comentários

Whittaker *et al.* (2002), citam a presença de *Contopus nigrescens* para a região do Alto Juruá. No entanto, ao analisar o espécime no qual o registro foi baseado (MPEG 48429), percebi que ele pertence à espécie *C. virens*.

Tyrannidae – Sub-Família Tyranninae
papa-moscas-cinzentos – *Contopus cinereus* (Spix, 1825)
 Tropical Pewee



Emerson Kaseker



Registros
BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64508).
Habitat
Borda de FOA com palmeiras.
Distribuição Geográfica
Do México até a Argentina. Ocorre em quase todas as regiões do Brasil, porém com poucos registros para a Região Norte (Hoyo <i>et al.</i> , 2004).
Taxonomia
São reconhecidas oito subespécies. A forma que ocorre no Acre é, provavelmente, a <i>C. c. punensis</i> (Hoyo <i>et al.</i> , 2004).
Status
Migrante austral.

Tyrannidae – Sub-Família Tyranninae
gaúcha-d'água – *Muscisaxicola fluviatilis* Sclater & Salvin, 1866
 Little Ground-Tyrant




Claudia Komatsu



Registros
Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008).
Habitat
Borda de FOA aluvial.
Distribuição Geográfica
Noroeste da Amazônia (Colômbia, Peru, Equador, Brasil e Bolívia) (Hoyo <i>et al.</i> , 2004).
Taxonomia
Espécie monotípica (Hoyo <i>et al.</i> , 2004).
Status
Residente.

Viriconidae
pitiguari – *Cyclarhis gujanensis* (Gmelin, 1789)
 Rufous-browed Peppershrike



Registros

Arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35814, 35815); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão (Dantas, n. p. - 2010); Município de Plácido de Castro, BR-364, Ramal do 45 (Marques, 2015).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, ambientes urbanos.

Distribuição Geográfica

América Central, do México ao Panamá e em quase toda a América do Sul, das Guianas até a Argentina (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2010).


Taxonomia

Foram descritas 22 subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *C. g. gujanensis* (Pinto & Camargo, 1954; Hoyo *et al.*, 2010).

Status

Residente.

Viriconidae
assobiador-do-castanhal – *Vireolanius leucotis* (Swainson, 1838)
 Slaty-capped Shrike-Vireo



Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Parque Nacional da Serra do Divisor, 106 Km a sudoeste de Cruzeiro do Sul (Aleixo, A. & Polleto, F, MPEG 58029); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Jurupari, localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, localidades Pará, Manaus e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Em quase toda a Amazônia, das Guianas até a Bolívia (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2010).

Taxonomia

Foram descritas quatro subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *V. l. simplex* (Gyldenstolpe, 1951; Hoyo *et al.*, 2010).

Status

Residente.

juruviara – *Vireo chivi* (Vieillot, 1817)
Chivi Vireo



Celso B. Almeida



juruviara-verde-amarelada – *Vireo flavoviridis* (Cassin, 1851)
Yellow-green Vireo



Emerson T. Rodrigues



Registros

Arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35815, 35816); Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 36692); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60830); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63412); Cruzeiro do Sul, Estrada Canela Fina (Guilherme, E. AC 400, 402).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Em quase toda a América do Sul, das Guianas até a Argentina (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2010).

Taxonomia

Táxon tratado anteriormente como subespécie de *Vireo olivaceus* (Hoyo *et al.*, 2010).

Status

Migrante austral.

Nome anterior

Vireo olivaceus.

Registros

Rio Juruá, fóz do Igarapé São João (Whittaker & Oren, 1999); Rio Amônia, localidade Quieto (Whittaker & Oren, 1999); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, Whitney & Pacheco, 2001); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62172); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63820); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Município de Rio Branco, *Campus* da Ufac (Guilherme, E., AC 730); Município de Cruzeiro do Sul (Filho, J. D., 2014 [Wikiaves - WA1229098]).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

América Central, do México ao Panamá. Migra para o noroeste da América do Sul (Amazônia) durante o inverno setentrional (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Restall *et al.*, 2006; Hoyo *et al.*, 2010).

Taxonomia

Três subespécies migram da América Central para o norte da América do Sul (Restall *et al.*, 2006). Destas, duas podem estar presentes no Acre: *V. f. forreri* e *V. f. perplexus* (ver descrição em Restall *et al.*, 2006; Hoyo *et al.*, 2010).


Status

Migrante intratropical (vinda do norte).

vite-vite – *Hylophilus thoracicus* Temminck, 1822
Lemon-chested Greenlet



Ciro Albano



Registros

Arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35817); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOD.

Distribuição Geográfica

Das Guianas e Venezuela ao Alto Rio Solimões, incluindo o sudeste do Peru e o norte da Bolívia. Ocorre, também, no sudeste do Brasil, no Espírito Santo, em Minas e no Rio de Janeiro (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2010).

Taxonomia

Foram descritas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *H. t. griseiventris* (Pinto & Camargo, 1954; Hoyo *et al.*, 2010).

Status

Residente.

verdinho-da-várzea – *Hylophilus semicinereus* Sclater & Salvin, 1867
Gray-chested Greenlet



Anselmo D'Affonseca



Registros

Município de Cruzeiro do Sul, Rio Juruá (Pacheco, J. F. 1997 [Wikiaves - WA1272494]).

Habitat

FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Ocorre em quase todo o Bioma Amazônia, desde a Colômbia, Venezuela, Guianas, Brasil, até o nordeste da Bolívia.

Taxonomia

Foram descritas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *H. s. juruanus* (Gyldenstolpe, 1945b; Hoyo *et al.*, 2010).

Status


Residente.

vite-vite-de-barriga-amarela – *Pachysylvia hypoxantha* Pelzeln, 1868

Dusky-capped Greenlet



Alexander Lees

**Registros**

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Município de Mâncio Lima, Campina (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, localidades Pará, Távora, Manaus e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010).

Habitat

FOA com bambus/palmeiras, FOA aluvial, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

Na Amazônia, do sul da Venezuela ao norte da Bolívia. No Brasil, ocorre da Foz do Rio Amazonas (margem sul) para o oeste, até os estados do Amazonas e Acre (Ridgely & Tudor, 1994; Hoyo *et al.*, 2010).

Taxonomia


Foram descritas seis subespécies. A forma que ocorre no leste do Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *H. b. ictericus* (Hoyo *et al.*, 2010).

Status


Residente.

vite-vite-uirapuru – *Tunchiornis ochraceiceps* (Sclater, 1860)

Tawny-crowned Greenlet



Robson Czaban

**Registros**

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 23796); Alto Rio Moa, margem direita, Igarapé Ramon, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52814, 52815); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48453, 48454); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A., MPEG 48452); Rio Tejo, a aproximadamente 5 Km da foz, REAJ (Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 52242, 52243); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52240, 52241, Whittaker *et al.*, 2002); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 59885, 59886); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal (Guilherme, E., MPEG 60052, 60053); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão e localidades Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Parque Estadual Chandless (Guilherme, E. obs. Pess.).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Na América Central, do México ao Panamá e no norte da América do Sul, das Guianas até a Bolívia (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2010).

Taxonomia

Foram descritas nove subespécies (Paynter, 1968). A forma que ocorre no Acre é a *H. a. ferrugineifrons* (Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2010).

Status

Residente.



Registros

Rio Juruá, arredores da cidade de Cruzeiro do Sul (Novaes, 1957, MPEG 23165); Rio Juruá, Localidade São Salvador, próxima à Foz do Rio Grajaú (Novaes, 1957, MPEG 23164); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52231, Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); BR-364 a 40 Km da ponte sobre o Rio Liberdade, margem direita (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60900, 60901); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62171); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão e localidade Manaus (Dantas, n. p. - 2010); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63824); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica


No oeste da Amazônia, do oeste da Guiana Inglesa ao norte da Bolívia (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Hoyo *et al.* 2009).

Taxonomia

Foram descritas duas subespécies (Restall *et al.*, 2006). A forma que ocorre no Acre é a *C. v. violaceus* (Novaes, 1957; Hoyo *et al.* 2009).

Status

Residente.



Registros

Rio Juruá, Município de Cruzeiro do Sul, Localidade Moura (Whittaker & Oren, 1999); Rio Juruá, margem direita, Localidade Caipora (Whittaker & Oren, 1999); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010).

Habitat

Margens de rios, lagos e igarapés, borda de FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Sul da América Central (Costa Rica e Panamá) e em quase toda a América do Sul (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2004)

Status

Migrante austral.


Comentários

Em Whittaker & Oren (1999), este táxon foi nominado como *Notiochelidon cyanoleuca*.

peitoril – *Atticora fasciata* (Gmelin, 1789)
White-banded Swallow



Edson Guilherme



calcinha-branca – *Atticora tibialis* (Cassin, 1853)
White-thighed Swallow



Emerson Kaseker



Jovem

Registros

Arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35798, 35799, 35800, 35801, 35802, 35803); Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 24465, 24466); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52672, 52673); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80238); Parque Zoobotânico e *Campus* da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; AC 416); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Floresta Estadual do Mogno, BR-364, a 6 Km da ponte sobre o Rio Tauari (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60828); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Floresta Estadual do Antimary, Localidade Limoeiro (Guilherme, E., MPEG 60827); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63411); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

Margens de rios, lagos e igarapés, borda de FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Em toda a Amazônia, das Guianas até a Bolívia (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

Registros

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35795); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997).

Habitat

Borda de FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Sul da América Central (Panamá) e oeste da América do Sul (Amazônia), da Colômbia até a Bolívia. Ocorre, também, no extremo leste do Brasil, da Bahia até São Paulo (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *A. t. griseiventris* (Pinto & Camargo, 1954; Hoyo *et al.*, 2004).


Status

Residente.


Comentários

Nos registros (op. cit.) este táxon foi nominado como *Neochelidon tibialis*.

andorinha-serradora – *Stelgidopteryx ruficollis* (Vieillot, 1817)
Southern Rough-winged Swallow



Edson Guilherme



Registros

Arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35796, 35797); Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 24457, 24458); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52670, 52671); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80237); Parque Zoológico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; AC 0328, 0417, 0642, 0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60823, 60824, 60880); Floresta Estadual do Antimary, Localidade Limoeiro (Guilherme, E., MPEG 60825); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63658); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64416, 64399); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, Localidade Manaus (Dantas, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Município de Plácido de Castro, BR-364, Ramal do 45 (Marques, 2015); Município de Porto Acre, mata ripária adjacente à Reserva Humaitá, setor norte (Marques, 2015).

Habitat

Margens de rios lagos e igarapés, área aberta, próxima a corpos d'água, ambientes urbanos.

Distribuição Geográfica

Sul da América Central (Costa Rica e Panamá) e em quase toda a América do Sul. Ocorre em todo o Brasil (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas quatro subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *S. r. ruficollis* (Pinto & Camargo, 1954; Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

andorinha-do-campo – *Progne tapera* (Vieillot, 1817)
Brown-chested Martin



Edson Guilherme



Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 24439); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Parque Zoológico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 58941); Floresta Estadual do Rio Gregório, próximo à ponte sobre o Rio Acuraua (Guilherme, 2007, MPEG 60829, 60881); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 62173, 62174); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63407); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63408, 63409); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64525); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

Áreas abertas, próximas a corpos d'água, margens de rios lagos e igarapés.

Distribuição Geográfica

Do Panamá até a Argentina e em quase todo o Brasil (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *P. t. tapera* (Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

Comentários

Em Novaes (1957), este táxon foi nominado como *Phaeoprogne t. tapera*.

andorinha-azul – *Progne subis* (Linnaeus, 1758)
Purple Martin



Macho

Robson Czaban



andorinha-doméstica-grande – *Progne chalybea* (Gmelin, 1789)
Gray-breasted Martin



Leninha Caldas



Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Município de Cruzeiro do Sul (Rodrigues, E. T., 2014 [Wikiaves - WA1505333]).

Habitat

Borda de FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

América do Norte e norte da América Central, do Canadá ao México. Esta espécie migra para a América do Sul durante o inverno setentrional (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. As três formas migram para a América do Sul durante o inverno setentrional (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Migrante neártica.

Registros

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35794); Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; AC 0778); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

Área aberta, próxima a corpos d'água, ambientes urbanos, borda de FOA com palmeiras.

Distribuição Geográfica

Do México até a Argentina e Uruguai. Ocorre em todo o Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *P. c. chalybea* (Pinto & Camargo, 1954; Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente.

andorinha-do-sul – *Progne elegans* Baird, 1865
Southern Martin



Margi Moss



andorinha-do-rio – *Tachycineta albiventer* (Boddaert, 1783)
White-winged Swallow



Robson Czaban



Registros
Cruzeiro do Sul (Rodrigues, E. T., 2014 [Wikiaves - WA1292898]).
Habitat
Área aberta, ambientes urbanos.
Distribuição Geográfica
Sul da América do Sul, Argentina, Paraguai e Bolívia. Migra para a Amazônia durante o período pós-reprodutivo (Hoyo <i>et al.</i> , 2004).
Taxonomia
Espécie monotípica (Hoyo <i>et al.</i> , 2004).
Status
Migrante austral.

Registros
Arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35805); Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 24471, 24472, 24473); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney <i>et al.</i> , n. p. - 1997); Parque Zoológico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen <i>et al.</i> , 2005); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Estrada Transacriana (AC-090) Km 60, margem esquerda e direita (Guilherme, E., MPEG 61459, 61458); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre <i>et al.</i> , 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari (Aleixo <i>et al.</i> , n. p. - 2010); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63410); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme <i>et al.</i> , n. p. - 2013).
Habitat
Margens de rios, lagos e igarapés.
Distribuição Geográfica
Das Guianas ao norte da Argentina. Ocorre em quase todo o Brasil (Hoyo <i>et al.</i> , 2004).
Taxonomia
Espécie monotípica (Hoyo <i>et al.</i> , 2004).
Status
Residente.
Comentários
Em Pinto & Camargo (1954) e Novaes (1957), este táxon foi nominado como <i>Iridoprocne albiventer</i> .

andorinha-do-barranco – *Riparia riparia* (Linnaeus, 1758)

Bank Swallow

**Registros**

Rio Juruá, margem direita, Localidade Caipora (Whittaker & Oren, 1999); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004).

Habitat

Borda de FOA aluvial, áreas abertas, nas proximidades de rios e lagos.

Distribuição Geográfica

Esta espécie é residente na América do Norte, Europa e Ásia. As populações da América do Norte migram para a América Central e a América do Sul durante o inverno setentrional (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia

São reconhecidas cinco subespécies. A forma que migra para América do Sul é a *R. r. riparia* (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Migrante neártica.

andorinha-de-bando – *Hirundo rustica* Linnaeus, 1758

Barn Swallow

**Registros**

Arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35804); Rio Juruá, margem direita, Localidade Caipora (Whittaker & Oren, 1999); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010.)

Habitat

Margens de rios, lagos e igarapés.

Distribuição Geográfica

Esta espécie é residente na América do Norte, Europa, norte da África e Ásia. As populações da América do Norte migram para a América Central e América do Sul durante o inverno setentrional (Hoyo *et al.*, 2004).

Taxonomia


São reconhecidas oito subespécies. A forma registrada no Acre foi a *H. r. erythrogaster* (Pinto & Camargo, 1954; Hoyo *et al.*, 2004).

Status


Migrante neártica.

uirapuru-veado – *Microcerculus marginatus* (Sclater, 1855)

Scaly-breasted Wren



Tomaz Melo

**Registros**

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 23757, 23758, 23759); arredores da cidade de Manoel Urbano (Silva, G. P., MPEG 47939); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Rio Tejo, a aproximadamente 5 Km da foz, REAJ (Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 52236); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); BR-364, Seringal Sardinha (Guilherme, E., AC 0114); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 58942, 59887, 59888, 59889); Floresta Estadual do Antimary, Ramal Uirapuru (Guilherme, E., MPEG 60872); Município de Mâncio Lima, Estrada do Barão, Comunidade São Domingos (Guilherme, E., MPEG 62166); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63416, 63417); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64477); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, localidades Pará, Távora, Manaus e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Município de Mâncio Lima, Comunidade Santa Bárbara (Lemos, T. & Marques, E., AC 609); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rosa, R. D., 2013 [Wikiaves - WA1021213]); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

Da Costa Rica até a Bolívia. Ocorre em quase toda a Amazônia, exceto na margem norte do Baixo Rio Amazonas (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2005).

Taxonomia

São reconhecidas cinco subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *M. m. marginatus* (Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2005).

Status

Residente.

uirapuru-de-asa-branca – *Microcerculus bambla* (Boddaert, 1783)

Wing-banded Wren *



Robson Czaban

**Registros**

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002, Suplemento).

Habitat

FOA com palmeiras (provável).

Distribuição Geográfica

Margem norte do Baixo Rio Amazonas, do extremo leste da Venezuela até a Guiana Francesa e Amapá no Brasil. Ocorre pontualmente no extremo-oeste amazônico (Equador, Peru e oeste da Amazônia brasileira) (Hoyo *et al.*, 2005).

Taxonomia

Ver Comentários.

Status

Ver Comentários.

Comentários

(*) Este registro precisa de confirmação (Guilherme, 2009; 2012).


corruíra – *Troglodytes musculus* Naumann, 1823
Southern House Wren




Emerson Kaseker



catatau – *Campylorhynchus turdinus* (Wied, 1831)
Thrush-like Wren



Tomaz Melo



Registros

Arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35808); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Parque Zoobotânico e *Campus* da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; AC 0183, 0663, 0673, 0780); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Estrada Transacrea (AC-090) Km 60, margem esquerda (Guilherme, E., MPEG 61460); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 63598); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão e Localidade Manaus (Dantas, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, borda de FOA aluvial, FOD, FOD submontana, área aberta com cultivares ou pastagens, ambientes urbanos.

Distribuição Geográfica

Do sul do México até a Argentina (Hoyo *et al.*, 2005).

Taxonomia

São reconhecidas 25 subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *T. m. clarus* (Pinto & Camargo, 1954; Hoyo *et al.*, 2005).

Status

Residente.

Nome anterior

Troglodytes aedon.

Comentários

Espécie de canto facilmente reconhecível. É encontrada em todo o estado do Acre, principalmente em ambientes urbanos. Em Guilherme (2001) e Whittaker *et al.* (2002), este táxon foi nominado como *T. aedon*.

Registros

Arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35806, 35807); arredores da cidade de Rio Branco, Seringal Nova Empresa (Hidasi, J., CPJH 1565); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A., MPEG 48433); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61361, 61362); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., obs. pess.); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, localidades Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64524); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Distribuição disjunta, da Colômbia até a Argentina e no extremo leste do Brasil (Bahia e Espírito Santo) (Hoyo *et al.*, 2005).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *C. t. hypostictus* (Pinto & Camargo, 1954; Hoyo *et al.*, 2005).

Status

Residente.


Comentários

Em Pinto & Camargo (1954), este táxon foi nominado como *Heleodytes turdinus hypostictus*.

garrinchão-pai-avô – *Pheugopedius genibarbis* (Swainson, 1838)
Moustached Wren



Celso B. Almeida



Registros

Arredores da cidade de Rio Branco, Seringal Nova Empresa (Hidasi, J., LSUMZ 68113); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52674, 52675); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; AC 0154, 0657, 0666, 0776); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80240); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60864, 60865, 60866, 60867; Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); Rio Liberdade, margem direita, próximo à Foz do Igarapé Novena (Guilherme, 2007, MPEG 60868, 60869); Estrada Transacreana (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61363); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62169, 62170); Município de Mâncio Lima, Estrada do Barão, Comunidade São Domingos (Guilherme, E., MPEG 62167, 62168); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., 63596); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Rio Branco, Estrada da Piçarreira (Marques, E. & Lemos, T., AC 671); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Reserva Humaitá – Ufac, setor norte (Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); Município de Senador Guiomard, BR 364, Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015); BR 317, margem esquerda, área adjacente à Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015); Município de Rio Branco, Estrada da Piçarreira (Marques, 2015); Município de Plácido de Castro, BR-364, Ramal do 45 (Marques, 2015); Município de Porto Acre, mata ripária adjacente à Reserva Humaitá, setor norte (Marques, 2015).

garrinchão-pai-avô – *Pheugopedius genibarbis* (Swainson, 1838)
Moustached Wren


Habitat
Borda de FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD.
Distribuição Geográfica
Margem sul do Rio Solimões/ Amazonas. Ocorre do sudeste do Peru em direção ao leste da América do Sul, até o estado do Espírito Santo no Brasil (Hoyo <i>et al.</i> , 2005).
Taxonomia
São reconhecidas quatro subespécies. A forma que ocorre no Acre é a <i>P. g. juruanus</i> (Hoyo <i>et al.</i> , 2005).
Status
Residente.
Nome anterior
<i>Thryothorus genibarbis</i> .

garrinchão-de-barriga-vermelha – *Cantorchilus leucotis* (Lafresnaye, 1845)

Buff-breasted Wren



Anselmo D'Alfonseca

**garrincha-cinza** – *Cantorchilus griseus* (Todd, 1925)

Gray Wren *

**Registros**

Rio Juruá, arredores da cidade de Cruzeiro do Sul (Novaes, 1957, 1958, MPEG 23730); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80241, 80242); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004, MPEG 58391); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, E., AC 0165); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 63592, 63593, 63594, 63595); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão (Dantas, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Município de Rio Branco, Estrada da Piçarreira (Marques, 2015); Município de Plácido de Castro, BR-364, Ramal do 45 (Marques, 2015); Rio Branco, Bairro Joafra (Doação IBAMA/CETAS; AC 797).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Do Panamá ao Paraguai e em quase todas as regiões do Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2005).

Taxonomia

São reconhecidas 11 subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *C. l. peruanus* (Novaes 1957; Hoyo *et al.*, 2005).

Status

Residente.

Nome anterior

Thryothorus leucotis.

Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002, Suplemento).

Habitat

Borda de FOA aluvial (provável).

Distribuição Geográfica

Margem sul do Rio Solimões, entre os rios Javari, Juruá e Purus (Hoyo *et al.*, 2005).

Taxonomia

Ver Comentários.

Status

Ver Comentários.

Comentários

(*) Este registro precisa de confirmação (Guilherme, 2009; 2012).

Em Whittaker *et al.* (2002) este táxon foi nominado como *Thryothorus griseus*.

uirapuru-de-peito-branco – *Henicorbina leucosticta* (Cabanis, 1847)
White-breasted Wood-Wren *



Robson Czaban



Registros
Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen <i>et al.</i> , 2005).
Habitat
FOA com palmeiras/bambus.
Distribuição Geográfica
América Central, do México ao Panamá e norte da América do Sul, das Guianas até o Peru (Hoyo <i>et al.</i> , 2005).
Taxonomia
Ver Comentários.
Status
Ver Comentários.
Comentários
(*) Este registro precisa de confirmação (Guilherme, 2009; 2012). Este é o único registro desta espécie para o estado do Acre. Entretanto, não descarto a possibilidade do autor deste registro (Dr. D. T. Rasmussen) ter se confundido ao identificar como <i>H. leucosticta</i> , por exemplo, um indivíduo de <i>Pheugopedius genibarbis</i> , <i>Cantorchilus leucotis</i> ou mesmo de <i>Microcerculus marginatus</i> .

uirapuru-verdadeiro – *Cyphorhinus arada* (Hermann, 1783)
Musician Wren



Celso B. Almeida



Registros
Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35809); Rio Juruá, arredores da cidade de Cruzeiro do Sul (Novaes, 1957, MPEG 23761, 23762); Município de Rio Branco, Seringal Bagaço (Frish, 1963, 2005); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney <i>et al.</i> , n. p. - 1997); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48438, 48439, 48455); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A., MPEG 48437); Rio Tejo, margem esquerda, a aproximadamente 5 Km da foz (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52232, 52233, 52234, 52235; Whittaker <i>et al.</i> , 2002); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Floresta Estadual do Antimary, Localidade Limoeiro (Guilherme, E., MPEG 60826); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64400); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63821); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme <i>et al.</i> , n. p. - 2013, AC 702, 708).
Habitat
FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.
Distribuição Geográfica
Em quase toda a Amazônia, das Guianas até a Bolívia (Hoyo <i>et al.</i> , 2005).
Taxonomia
São reconhecidas oito subespécies. A forma que ocorre no Acre é a <i>C. a. modulator</i> (Pinto & Camargo, 1954; Hoyo <i>et al.</i> , 2005).
Status
Residente.
Comentários
Em Pinto & Camargo (1954), este táxon foi nominado como <i>Leucolepis modulator modulator</i> . Já Novaes (1957), cita a presença para o Alto Juruá da subespécie <i>Leucolepis arada rufogularis</i> . Entretanto, esta forma não foi assinalada por Hoyo <i>et al.</i> (2005) e é possível que seja sinônimo de <i>C. a. modulator</i> . Acredito nesta possibilidade porque nenhuma diferença digna de nota foi identificada entre os espécimes oriundos dos extremos leste e oeste do Estado.

japacanim – *Donacobius atricapilla* (Linnaeus, 1766)
Black-capped Donacobius




Tancredo Maia Filho



bico-assovelado – *Ramphocaenus melanurus* Vieillot, 1819
Long-billed Gnatwren



Robson Czaban



Registros

Arredores da cidade de Rio Branco (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35810); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., obs. pess.); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008).

Habitat

Margens alagadas de rios, igarapés e lagos, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Do Panamá até a Argentina e em quase todo o Brasil (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2005).

Taxonomia

São reconhecidas quatro subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *D. a. albovitatus* (Pinto & Camargo, 1954; Hoyo *et al.*, 2005).

Status

Residente.

Registros

Rio Juruá, localidade Grajauzinho, próximo à Foz do Rio Grajaú (Novaes, 1957, 1958, MPEG 24484); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A., MPEG 48451); Rio Juruá, margem direita, Localidade Mato Grosso (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52239, Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80239); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61364); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão e localidades Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Na América Central e nas regiões norte e sudeste da América do Sul, do México ao Peru. No Brasil, esta espécie possui populações disjuntas no norte (Amazônia) e no extremo leste, da Paraíba a Santa Catarina (Hoyo *et al.*, 2006).

Taxonomia

São reconhecidas 15 subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *R. m. amazonum* (Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2006).

Status

Residente.

balança-rabo-de-chapéu-preto – *Polioptila plumbea* (Gmelin, 1788)

Tropical Gnatcatcher



Celso B. Almeida

**Registros**

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus.

Distribuição Geográfica

América Central e região norte e nordeste da América do Sul, do México ao Peru. No Brasil, ocorre do Amazonas ao Pernambuco e no norte de Minas Gerais (Hoyo *et al.*, 2006).

Taxonomia

São reconhecidas 12 subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *P. p. maior* (Hoyo *et al.*, 2006).

Status

Residente.

sabiá-de-cara-cinza – *Catharus minimus* (Lafresnaye, 1848)

Gray-cheeked Thrush



Wilfred Rogers

**Registros**

Arredores da cidade de Manoel Urbano (Silva G. P., MPEG 31645; Novaes, 1978b).

Habitat

FOA com palmeiras.

Distribuição Geográfica

Do extremo nordeste da Sibéria ao Alasca e Canadá. Migra para o norte da América do Sul durante o inverno setentrional (Hoyo *et al.*, 2005).

Taxonomia


São reconhecidas duas subespécies. A forma encontrada no Acre foi a *C. m. minimus* (Novaes, 1978).

Status


Residente.



Edson Guilherme



Edson Guilherme



Registros

Rio das Minas, margem esquerda, Município de Porto Walter, Localidade Gustavo (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52938); Rio Juruá, margem esquerda, localidade Sobral (Whittaker, A., 48440, 48441, 48442, 48443, 48444); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80243, 80244); Parque Zoológico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); arredores da cidade de Assis Brasil (Guilherme, 2004); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52237; Whittaker *et al.*, 2002); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004, MPEG 58392); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62176, 62177, 62178); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64523); Município de Mâncio Lima, Comunidade Santa Bárbara (Lemos, T. & Marques, E., AC 608); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); Município de Plácido de Castro, BR-364, Ramal do 45 (Marques, 2015).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOD, campinarana.

Distribuição Geográfica

América do Norte, do Alasca e Canadá aos EUA. Migra para a América Central e América do Sul durante o inverno setentrional (Hoyo *et al.*, 2005).

Taxonomia

Este táxon era considerado como subespécie de *C. ustulatus* (Hoyo *et al.*, 2005).

Status

Migrante neártica.

Nome anterior

Catharus ustulatus.

Registros

Rio Juruá, arredores da cidade de Cruzeiro do Sul (Novaes, 1957, 1958, MPEG 24522, 24523, 24524); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., 48446, 48447); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A. MPEG 48448, 48449); Parque Zoológico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; AC 0157, 0263, 0627, 0728); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal (Guilherme, E., MPEG 60058); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60894; Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61382, 61383); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62179); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 63600); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63415); Rio Envira, localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63827, 63828); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre, L. A. & Silva, G. T., MPEG 66992; Mestre *et al.*, 2010); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Rio Jurupari, Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010.; MPEG 70045, 70046); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Município de Rio Branco, Estrada da Piçarreira (Marques, E. & Lemos, T., AC 676); Município de Rio Branco, Estrada da Piçarreira (Marques, 2015); Município de Plácido de Castro, BR-364, Ramal do 45 (Marques, 2015).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD.

Distribuição Geográfica

Oeste da Amazônia, do sudeste da Colômbia ao norte da Bolívia (Hoyo *et al.*, 2005).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2005).

Status

Residente.

Nome anterior

Turdus fumigatus.

Comentários

Em Novaes (1957), este táxon foi nominado como *Turdus fumigatus hauxwelli* e, em Guilherme (2001) como *T. fumigatus*.



Edson Guilherme



Registros

Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, 2013a; MPEG 63654); Parque Zoobotânico e *Campus* da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2013a; AC 747).

Habitat

FOA aluvial, ambientes urbanos.

Distribuição Geográfica

Norte do Brasil e sudeste do Peru. Várzeas do Rio Solimões/ Amazonas e tributários (O'Neill *et al.*, 2011; Guilherme, 2013a).

Taxonomia

Espécie monotípica (O'Neill *et al.*, 2011).

Status

Residente.

Comentários

É possível que o espécime MPEG 63654, proveniente da Fazenda São Raimundo (Guilherme, 2013a), seja um híbrido entre *T. sanchezorum* e *T. bauxwelli*. Futuras análises de material genético poderão esclarecer esta questão.



Lawrence Thompson



Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A., MPEG 48450); Rio Juruá, margem direita, Localidade Mato Grosso (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52238, Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, obs. pess.).

Habitat

FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Oeste da Amazônia, da Colômbia até a Bolívia. Ocorre pontualmente no sul da Venezuela e oeste da Guiana Inglesa (Hoyo *et al.*, 2005).

Taxonomia


Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2005).

Status

Residente.



Sandra Beatriz Zarur



Registros

Arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35812); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80245, 80246); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; AC 0432); arredores da cidade de Assis Brasil (Guilherme, 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60895, 60896; Silva *et al.*, 2015); Ramal Nabor Júnior, Km 26 (Guilherme, E., MPEG 60897); Estrada Transacrea (AC-090) Km 60, margem esquerda (Guilherme, E., MPEG 61461); Município de Cruzeiro do Sul, BR 307, Ramal dos Caroba (Guilherme, E. AC 397); Município de Rio Branco, Estrada da Piçarreira (Marques, 2015); Município de Porto Acre, mata ripária adjacente à Reserva Humaitá, setor norte (Marques, 2015).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, FOD.

Distribuição Geográfica

Do Peru até a Argentina. No Brasil, é encontrada em quase todas as regiões (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2005).

Taxonomia


Espécie monotípica (Pinto & Camargo, 1954; Hoyo *et al.*, 2005).

Status

Migrante austral.



Edson Guilherme



Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, F., & Moreira, M., MPEG 24511, 24512); arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35811); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, 1997); Parque Zoobotânico e *Campus* da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; AC 0016, 0150, 0151, 0257, 0264, 0266, 0272, 0413, 0414, 0415, 0631, 0662, 0725, 0726, 0733, 0748, 0749, 0750, 0751, 0756, 783; MPEG 60059, 60060, 60061); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Ecológica do Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 59890); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61384, 61385); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., AC MPEG 63599); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62180); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas 2011, MPEG 63414); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas 2011, MPEG 63413); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63822, 68823); Parque Estadual Chandless (Guilherme, E. & Marques, E., AC 0250, 0251); Cruzeiro do Sul, Estrada Canela Fina (Guilherme, E. AC 403); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Rio Branco, Bairro Alto Alegre (Ruan, R., AC 802); Cidade de Xapuri (Guilherme, E., obs. pess.).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, área aberta com cultivos ou pastagens, ambientes urbanos.

Distribuição Geográfica

Das Guianas até a Bolívia (Hoyo *et al.*, 2005).

Taxonomia


São reconhecidas cinco subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *T. i. debilis* (Pinto & Camargo, 1954; Hoyo *et al.*, 2005).

Status

Residente.

Comentários

Trata-se do sabiá mais comumente visto e ouvido em todo o estado do Acre.



Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 24503); Alto Rio Moa, margem direita, Igarapé Ramon, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52806); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48445); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); BR-364 a 40 Km da ponte sobre o Rio Liberdade, margem direita (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60893); Floresta Estadual do Antimary, Ramal Uirapuru (Guilherme, E., MPEG 60891, 60892); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64478); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão e localidades Távora e Manaus (Dantas, n. p. - 2010).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOD, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

Do México ao Uruguai e Argentina. Ocorre em quase todo o Brasil (Hoyo *et al.*, 2005).

Taxonomia

São reconhecidas 21 subespécies. A forma que ocorre no Acre parece ser a *T. a. spodiolaemus* (Hoyo *et al.*, 2005).

Status

Residente.

Comentários

Em Novaes (1957), este táxon foi nominado como *Turdus phaeopygus berlepschi*.



Registros

Município de Senador Guiomard, BR-317, Km 84 (Guilherme & Czaban, 2015); Município de Capixaba, BR-317 (Almeida, C. B. 2015 [Wikiaves - WA1706450]); Município de Rio Branco, ramal do Noca (Melo, T. N., 2015 [Wikiaves - WA1821114]).

Habitat

Área aberta com pastagem.

Distribuição Geográfica

Ocorre no Panamá e na América do Sul desde a Colômbia até a Argentina, com exceção do Equador e da maior parte da região central e sudoeste do Bioma Amazônia (Ridgely & Tudor, 1994; Hoyo *et al.*, 2004;).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *A. l. lutescens* (Hoyo *et al.*, 2004).

Status

Residente (invasora).

Comentários

Espécie recém-chegada à região (Guilherme & Czaban, 2015).

**Registros**

Rio Juruá, Localidade São Salvador, próxima à Foz do Rio Grajaú (Novaes, 1957, MPEG 23468); Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 23469); Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35879); arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35880, 35881); arredores da cidade de Rio Branco, Seringal Nova Empresa (Hidasi, J., CPJH 1973); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Parque Zoológico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; MPEG 60062, 60063; AC 640); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80263, 80264); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60844, 60845, 60846, 60847, 60859); Estrada Transacrea (AC-090) Km 60, margem esquerda (Guilherme, E., MPEG 61464); Estrada Transacrea (AC-090), Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61374); Município de Mâncio Lima, Estrada do Barão, Comunidade São Domingos (Guilherme, E., MPEG 62198); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63420); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64403); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63835); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, arredores da cidade (Dantas, n. p. - 2010); Cruzeiro do Sul, Estrada Canela Fina (Guilherme, E. AC 372); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, borda de FOA aluvial, área aberta com pastagens ou cultivares, ambientes urbanos.

Distribuição Geográfica

Na Amazônia, da Venezuela até a Bolívia. No Brasil, ocorre do Maranhão ao Acre (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

Foram descritas quatro subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *A. a. aurifrons* (Novaes, 1957, Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.

Nome anterior

Myospiza aurifrons.

**Registros**

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); arredores da cidade de Assis Brasil (Guilherme, 2004, AC 0083); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 59892, 59893); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60848; Silva *et al.*, 2015); Floresta Estadual do Antimary, Ramal Uirapuru (Guilherme, E., MPEG 60856, 60857, 60858); Estrada Transacrea (AC-090) Km 60, margem esquerda (Guilherme, E., MPEG 61465); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63607, 63608); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64404); Município de Senador Guimard, Localidade Bonal (Guilherme, E. & Souza, G. AC 539); BR 317, margem esquerda, área adjacente à Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus (clareiras), FOD.

Distribuição Geográfica

Das Guianas até a Bolívia. No Brasil, ocorre na Amazônia e na Mata Atlântica (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2013).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies (Hoyo *et al.*, 2013). Duas formas ocorrem no Acre: *A. t. taciturnus* e *A. t. nigrirostris* (Guilherme, 2009).

Status

Residente.

mariquita-de-connecticut – *Geothlypis agilis* (Wilson, 1812)

Connecticut Warbler



Ediane Marques

**pia-cobra** – *Geothlypis aequinoctialis* (Gmelin, 1789)

Masked Yellowthroat



Roseanne Almeida

**Registros**

Município de Rio Branco, BR- 364 (sent. Porto Velho) a aproximadamente 20 Km da Vila Campinas (Marques & Guilherme, 2014; Marques, 2015).

Habitat

Borda de floresta.

Distribuição Geográfica

Norte da América do Norte. Migra para o norte da América do Sul durante o inverno boreal (Ridgely & Tudor, 1994; Hoyo *et al.*, 2010; Marques & Guilherme, 2014).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2010).

Status

Migrante neártica.

Nome anterior

Oporornis agilis (Hoyo *et al.*, 2010).

Registros

Município de Rio Branco (localidade indeterminada) (Forrester, 1993); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras (provável).

Distribuição Geográfica

Sul da América Central (Costa Rica e Panamá) e América do Sul, das Guianas até a Argentina e em quase todo o Brasil (Ridgely & Tudor, 1994; Hoyo *et al.*, 2014).

Taxonomia

Foram descritas quatro subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *G. a. velata* (Hoyo *et al.*, 2014).

Status

Residente.

mariquita-do-canadá – *Cardellina canadensis* (Linnaeus, 1766)
Canada Warbler *



Eduardo Fernandes



Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997).

Habitat

Borda de FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Ocorre na América do Norte, durante o período de reprodução. Esta espécie migra para o norte da América do Sul durante o inverno setentrional (Ridgely & Tudor, 1994; Hoyo *et al.*, 2014).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2014).

Status

Migrante neártica.

Nome anterior

Wilsonia canadensis.

Comentários

(*) Como não houve uma publicação formal do registro feito no Parque Nacional da Serra do Divisor, esta espécie não consta da lista principal das aves do Brasil divulgada pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO, 2014; Piacentini *et al.*, 2015).

pula-pula – *Basileuterus culicivorus* (Deppe, 1830)
Golden-crowned Warbler *



Celso B. Almeida



Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002, Suplemento).

Habitat

FOA com palmeiras (provável).

Distribuição Geográfica

América Central, do México ao Panamá e norte da América do Sul, da Guiana Inglesa à Colômbia. Ocorre, também, no sul da América do Sul, da Bolívia ao Uruguai. No Brasil, esta espécie é encontrada em Roraima e do Maranhão ao Rio Grande do Sul (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997).

Taxonomia

Ver Comentários.

Status

Ver Comentários.

Comentários

(*) Este registro precisa de confirmação (Guilherme, 2009; 2012).

pula-pula-de-cauda-avermelhada – *Myiothlypis fulvicauda* (Spix, 1825)

Buff-rumped Warbler



Margi Moss

**japu-pardo** – *Psarocolinus angustifrons* (Spix, 1824)

Russet-backed Oropendola



Celso B. Almeida

**Registros**

Alto Rio Moa, margem direita, Igarapé Ramon, PNSD (Whitney *et al.*, 1997, MPEG 52816); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); BR-364, Seringal Sardinha (Guilherme, E., AC 0105); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60831); Floresta Estadual do Antimary, Ramal Uirapuru (Guilherme, E., MPEG 60855); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 59891); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Município de Jordão, localidade Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Reserva Humaitá – Ufac (Lemos, T. & Marques, E., AC 719; Silva *et al.*, 2015).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus (próxima a cursos d'água); FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

América Central, de Honduras ao Panamá e no noroeste da América do Sul, da Colômbia até a Bolívia (Ridgely & Tudor, 1994; Hoyo *et al.*, 2010).

Taxonomia

Foram descritas seis subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *M. f. fulvicauda* (Hoyo *et al.*, 2010).

Status

Residente.

Nome anterior

Phaeothlypis fulvicauda.

Registros

Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52245, 52246, Whittaker *et al.*, 2002); arredores da cidade de Assis Brasil (Guilherme, 2004, AC 0065); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2008, MPEG 59899, 59900); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011).

Habitat

Dossel de FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, área aberta com cultivares.

Distribuição Geográfica

Noroeste da América do Sul, da Venezuela até a Bolívia (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

São reconhecidas sete subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *P. a. alfredi* (Aleixo & Guilherme, 2010; Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.

japu-verde – *Psarocolius viridis* (Statius Muller, 1776)
Green Oropendola



Robson Czaban



Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 23431, 23432, 23436); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48456); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62210, 62211); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63845); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, localidade Távora (Dantas, n. p. - 2010).

Habitat

Dossel de FOA com palmeiras/bambus, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Norte da América do Sul (Amazônia), das Guianas ao Peru (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2011).


Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.

japu – *Psarocolius decumanus* (Pallas, 1769)
Crested Oropendola



Anselmo D'Affonseca



Registros

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35851, 35852, 35853); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80269); Parque Nacional da Serra do Divisor, 106 Km a sudoeste de Cruzeiro do Sul (Aleixo, A. & Polleto, F, MPEG 58031) Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 61538); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64490); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010).

Habitat

Dossel de FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, área aberta com cultivares.

Distribuição Geográfica

Do Panamá até a Argentina e em quase todo o Brasil (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *P. d. decumanus* (Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.

Comentários

Em Pinto & Camargo (1954), este táxon foi nominado como *Ostinops decumanus maculosus*.

japuaçu – *Psarocolius bifasciatus* (Spix, 1824)
Olive Oropendola




Celso B. Almeida



iraúna-de-bico-branco – *Procacicus solitarius* (Vieillot, 1816)
Solitary Black Cacique



Emerson Kaseker



Registros

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35848, 35849); arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35850); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whittaker *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); arredores da cidade de Rio Branco (Guilherme, E., obs. pess.); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); BR-364 a 40 Km da ponte sobre o Rio Liberdade, margem direita (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60903); Floresta Estadual do Antimary, Ramal Uirapuru (Guilherme, E., MPEG 60904); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62212); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63668); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão e localidades Pará, Manaus e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

Dossel de FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, área aberta com cultivares.

Distribuição Geográfica

Norte da América do Sul (Amazônia), da Venezuela até a Bolívia. No Brasil, ocorre do Acre e extremo-oeste do Amazonas em direção ao leste, seguindo a calha sul do Solimões/ Amazonas, até sua foz (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *P. b. yuracares* (Pinto & Camargo, 1954).

Status

Residente.

Comentários

Em Pinto & Camargo (1954), este táxon foi nominado como *Gymnostinops yuracares yuracares*. Em Whittaker *et al.* (2002) e Hoyo *et al.*, (2011) este táxon é nominado como *Psarocolius yuracares*.

Registros

Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52688, 52689, 52690); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 23350; Whittaker *et al.*, 2002); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80268); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 58946, 58947, 59896, 59897, 59898); BR-364 a 40 Km da ponte sobre o Rio Liberdade, margem direita (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60902); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62205, 62206); Rio Jurupari, Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Da Venezuela até a Argentina e em quase todo o Brasil (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.

Comentários

Em todas as referências supracitadas este táxon foi nominado como *Cacicus solitarius*.

guaxe – *Cacicus haemorrhous* (Linnaeus, 1766)
Red-rumped Cacique



Tomaz Melo



japu-de-capacete – *Cacicus oseryi* (Deville, 1849)
Casqued Oropendola



Margi Moss



Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002, Suplemento); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus.

Distribuição Geográfica

Norte da América do Sul (Amazônia), das Guianas até a Bolívia. Ocorre, também, do nordeste do Brasil ao Paraguai e Argentina (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *C. h. pachyrhynchus* (Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.

Comentários

Os únicos registros desta espécie no estado do Acre foram visuais.

Registros

Alto Rio Moa, Igarapé Amil, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52817); Rio Tejo, a aproximadamente 5 Km da foz, REAJ (Whittaker & Oren, 1999; Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 52244); Parque Nacional da Serra do Divisor, 106 Km a sudoeste de Cruzeiro do Sul (Aleixo, A. & Polleto, F., MPEG 58032, 58033); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62208, 62209).

Habitat

Dossel de FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Do leste do Equador ao norte da Bolívia e sudoeste da Amazônia brasileira. No Brasil, esta espécie só foi registrada no oeste do estado do Acre e no sudoeste do estado do Amazonas (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.

Comentários

Em Whittaker & Oren (1999) e Whittaker *et al.* (2002), este táxon foi nominado como *Psarocolius oseryi*.



Arthur de Magalhães Goulart

Registros
Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney <i>et al.</i> , n. p. - 1997); Rio Juruá, Foz do Rio Tejo (Whittaker & Oren, 1999; Whittaker <i>et al.</i> , 2002); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A., MPEG 48457); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão (Dantas, n. p. - 2010).
Habitat
FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD submontana.
Distribuição Geográfica
Extremo-oeste da Amazônia, do sudeste Colômbia ao Equador e Peru. No Brasil, é encontrada apenas nos estados do Acre e Amazonas (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997).
Taxonomia
Espécie monotípica (Hoyo <i>et al.</i> , 2011).
Status
Residente.
Comentários
Em Whittaker & Oren (1999), este táxon foi nominado como <i>Ocyalus latirostris</i> e, em Whittaker <i>et al.</i> (2002), como <i>Psarocolius latirostris</i> .

Registros
Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35854, 35855); arredores da cidade de Cruzeiro do Sul (Novaes, 1957, 1958); Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, 1958, MPEG 23344); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney <i>et al.</i> , n. p. - 1997); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80266, 80267); Parque Zoobotânico e <i>Campus</i> da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; AC 0153, 0274); Cidade de Rio Branco (Guilherme, E., AC 018); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002); Parque Nacional da Serra do Divisor, 106 Km a sudoeste de Cruzeiro do Sul (Aleixo, A. & Polleto, F., MPEG 58034); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen <i>et al.</i> , 2005); Floresta Estadual do Antimary, Ramal Uirapuru (Guilherme, E., MPEG 60905, 60906); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62207); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 58945); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre <i>et al.</i> , 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo <i>et al.</i> , n. p. - 2010); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63610); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63846); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão e localidades Pará, Távora, Manaus e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme <i>et al.</i> , n. p. - 2013).
Habitat
Borda de FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, área aberta com cultivares ou pastagens, ambientes urbanos.
Distribuição Geográfica
Sul da América Central (Panamá) e norte da América do Sul, das Guianas até a Bolívia. Ocorre, também, no nordeste do Brasil, de Pernambuco à Bahia (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Hoyo <i>et al.</i> , 2011).
Taxonomia
São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é a <i>C. c. cela</i> (Pinto & Camargo, 1954; Novaes, 1957; Hoyo <i>et al.</i> , 2011).
Status
Residente.

japiim-da-selva – *Cacicus koepckeae* (Lowery & O'Neill, 1965)
Selva Cacique




Pablo Grilli



Registros
Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008).
Habitat
FOA aluvial.
Distribuição Geográfica
Ocorre, localmente, no Sudeste do Peru (Clements & Shany, 2001; Schulenberg <i>et al.</i> , 2007) e região centro-sul do estado do Acre (Hoyo <i>et al.</i> , 2011; Guilherme, 2012). Espécie restrita ao centro de endemismo Inambari (Haffer, 1978, Cracraft, 1985).
Taxonomia
Ver Comentários.
Status
Ver Comentários.
Comentários
Esta espécie, que era considerada endêmica do Peru (Clements & Shany, 2001; Schulenberg <i>et al.</i> , 2007), foi registrada no Acre pelo ornitólogo Dante Buzzetti. Este registro inédito é o primeiro da espécie em território brasileiro (Buzzetti, 2008). Como não houve uma publicação formal do registro, feito no Parque Estadual Chandless, a espécie não consta da lista principal das aves do Brasil divulgada pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO, 2014; Piacentini <i>et al.</i> , 2015).

inhapim – *Icterus cayanensis* (Linnaeus, 1766)
Epaulet Oriole



Marco Guedes



Registros
Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney <i>et al.</i> , n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62204); Município de Jordão, localidades Pará, Manaus e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme <i>et al.</i> , n. p. - 2013).
Habitat
Borda de FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD submontana, campinarana.
Distribuição Geográfica
Das Guianas ao sul do continente, até a Argentina e Uruguai (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997).
Taxonomia
Espécie monotípica (Hoyo <i>et al.</i> , 2011).
Status
Residente.

joão-pinto • corrupião – *Icterus croconotus* (Wagler, 1829)
Orange-backed Troupial



Celso B. Almeida



iraúna-velada – *Lampropsar tanagrinus* (Spix, 1824)
Velvet-fronted Grackle



Paul van Giersbergen



Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 58948, 59895); Floresta Estadual do Mogno, BR-364, a 6 Km da ponte sobre o Rio Tauari (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60899); Rio Jurupari, Localidade Humaitá (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD submontana, área aberta com cultivares.

Distribuição Geográfica

Da Colômbia e Venezuela ao norte da Argentina. Ocorre em quase todo o Brasil (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *I. c. croconotus* (Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.

Comentários

Em Rasmussen *et al.* (2005) este táxon foi nominado como *Icterus jamacuii*.

Registros

Rio Juruá, arredores da cidade de Cruzeiro do Sul (Novaes, 1957, MPEG 23288); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48459, 49740); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A., MPEG 48458); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras (próxima a lagos ou corpos d'água), borda de FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Ocorre no norte da América do Sul, na Venezuela, Guiana Inglesa e no Brasil (estado de Roraima). Ocorre, também, no centro-oeste da Amazônia, do sul da Colômbia ao nordeste da Bolívia (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

São reconhecidas cinco subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *L. t. macropterus* (Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.

iratauá-pequeno – *Chrysomus icterocephalus* (Linnaeus, 1766)
Yellow-hooded Blackbird



Anselmo D'Alfonseca



Registros

Município de Cruzeiro do Sul, Localidade Olivença (Gomes, G. C., 2013 [Wikiaves - WA888068]).

Habitat

FOA aluvial, várzea.

Distribuição Geográfica

Norte da América do Sul. Várzeas dos rios amazônicos (Ridgely & Tudor, 1994).

Taxonomia

São reconhecidas cinco subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *C. i. icterocephalus* (Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.

iraúna-grande – *Molothrus oryzivorus* (Gmelin, 1788)
Giant Cowbird



Edson Guilherme



Fêmea

Registros

Arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP); Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 23314, 23317, 23318); arredores da cidade de Rio Branco, Seringal Nova Empresa (Hidasi, J., CPJH 1767); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão (Dantas, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

Borda de FOA aluvial, margens de rios, lagos e igarapés, área aberta com cultivares.

Distribuição Geográfica

Do México até a Argentina e em quase todo o Brasil (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *M. o. oryzivorus* (Pinto & Camargo, 1954; Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.

Comentários

Em Pinto & Camargo (1954) e Novaes (1957), este táxon foi nominado como *Psomocolax oryzivorus oryzivorus*.

vira-bosta – *Molothrus bonariensis* (Gmelin, 1789)
Shiny Cowbird



Celso B. Almeida



Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Parque Zoobotânico e *Campus* da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., & Santos, M. P. D., MPEG 61380); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63849).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras, borda de FOA aluvial, FOD submontana, área aberta com pastagens ou cultivares.

Distribuição Geográfica

Flórida (USA) e ilhas caribenhas. Do Panamá até a Argentina e em quase todo o Brasil (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

São reconhecidas sete subespécies. A forma que ocorre no Acre parece ser a *M. b. bonariensis* (Gyldenstolpe, 1945a,b; Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.

polícia-inglesa-do-norte – *Sturnella militaris* (Linnaeus, 1758)
Red-breasted Blackbird



Edson Guilherme



Macho

Registros

Arredores da cidade de Rio Branco (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35858, 35859, 35860, 35861, 35862, 35863, 35864, 35865); BR-317 entre Brasília e Rio Branco (Parker & Remsen, 1987); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; AC 011, 0145); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002, Suplemento); arredores da cidade de Assis Brasil (Guilherme, 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60907); Estrada Transacreana (AC-090) Km 60, margem direita (Guilherme, E., MPEG 61474); Estrada Transacreana (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61381); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63667); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64561); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63847, 63848); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

Área aberta com pastagens ou cultivares.

Distribuição Geográfica

Ocorre na América Central, da Nicarágua ao Panamá e no norte da América do Sul (Amazônia), das Guianas ao norte da Bolívia (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2011).


Status

Residente.

pipira-de-bico-vermelho – *Lamprospiza melanoleuca* (Vieillot, 1817)
Red-billed Pied Tanager



Fêmea



Robson Czaban

cambacica – *Coereba flaveola* (Linnaeus, 1758)
Bananaquit



Tancredo Maia Filho



Registros

Rio Juruá, Foz do Rio Tejo (Whittaker & Oren, 1999); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64479, 64514); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 58939); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Jurupari, localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão e localidades Pará, Távora e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

Dossel de FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD, campinarana.

Distribuição Geográfica

Das Guianas para o sul da Amazônia até o Peru e a Bolívia. Ocorre em parte da Amazônia brasileira, do Maranhão ao Acre (Ridgely & Tudor, 1994; Isler & Isler, 1999; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.

Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Jordão, localidades Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras, FOA aluvial, campinarana.

Distribuição Geográfica

Da América Central (México) - incluindo as ilhas caribenhas - ao norte da Argentina (Sick, 1997; Hoyo *et al.* 2013).

Taxonomia



São reconhecidas quarenta e uma subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *C. f. intermedia* (Hoyo *et al.*, 2013).

Status

Residente.



Robson Czaban



Robson Czaban

**Registros**

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 23661); arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35867); Alto Rio Moa, margem direita, Igarapé Ramon, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52807); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48465); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80249); Parque Zoobotânico e *Campus* da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; AC 0143); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Município de Mâncio Lima, Estrada do Barão, Comunidade São Domingos (Guilherme, E., MPEG 62199, 62200); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62201); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão e localidades Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64405, 64560); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63841); Município de Cruzeiro do Sul, BR 307, Ramal dos Caroba (Guilherme, E. AC 336); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Silva *et al.*, 2015); Município de Porto Acre, mata ripária adjacente à Reserva Humaitá, setor norte (Marques, 2015); Município de Rio Branco, Estrada da Piçarreira (Marques, 2015).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, campinarana, área aberta com cultivares, ambientes urbanos.

Distribuição Geográfica

América Central, do México ao Panamá e norte da América do Sul, das Guianas até a Bolívia e Paraguai. Ocorre, também, no extremo leste do Brasil, de Pernambuco ao Rio de Janeiro (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

Foram descritas cinco subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *S. m. maximus* (Pinto & Camargo, 1954; Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.

Registros

Rio Juruá, arredores da cidade de Cruzeiro do Sul (Novaes, 1957, 1958, MPEG 23653); arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35867, 35868, 35869); arredores da cidade de Rio Branco, Seringal Nova Empresa (Hidasi, J., CPJH 1835); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Parque Zoobotânico e *Campus* da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; AC 0156, 0259, 0435); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80247, 80248); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Rio Liberdade, margem direita, próximo à Foz do Igarapé Novena (Guilherme, 2007, MPEG 60851); Floresta Estadual do Mogno, BR-364, a 6 Km da ponte sobre o Rio Tauari (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60852); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e Localidade e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010, MPEG 70048); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão (Dantas, n. p. - 2010); Estrada Transacreana (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61379); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62202, 62203); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64406); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63842); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Município de Plácido de Castro, BR-364, Ramal do 45 (Marques, 2015).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, área aberta com cultivares, ambientes urbanos.

Distribuição Geográfica

América Central, do México ao Panamá e em quase toda a América do Sul, das Guianas até a Argentina (Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

Táxon tratado anteriormente como subespécie de *Saltator coerulescens* (Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.


Nome anterior

Saltator coerulescens

bico-encarnado – *Saltator grossus* (Linnaeus, 1766)
Slate-colored Grosbeak



João Quental



Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63609, 63665, 63666); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

América Central, de Honduras ao Panamá e norte da América do Sul, das Guianas até a Bolívia. Ocorre em toda a Amazônia brasileira (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *S. g. grossus* (Gyldenstolpe, 1951; Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.

Nome anterior

Pitylus grossus.

furriel-de-encontro – *Parkerthraustes humeralis* (Lawrence, 1867)
Yellow-shouldered Grosbeak



Sílvia Faustino Linhares



Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008).

Habitat

Dossel de FOA com palmeiras/bambus.

Distribuição Geográfica

Centro-oeste da Amazônia, da Colômbia até a Bolívia. No Brasil, é encontrada do Acre em direção ao leste, seguindo a calha sul do Rio Solimões/Amazonas (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.

tiê-preto-e-branco – *Conothraupis speculigera* (Gould, 1855)
Black-and-white Tanager



Pablo Grilli



saíra-de-chapéu-preto – *Nemosia pileata* (Boddaert, 1783)
Hooded Tanager



Anselmo D'Affonseca



Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Stotz, 1990, MZUSP 42150); Rio Juruá, Igarapé São Luiz, Localidade Valparaíso (Whittaker & Oren, 1999, MPEG 52679); BR-364 a 40 Km da ponte sobre o Rio Liberdade, margem direita (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60874).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Do leste do Equador em direção ao sul, até o norte e sudeste do Peru (Ridgely & Tudor, 1994; Isler & Isler, 1999). No Brasil, esta espécie só foi registrada no estado do Acre (Stotz, 1990; Sick, 1997; Whittaker & Oren, 1999; Guilherme, 2007).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Migrante intratropical (a partir dos Andes).

Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002, Suplemento); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Da Colômbia à Guiana Francesa. Ocorre, também, na margem sul do Rio Solimões/ Amazonas, do Peru até a Argentina e em quase todo o Brasil (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Isler & Isler, 1999; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

São reconhecidas seis subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *N. p. caerulea* (Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.

sai-canário – *Thlypopsis sordida* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)
Orange-headed Tanager



Robson Czaban



Registros
Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002).
Habitat
Dossel de FOA com palmeiras.
Distribuição Geográfica
Da Venezuela (Rio Orinoco) e Colômbia ao sul do continente, até a Argentina. No Brasil, ocorre do oeste da Amazônia até as regiões Sudeste e Nordeste (Isler & Isler, 1999; Hoyo <i>et al.</i> , 2011).
Taxonomia
São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a <i>T. s. chrysopsis</i> (Hoyo <i>et al.</i> , 2011).
Status
Residente.

tem-tem-de-dragona-vermelha – *Tachyphonus phoenicius* Swainson, 1838
Red-shouldered Tanager



Anselmo D'Afonseca



Registros
Município de Mâncio Lima, Comunidade Santa Bárbara (Guilherme, E., AC 655); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme <i>et al.</i> , n. p. - 2013).
Habitat
Campinas e campinaranas
Distribuição Geográfica
Ocorre pontualmente na região amazônica. Colômbia, Venezuela, Guianas, Peru e Brasil (Ridgely & Tudor, 1994).
Taxonomia
Espécie monotípica (Hoyo <i>et al.</i> , 2011).
Status
Residente.

Macho

pipira-de-máscara • pipira-do-flamengo – *Ramphocelus nigrogularis* (Spix, 1825)
Masked Crimson Tanager



Macho

Celso B. Almeida



Peru

Bolivia

pipira-vermelha – *Ramphocelus carbo* (Pallas, 1764)
Silver-beaked Tanager



Macho

Edson Guilherme



Peru

Bolivia

Registros

Rio Juruá, arredores da cidade de Cruzeiro do Sul (Novaes, 1957, 1958, MPEG 23065); Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957; Parker & Remsen, 1987; MPEG 23059, 23060, 23061, 23062, 23063; LSUMZ 67844, 67845); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52680); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., 48462); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52252; Whittaker *et al.*, 2002); arredores da cidade de Feijó (Guilherme, E., obs. pess.); arredores da cidade de Assis Brasil (Guilherme, 2004); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., obs. pess.); Rio Liberdade, margem direita, próximo à Foz do Igarapé Novena (Guilherme, 2007, MPEG 60838); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão (Dantas, n. p. - 2010); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62191, 62192, 62193); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

Borda de FOA/FOD aluvial, borda de FOA com palmeiras/bambus.

Distribuição Geográfica

Do oeste da Amazônia (Colômbia, Equador, Brasil e Peru) em direção ao leste, ao longo da calha do Solimões/Amazonas (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Isler & Isler, 1999; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.

Registros

Arredores da cidade de Rio Branco (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35834, 35835, 35836); arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35837, 35838, 35839, 35840, 35841, 35842); Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957; MPEG 22806, 22807, 22808, 22809, 22810, 22811); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80256, 80257, 80258, 80259); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Parque Zoobotânico e *Campus* da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; AC 0262, 0271, 0385, 0444, 0664, 0753, 0762, 0775, 0788, 0791); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005, Guilherme, E., MPEG 61547); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60835, 60836, 60837; Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); Floresta Estadual do Mogno, BR-364, a 6 Km da ponte sobre o Rio Tauari (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60840); Estrada Transacrea (AC-090) Km 60, margem esquerda (Guilherme, E., MPEG 61471); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61365); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62194); Município de Mâncio Lima, Estrada do Barão, Comunidade São Domingos (Guilherme, E., MPEG 62195, 62196, 62197); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64559); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63826); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Assis Brasil, Estrada da Pedreira, Localidade Museu (Guilherme, E., MPEG 70935); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão (Dantas, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Cruzeiro do Sul, Estrada Canela Fina (Guilherme, E. AC 340, 345, 349, 353, 359, 361, 363); Cruzeiro do Sul, BR-307, Estrada da Variante (Pinheiro & Turci, 2013); Reserva Humaitá – Ufac, setor norte (Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); Município de Rio Branco, Estrada da Piçarreira (Marques, 2015); Município de Plácido de Castro, BR-364, Ramal do 45 (Marques, 2015); Município de Porto Acre, mata ripária adjacente à Reserva Humaitá, setor norte (Marques, 2015).

pipira-vermelha – *Ramphocelus carbo* (Pallas, 1764)
Silver-beaked Tanager

Habitat

Borda de FOA com palmeiras, FOA/FOD aluvial, FOD, FOD submontana, campinarana, área aberta com cultivos, ambientes urbanos.

Distribuição Geográfica

Das Guianas ao Paraguai. Ocorre em quase todo o Brasil, exceto no extremo leste (litoral Atlântico) (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Isler & Isler, 1999; Hoyo *et al.*, 2011).


Taxonomia

São reconhecidas oito subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *R. c. connectens* (Pinto & Camargo, 1954; Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.

tem-tem-de-dragona-branca – *Lanio luctuosus* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)
White-shouldered Tanager



Edson Guilherme



Macho

Registros

Arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35844); Rio Juruá, arredores da cidade de Cruzeiro do Sul (Novaes, 1957, 1958, MPEG 23113); arredores da cidade de Rio Branco, Seringal Nova Empresa (Hidasi, J., CPJH 1726); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80262); Parque Zoológico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Rio Juruá, Foz do Rio Tejo (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52251; Whittaker *et al.*, 2002); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal (Guilherme, E., MPEG 60054); Floresta Estadual do Antimary, Localidade Limoeiro (Guilherme, E., MPEG 60842); Estrada Transacrea (AC-090) Km 60, margem esquerda (Guilherme, E., MPEG 61462); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61369); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63660, 63661); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64511); Município de Senador Guiomard, localidade Bonal (Guilherme, E. & Souza, G., AC 550); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Silva *et al.*, 2015).

Habitat

FOA com bambus/palmeiras, FOA/FOD aluvial, FOD.

Distribuição Geográfica

América Central, de Honduras ao Panamá e no norte da América do Sul (Amazônia), das Guianas até a Bolívia (Isler & Isler, 1999; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

São reconhecidas cinco subespécies (Isler & Isler, 1999). A forma que ocorre no Acre é a *L. l. luctuosus* (Pinto & Camargo, 1954; Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2011).

Status


Residente.

Nome anterior

Tachyphonus luctuosus.




Robson Czaban



Macho

Registros
Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35843); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker <i>et al.</i> , 2002); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen <i>et al.</i> , 2005); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., obs. pess.); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre <i>et al.</i> , 2010).
Habitat
Dossel de FOA com palmeiras/bambus, FOD.
Distribuição Geográfica
Norte e extremo leste da América do Sul, das Guianas até a Bolívia. No Brasil, ocorre na Amazônia e no litoral do Nordeste (Sick, 1997; Isler & Isler, 1999; Hoyo <i>et al.</i> , 2011).
Taxonomia
São reconhecidas nove subespécies. A forma que ocorre no Acre é a <i>L. c. madeirae</i> (Pinto & Camargo, 1954; Hoyo <i>et al.</i> , 2011).
Status
Residente.
Nome anterior
<i>Tachyphonus cristatus</i> .



Steve Kelling




Registros
Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney <i>et al.</i> , n. p. - 1997); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48463); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004, MPEG 58393); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão e localidades Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010; MPEG 71393).
Habitat
FOA com bambus/palmeiras, FOA aluvial, FOD submontana.
Distribuição Geográfica
Na Amazônia sul-ocidental (Brasil, Peru e Bolívia) (Ridgely & Tudor, 1994; Isler & Isler, 1999).
Taxonomia
Espécie monotípica (Isler & Isler, 1999; Hoyo <i>et al.</i> , 2011).
Status
Residente.
Nome anterior
<i>Tachyphonus rufiventer</i> .

pipira-de-asa-branca – *Lanio versicolor* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)
White-winged Shrike-Tanager



Robson Czaban



Registros

Alto Rio Moa, margem direita, Igarapé Ramon, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52808); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48464); arredores da cidade de Assis Brasil (Guilherme, 2004, AC 0074); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Município de Jordão, Localidade Távora (Dantas, n. p. - 2010; MPEG 71386).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Na Amazônia, a partir da margem sul do Rio Solimões/Amazonas (Brasil, Peru e Bolívia) (Ridgely & Tudor, 1994; Isler & Isler, 1999; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies (Isler & Isler, 1999). A forma que ocorre no Acre é a *L. v. versicolor* (Gyldenstolpe, 1945b; Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.

tem-tem-de-topete-ferrugíneo – *Lanio surinamus* (Linnaeus, 1766)
Fulvous-crested Tanager



Celso B. Almeida



Macho

Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 23104, 23105, 23106, 23108); Alto Rio Moa, margem direita, Igarapé Ramon, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52809); Alto Rio Moa, margem esquerda, Serra da Jaquirana (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52810); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA/FOD aluvial, campinarana.

Distribuição Geográfica

Em quase toda a Amazônia, das Guianas ao Peru (Ridgely & Tudor, 1994; Isler & Isler, 1999; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

São reconhecidas quatro subespécies (Isler & Isler, 1999). A forma que ocorre no Acre é a *L. s. napensis* (Novaes, 1957; Isler & Isler, 1999; Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.

Nome anterior

Tachyphonus surinamus.

pipira-da-taoca – *Lanio penicillatus* (Spix, 1825)
Gray-headed Tanager



Robson Czaban



Registros

Rio Juruá, arredores da cidade de Cruzeiro do Sul (Novaes, 1957, 1958, MPEG 23120, 23121, 23122); Rio Juruá, Estirão do Carmo, próximo à Foz do Rio Grajaú (Novaes, 1957, MPEG 23116, 23123); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002, Suplemento); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Rio Branco, Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 63601); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

América Central, do México ao Panamá, e na América do Sul, das Guianas e Colômbia ao Paraguai (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Isler & Isler, 1999; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

São reconhecidas sete subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *L. p. penicillata* (Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.

Nome anterior

Eucometis penicillata (ver Hoyo *et al.*, 2011).

saíra-de-cabeça-castanha – *Tangara gyrola* (Linnaeus, 1758)
Bay-headed Tanager



Marco Guedes



Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011).

Habitat

Dossel de FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Na América Central, da Costa Rica ao Panamá. Ocorre em quase toda a Amazônia, das Guianas até a Bolívia (Ridgely & Tudor, 1994; Isler & Isler, 1999; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

São reconhecidas nove subespécies. De acordo com a distribuição geográfica, duas formas podem ocorrer no estado do Acre: *T. g. albertinae* e *T. g. catharinae* (Hoyo *et al.*, 2011).


Status

Residente.

saíra-ouro – *Tangara schrankii* (Spix, 1825)
Green-and-gold Tanager



Emerson Kaseker



saíra-de-bando – *Tangara mexicana* (Linnaeus, 1766)
Turquoise Tanager



Celso B. Almeida



Registros

Arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35821); Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35820); Rio Juruá, arredores da cidade de Cruzeiro do Sul (Novaes, 1957, MPEG 23040, 23042, 23043); Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 23041, 23044, 23045, 23046, 23047); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52684); Alto Rio Moa, margem esquerda, Igarapé Amil (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52812); Rio Juruá, margem direita, Localidade Mato Grosso (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52250, Whittaker *et al.*, 2002); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52249); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Floresta Estadual do Rio Gregório, próximo à ponte sobre o Rio Acuraua (Guilherme, 2007, MPEG 60841); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63662); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63831, 63832); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão e localidades Pará, Távora, Manaus e Veneza (Dantas, n. p. - 2010; MPEG 71387, 71388, 71389); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

Dossel de FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Centro-oeste da Amazônia, da Venezuela até a Bolívia (Ridgely & Tudor, 1994; Isler & Isler, 1999; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *T. s. schrankii* (Pinto & Camargo, 1954; Novaes, 1957; Isler & Isler, 1999; Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.

Registros

Rio Juruá, arredores da cidade de Cruzeiro do Sul (Novaes, 1957, MPEG 22997, 22998); Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 23000, 23001); Município de Capixaba, Fazenda Campo Lindo (Hidasi, J., CPJH 651); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61372); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 64577, 64578, 64579); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63829, 63830); Município de Jordão, localidades Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

No norte da América do Sul (Amazônia), das Guianas até a Bolívia e no extremo leste do Brasil, da Bahia ao Rio de Janeiro (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Isler & Isler, 1999; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia


São reconhecidas cinco subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *T. m. boliviana* (Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.



Celso B. Almeida



Robson Czaban

**Registros**

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35819); Rio Juruá, arredores da cidade de Cruzeiro do Sul (Novaes, 1957, MPEG 23032); Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 23030, 23031); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whittaker *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80260); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Estrada Transacrea (AC-090) Km 60, margem esquerda (Guilherme, E., MPEG 61463); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61370, 61371); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62185, 62186, 62187); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63662); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64481, 64513); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, localidades Pará, Távora e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); Município de Mâncio Lima, Comunidade Santa Bárbara (Guilherme, E., obs. Pess.) ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Município de Rio Branco, Ramal Piçarreira (Crozariol, M. A., Melo, T. N. e Leite, G., MNRJ 49513); Município de Rio Branco, Estrada da Piçarreira (Marques, 2015).

Habitat

Dossel de FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Em quase toda a Amazônia, das Guianas até a Bolívia (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Isler & Isler, 1999; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

São reconhecidas quatro subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *T. c. chilensis* (Pinto & Camargo, 1954; Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.

Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62188); Município de Jordão, localidades Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010).

Habitat

Dossel de FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Na Amazônia, das Guianas até a Bolívia. Ocorre, também, no litoral do nordeste e sudeste do Brasil, de Pernambuco ao Rio de Janeiro (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Isler & Isler, 1999; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

São reconhecidas quatro subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *T. v. iridina* (Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.

saíra-opala – *Tangara callophrys* (Cabanis, 1849)
Opal-crowned Tanager



Tomaz Melo



Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64484, 64526); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Município de Jordão, Localidade Manaus (Dantas, n. p. - 2010); Fazenda Experimental Catuaba (Kaseker, E. P., 2013 [Wikiaves - WA954141]).

Habitat

Dossel de FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

No oeste da Amazônia, da Colômbia ao Peru. No Brasil, só foi registrada nos estados do Amazonas e Acre (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Isler & Isler, 1999; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

Espécie monotípica (Isler & Isler, 1999; Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.

saíra-de-barriga-amarela – *Tangara xanthogastra* (Sclater, 1851)
Yellow-bellied Tanager



Tomaz Melo



Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80261); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão e localidades Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010);

Habitat

Dossel de FOA com palmeiras/bambus, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Centro-oeste da Amazônia, da Venezuela até a Bolívia (Ridgely & Tudor, 1994; Isler & Isler, 1999; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia


São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *T. x. xanthogastra* (Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.



Edson Guilherme



Rodrigo D'Alessandro



Registros

Arredores da cidade de Rio Branco (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35823); arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35824, 35825, 35826); arredores da cidade de Rio Branco, Seringal Nova Empresa (Hidasi, J., CPJH 659); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Parque Zoobotânico e *Campus* da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; AC 0152); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60832; Silva *et al.*, 2015); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61367, 61368); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 63602); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64558); Rio Envira, localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63834); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão (Dantas, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Cruzeiro do Sul, BR-307, Estrada da Variante (Pinheiro & Turci, 2013); Reserva Humaitá – Ufac, setor norte (Silva *et al.*, 2015).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, FOA/FOD aluvial, FOD, FOD submontana, campinarana, área aberta com cultivos ou pastagens, ambientes urbanos.

Distribuição Geográfica

América Central, do sul do México ao Panamá e no norte da América do Sul, das Guianas ao norte da Bolívia (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Isler & Isler, 1999; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

São reconhecidas treze subespécies. De acordo com a distribuição geográfica, duas formas podem estar presente no Acre: *T. e. mediana* e *T. e. ebrenreichi* (Pinto & Camargo, 1954; Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.

Nome anterior

Thraupis episcopus (Hoyo *et al.*, 2011).

Comentários

Em Pinto & Camargo (1954), este táxon foi nominado como *Thraupis virens medianus*.

Registros

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35833); arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35828, 35829, 35830, 35831, 35832); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Parque Zoobotânico e *Campus* da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; AC 0377, 0381, 0635); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60833, 60834); Estrada Transacrea (AC-090) Km 60, margem esquerda (Guilherme, E., MPEG 61472); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61366); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62190); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63419); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão e localidades Pará, Távora, Manaus e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Rio Branco, Bairro Calafate (Silva, D., AC 793).

Habitat

Dossel de FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, campinarana, área aberta com cultivos ou pastagens, ambientes urbanos.

Distribuição Geográfica

Na América Central, da Nicarágua ao Panamá e em quase toda a América do Sul, das Guianas ao Paraguai. Ocorre em todo o Brasil (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Isler & Isler, 1999; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

São reconhecidas quatro subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *T. p. melanoptera* (Pinto & Camargo, 1954; Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.

Nome anterior


Thraupis palmarum.

saíra-mascarada – *Tangara nigrocincta* (Bonaparte, 1838)

Masked Tanager



Robson Czaban

**saíra-de-cabeça-azul** – *Tangara cyanicollis* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)

Blue-necked Tanager *



Celso B. Almeida

**Registros**

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35822); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62189); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64482, 64483, 64487, 64499); Município de Jordão, localidades Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010).

Habitat

Dossel de FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

No centro-oeste da Amazônia, da Guiana Inglesa até a Bolívia (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Isler & Isler, 1999).

Taxonomia

Espécie monotípica (Isler & Isler, 1999; Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.

Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002, Suplemento).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus (provável).

Distribuição Geográfica

Extremo-oeste da Amazônia, no sopé andino, da Venezuela até a Bolívia. No Brasil, ocorre no norte do Mato Grosso e sul do Pará (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Isler & Isler, 1999).

Taxonomia

Ver Comentários.

Status

Ver Comentários.

Comentários

(*) Este registro precisa de confirmação (Guilherme, 2009; 2012).

tietinga – *Cissopis leverianus* (Gmelin, 1788)
Magpie Tanager



Ricardo Plácido



sanhaçu-de-coleira– *Schistochlamys melanopsis* (Latham, 1790)
Black-faced Tanager



Tancredo Maia Filho



Registros

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35847); arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35846); Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 23142); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); BR-364, Seringal Sardinha (Guilherme, E., observado); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); BR-364 a 40 Km da ponte sobre o Rio Liberdade, margem direita (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60839); Rio Envira, localidade Novo Porto (Guilherme, E., obs. pess.); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64480); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão (Dantas, n. p. - 2010); Município de Assis Brasil, Estrada da Pedreira, Localidade Museu (Guilherme, E., MPEG 70934); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, borda de FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Da Guiana Francesa para o oeste, até a Bolívia. Ocorre, também, em parte do norte e sudeste do Brasil, até o Paraguai e o norte da Argentina (Misiones) (Ridgely & Tudor, 1994; Isler & Isler, 1999; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *C. l. leverianus* (Pinto & Camargo, 1954; Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.

Registros

Arredores da cidade de Brasília, BR-317, Estrada do Pacífico, logo na saída rumo a Assis Brasil (Guilherme & Czaban, 2015, AC 0067); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Parque Estadual Chandless (Guilherme & Czaban, 2015, AC 0252, 0253); Município de Bujari (Kaseker, E. P., 2011 [Wikiaves - WA447993]); Município de Cruzeiro do Sul (Rodrigues, E. T., 2014 [Wikiaves - WA1454096]).

Habitat

Borda de FOA aluvial, área aberta com pastagem ou cultivares.

Distribuição Geográfica

Norte da América do Sul, das Guianas até a Colômbia e também no Peru e Bolívia. No Brasil, esta espécie ocorre do leste do Amapá em direção ao sul, até as regiões Centro-Oeste e Nordeste (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Isler & Isler, 1999).

Taxonomia



São reconhecidas cinco subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *S. m. amazonica* (Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.

cardeal-da-amazônia • galo-de-campina – *Paroaria gularis* (Linnaeus, 1766)

Red-capped Cardinal

**Registros**

Arredores da cidade de Rio Branco (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35870, 35871, 35872, 35873, 35874); arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35875, 35876); Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 23601, 23602); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80255); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 58943); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63669); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Santos, 2011, MPEG 63421); Rio Envira, localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63840); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

Borda de FOA aluvial, margens de rios, lagos e igarapés.

Distribuição Geográfica

Norte da América do Sul (Amazônia), das Guianas até a Bolívia (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *P. g. gularis* (Pinto & Camargo, 1954; Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.

saíra-viúva – *Pipraeidea melanonota* (Vieillot, 1819)

Fawn-breasted Tanager *

**Registros**

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002, Suplemento).

Habitat

FOA com palmeiras (provável).

Distribuição Geográfica

No extremo-oeste da América do Sul, da Venezuela até a Argentina. Ocorre, também, nas regiões Sudeste e Sul do Brasil (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Isler & Isler, 1999).

Taxonomia

Ver Comentários.

Status

Ver Comentários.

Comentários

(*) Este registro precisa de confirmação (Guilherme, 2009; 2012).

saí-andorinha – *Tersina viridis* (Illiger, 1811)
Swallow Tanager



Macho

Celso B. Almeida



Peru

Bolivia

Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002) Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 64580).

Habitat

Dossel de FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

No sul da América Central (Panamá) e na América do Sul, das Guianas até a Argentina (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Isler & Isler, 1999; Hoyo *et al.*, 2011).


Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *T. v. occidentalis* (Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.

saí-de-barriga-branca – *Dacnis albiventris* (Sclater, 1852)
White-bellied Dacnis



Fêmea

Tomaz Melo



Peru

Bolivia

Registros

Campus da Ufac, Rio Branco (Melo *et al.*, 2015).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus

Distribuição Geográfica

Espécie rara e com distribuição local na Amazônia. Ocorre no Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guianas e Brasil (Ridgely & Tudor, 1994; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2011).


Status

Residente (provável).

saí-de-máscara-preta – *Dacnis lineata* (Gmelin, 1789)
Black-faced Dacnis



Macho



Robson Czaban

saí-amarela – *Dacnis flaviventer* d'Orbigny & Lafresnaye, 1837
Yellow-bellied Dacnis



Macho



Robson Czaban

Registros

Arredores da cidade de Rio Branco, Seringal Nova Empresa (Hidasi, J., CPJH 1625); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52681, 52682); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63664); Município de Jordão, localidades Pará, Távora, Manaus (Dantas, n. p. - 2010).

Habitat

Dossel de FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD.

Distribuição Geográfica

Norte da América do Sul, das Guianas até a Bolívia (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Isler & Isler, 1999; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.

Registros

Rio Juruá, arredores da cidade de Cruzeiro do Sul (Novaes, 1957, 1958, MPEG 23866); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63663, 64585); Município de Jordão, Localidade Veneza (Dantas, n. p. - 2010).

Habitat

Dossel de FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Centro-oeste da Amazônia, da Venezuela até a Bolívia (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Isler & Isler, 1999; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.

saí-azul – *Dacnis cayana* (Linnaeus, 1766)
Blue Dacnis



Macho

Celso B. Almeida



saí-de-bico-curto – *Cyanerpes nitidus* (Hartlaub, 1847)
Short-billed Honeycreeper



Macho

Ciro Albano



Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63605); Município de Jordão, localidades Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010).

Habitat

Dossel de FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD.

Distribuição Geográfica

Na América Central, de Honduras ao Panamá e na América do Sul, das Guianas até a Argentina. Ocorre em todo o Brasil (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Isler & Isler, 1999; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

São reconhecidas oito subespécies. A forma que ocorre no acre é, segundo a distribuição geográfica, a *D. c. cayana* (Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.

Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62181, 62182, 62183); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

Dossel de FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Centro-oeste da Amazônia, da Colômbia ao Peru (Ridgely & Tudor, 1994; Isler & Isler, 1999; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.

saí-de-perna-amarela – *Cyanerpes caeruleus* (Linnaeus, 1758)

Purple Honeycreeper



Macho



Robson Czaban

saíra-beija-flor – *Cyanerpes cyaneus* (Linnaeus, 1766)

Red-legged Honeycreeper



Macho



Sílvia Faustino Linhares

Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Cruzeiro do Vale, Colônia Dois Portos (Guilherme & Borges, 2011, MPEG 62184); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63833); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

Dossel de FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

No sul da América Central (Panamá) e no norte da América do Sul, das Guianas até a Bolívia (Ridgely & Tudor, 1994; Isler & Isler, 1999; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

São reconhecidas cinco subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *C. c. microrhynchus* (Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.

Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009).

Habitat

Dossel de FOA com palmeiras, FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Na América Central, do México (incluindo Cuba e Jamaica) ao Panamá e no norte da América do Sul, das Guianas até a Bolívia. Ocorre, também, no extremo leste do Brasil, de Pernambuco ao Rio de Janeiro (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Isler & Isler, 1999; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

São reconhecidas 11 subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *C. c. violaceus* (Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.

saí-verde – *Chlorophanes spiza* (Linnaeus, 1758)
Green Honeycreeper



Macho



Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MZUSP 42813); Rio das Minas, margem esquerda, Município de Porto Walter, Localidade Gustavo (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52939); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48460); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão e localidades Pará, Manaus e Veneza (Dantas, n. p. - 2010; MPEG 71390); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011, MPEG 63418); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

Dossel de FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Na América Central, do México ao Panamá e no norte da América do Sul, das Guianas até a Bolívia. Ocorre, também, no extremo leste do Brasil, de Pernambuco a Santa Catarina (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Isler & Isler, 1999; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

São reconhecidas sete subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *C. s. caerulescens* (Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.

saíra-de-papo-preto – *Hemithraupis guira* (Linnaeus, 1766)
Guira Tanager



Macho



Registros

Arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35845); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64512); Rio Jurupari, Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010).

Habitat

Dossel de FOA com palmeiras/bambus, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

América do Sul, das Guianas até a Argentina (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Isler & Isler, 1999; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

São reconhecidas oito subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *H. g. huambina* (Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.

saíra-galega – *Hemithraupis flavicollis* (Vieillot, 1818)
Yellow-backed Tanager



Macho



Roseanne Almeida

Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Distribuição disjunta, do Panamá até a Bolívia e no extremo leste do Brasil, de Pernambuco ao Rio de Janeiro (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Isler & Isler, 1999; Hoyo *et al.*, 2011).


Taxonomia

São reconhecidas 11 subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *H. f. centralis* (Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.

figuinha-de-rabo-castanho – *Conirostrum speciosum* (Temminck, 1824)
Chestnut-vented Conebill



Macho



Celso B. Almeida

Registros

Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Dantas, 2011).

Habitat

FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Na calha sul do Solimões/Amazonas em direção ao sul do continente, no Brasil, Peru, Bolívia, Paraguai e extremo norte da Argentina. Ocorre pontualmente no norte da América do Sul, das Guianas até a Bolívia. (Ridgely & Tudor, 1994; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *C. s. speciosum* (Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.

canário-da-terra-verdadeiro – *Sicalis flaveola* (Linnaeus, 1766)
Saffron Finch




Macho



tiziu – *Volatinia jacarina* (Linnaeus, 1766)
Blue-black Grassquit



Jovem



Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002, Suplemento); Rio Branco, Bairro Cidade Nova (Guilherme, 2000b); Cidade de Brasília (Guilherme, 2011).

Habitat

Área aberta, ambientes urbanos.

Distribuição Geográfica

Extremo norte da América do Sul (exceto Amazônia), das Guianas ao Peru e no norte e leste da Bolívia. Ocorre, também, do nordeste do Brasil até a Argentina e Uruguai (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

São reconhecidas cinco subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *S. f. pelzelni* (Hoyo *et al.*, 2011; Guilherme, 2011).

Status

Residente (introduzida).

Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Parque Zoológico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; AC 434; MPEG 60062, 60063); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); Estrada Transacrea (AC-090) Km 60, margem esquerda (Guilherme, E., MPEG 61466); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão (Dantas, n. p. - 2010); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Santos, 2011, MPEG 63422); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Reserva Humaitá – Ufac, setor norte (Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, borda de FOA aluvial, área aberta com cultivos ou pastagens, ambientes urbanos.

Distribuição Geográfica

América Central, do México ao Panamá e em quase toda a América do Sul, das Guianas ao norte do Chile e Argentina. Ocorre em todo o Brasil (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *V. j. jacarina* (Hoyo *et al.*, 2011).


Status

Residente.

cigarrinha-do-norte – *Sporophila schistacea* (Lawrence, 1862)
Slate-colored Seedeater



Tomaz Melo



Macho

Registros

Rio Juruá, arredores da cidade de Cruzeiro do Sul (Whittaker & Oren, 1999); Flona Macauã (Matuscelli, P., MZUSP 80250, 80251); Fazenda Experimental Catuaba (Melo, T. N., 2013 [Wikiaves - WA969695]); Município de Manoel Urbano (Melo, T. N., 2014 [Wikiaves - WA1225538]); Município de Brasiléia, Ramal do 13 (Guilherme, E., 2015 [Wikiaves - WA1634888]).

Habitat

FOA com bambus, FOD com bambus.

Distribuição Geográfica

América Central, do México ao Panamá e no norte da América do Sul, das Guianas até a Bolívia (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *S. s. longipennis* (Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.

coleiro-do-norte – *Sporophila americana* (Gmelin, 1789)
Wing-barred Seedeater



Ricardo Plácido



Macho

Registros

Cidade de Rio Branco, Bairro Jardim Europa (Guilherme, E., 2015 [Wikiaves - WA1696241]); Guilherme *et al.*, 2016); arredores da cidade de Brasiléia (Plácido, R. A., 2015 [Wikiaves - WA1876542]).

Habitat

Áreas abertas com gramíneas, ambientes urbanos.

Distribuição Geográfica

Desde Trinidad e Tobago até a Venezuela e Guiana Francesa. Está presente em quase toda a região sudeste da Amazônia brasileira (Hoyo *et al.*, 2011). Tudo indica que está ampliando sua área de ocorrência, a partir do desmatamento ao longo das principais estradas que cortam a região (Guilherme *et al.*, 2016).


Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *S. a. dispar* (Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente (provável).

papa-capim-de-caquetá – *Sporophila murallae* Chapman, 1915
Caqueta Seedeater



Macho



Robson Czaban

Registros

Município de Mâncio Lima, ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Município de Cruzeiro do Sul (Gomes, G. C., 2013 [Wikiaves - WA869862]).

Habitat

Borda de FOA aluvial, áreas abertas com gramíneas, ambientes urbanos.

Distribuição Geográfica

Oeste da Amazônia. Ocorre na Colômbia, Equador, Peru, Brasil e Bolívia (Ridgely & Tudor, 1994; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente (provável).

Nome anterior

Sporophila americana.

estrela-do-norte – *Sporophila bouvronides* (Lesson, 1831)
Lesson's Seedeater



Macho



Emerson Kaseker

Registros

Rio Juruá, arredores da cidade de Cruzeiro do Sul (Whittaker & Oren, 1999); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52676); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); arredores da cidade de Assis Brasil (Guilherme, 2004, AC 0092); Parque Zoológico e *Campus* da Ufac, Rio Branco (Guilherme, E., obs. pess.); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60862, 60863); Município de Mâncio Lima, Comunidade Santa Bárbara (Guilherme, E., AC 604); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

Área aberta com pastagens ou cultivares, borda de FOA aluvial, ambientes urbanos.

Distribuição Geográfica

No sul da América Central (Panamá) e no norte da América do Sul, das Guianas até a Colômbia. Aparece como migrante na Amazônia durante o período não reprodutivo (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Migrante intratropical (vinda do norte).

bigodinho – *Sporophila lineola* (Linnaeus, 1758)
Lined Seedeater



Macho



Edson Guilherme

Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001; AC 0384, 0746); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010).

Habitat

Área aberta com pastagens ou cultivares, borda de FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Sul da América do Sul (Argentina, Paraguai Bolívia e Brasil). Migra para o norte do continente durante o inverno austral (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Migrante austral.

papa-capim-preto-e-branco – *Sporophila luctuosa* (Lafresnaye, 1843)
Black-and-white Seedeater



Danilo Mota



Registros

Rio Juruá, arredores da cidade de Cruzeiro do Sul (Whittaker & Oren, 1999); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A., MPEG 4871, 4872, 4873); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002).

Habitat

Borda de FOA aluvial, área aberta com pastagens.

Distribuição Geográfica

Noroeste da América do Sul, da Venezuela até a Bolívia. Espécie encontrada em território brasileiro apenas no estado do Acre (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Migrante intratropical (vinda do oeste – a partir dos Andes).

Thraupidae **baiano** – *Sporophila nigricollis* (Vieillot, 1823)
Yellow-bellied Seedeater



Macho



Registros
Município de Tarauacá (Braga, J., 2010 [Wikiaves - WA264035]); Cidade de Rio Branco, Bairro Jardim Europa (Guilherme, E., 2015 [Wikiaves - WA1682701]).
Habitat
Borda de FOA aluvial, área aberta com pastagens.
Distribuição Geográfica
Ocorre da Costa Rica ao nordeste da Argentina. Os registros desta espécie na Amazônia são pontuais (Ridgely & Tudor, 1994; Hoyo <i>et al.</i> , 2011).
Taxonomia
São reconhecidas três subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a <i>S. n. nigricollis</i> (Hoyo <i>et al.</i> , 2011).
Status
Migrante intratropical.

Thraupidae **coleirinho** – *Sporophila caeruleascens* (Vieillot, 1823)
Double-collared Seedeater




Macho



Registros
Arredores da cidade de Plácido de Castro (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35877); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney <i>et al.</i> , n. p. - 1997); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen <i>et al.</i> , 2005); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011).
Habitat
Área aberta com pastagens ou cultivares, borda de FOA com palmeiras/bambus, borda de FOA aluvial.
Distribuição Geográfica
Sul da América do Sul, da Argentina até a Bolívia e o sul do Brasil. É considerada migrante austral na Amazônia (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Hoyo <i>et al.</i> , 2011).
Taxonomia
Foram descritas três subespécies. A forma que o ocorre no Acre é a <i>S. c. caeruleascens</i> (Pinto & Camargo, 1954; Hoyo <i>et al.</i> , 2011).
Status
Migrante intratropical (vinda do sul).




Macho



Celso B. Almeida



Fêmea



Marco Guedes

Registros

Rio Juruá, arredores da cidade de Cruzeiro do Sul (Novaes, 1957, MPEG 23564); arredores da cidade de Rio Branco (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35878); arredores da cidade de Rio Branco, Seringal Nova Empresa (Hidasi, J., CPJH 1914); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); arredores da cidade de Assis Brasil (Guilherme, 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60860, 60861); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61375); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63836, 63837); Cruzeiro do Sul, Estrada Canela Fina (Guilherme, E. AC 409, 440, 441); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, borda de FOA aluvial, área aberta com pastagens ou cultivares, ambientes urbanos.

Distribuição Geográfica

Norte da América do Sul (Amazônia), das Guianas até a Bolívia. No Brasil, além da Região Norte, foi encontrada pontualmente no Sudeste, em Minas Gerais (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.

Registros

Arredores da cidade de Rio Branco, Seringal Nova Empresa (Hidasi, J., LSUMZ 65068); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Parque Zoobotânico e *Campus* da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001, AC 0428); Cidade de Rio Branco, Bairro Tucumã (Guilherme, E. AC 030); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60849; Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); BR-364 a 40 Km da ponte sobre o Rio Liberdade, margem direita (sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco) (Guilherme, 2007, MPEG 60850); Estrada Transacrea (AC-090) Km 60, margem esquerda (Guilherme, E., MPEG 61467, 61468); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61376); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64486, 64515); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63838, 63839); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Santos, 2011, MPEG 63424); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Parque Estadual Chandless (Guilherme, E. & Marques, E., AC 0254); Município de Senador Guimard, Localidade Bonal (Guilherme, E. & Marques, E. L., AC 324); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal (Silva *et al.*, 2015; Marques, 2015); Município de Plácido de Castro, BR-364, Ramal do 45 (Marques, 2015); Município de Porto Acre, mata ripária adjacente à Reserva Humaitá, setor norte (Marques, 2015).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, borda de FOA com palmeiras, borda de FOA aluvial, FOD, área aberta com pastagens ou cultivares, ambientes urbanos.

Distribuição Geográfica

Do México até a Argentina e em todo o Brasil (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *S. a. torridus* (Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.

Nome anterior

Oryzoborus angolensis.

bicudo – *Sporophila maximiliani* (Cabanis, 1851)
Great-billed Seed-Finch



Fêmea



Hugo Viana

Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997; Guilherme, 2012).

Habitat

Borda de FOA aluvial (provável).

Distribuição Geográfica

Ocorre na América Central e no norte e leste da América do Sul (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. (Hoyo *et al.*, 2011). Ainda não se sabe qual das duas formas foi introduzida em território acreano.

Status

Residente (introduzida).

Comentários

O único registro desta espécie no estado do Acre foi a partir da observação de dois indivíduos em cativeiro (gaiola), em uma localidade do Alto Juruá. Segundo Whitney *et al.*, n.p. (1997), o morador local, dono dos espécimes, relatou tê-los capturado em um brejo próximo de sua moradia. A informação deste morador nos dá uma indicação de que pode haver pequenas populações de *S. maximiliani*, em liberdade, ao menos na porção oeste do estado do Acre.

sanhaçu-vermelho – *Piranga rubra* (Linnaeus, 1758)
Summer Tanager



Macho



Anselmo D'Afonseca

Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras.

Distribuição Geográfica

Da Califórnia (EUA) e México até o norte da América do Sul (Amazônia), das Guianas até a Bolívia. Trata-se de uma espécie migratória setentrional na América do Sul (Ridgely & Tudor, Isler & Isler, 1999; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que migra para o norte da América do Sul é a *P. r. rubra* (Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Migrante neártica.



Tomaz Melo



Macho

Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); arredores da cidade de Porto Valter (Whittaker & Oren, 1999); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52018; Whittaker & Oren, 1999; Whittaker *et al.*, 2002); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64527); Parque Zoobotânico, Ufac Rio Branco (Melo, T. N., 2013 [Wikiaves - WA908166]).

Habitat

Dossel de FOA com palmeiras, borda de FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

América do Norte e Central. Emigra para o extremo-oeste da Amazônia durante o inverno setentrional (Ridgely & Tudor, Isler & Isler, 1999; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia


Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Migratória neártica.



Anselmo D'Affonseca



Macho

Registros

Município de Capixaba, Fazenda Campo Lindo (Hidasi, J., CPJH 1717); arredores da cidade de Manoel Urbano (Silva, G. P., MPEG 34625); Alto Rio Moa, Igarapé Amil, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52811); Rio Tejo, a aproximadamente 5 Km da foz, REAJ (Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 52254, 52255); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal (Guilherme, E., MPEG 60055, 60056; Silva *et al.*, 2015); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Guilherme, E., MPEG 60875, 60876, 60877); Ramal Nabor Júnior, Km 26 (Guilherme, E., MPEG 60878); Floresta Estadual do Rio Gregório, próximo à ponte sobre o Rio Acuraua (Guilherme, 2007, MPEG 60879); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); BR-364, Km 80, Ramal Oco do Mundo, Km 16 (Guilherme, E., MPEG 64401, 64402); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63825); Município de Senador Guiomard, BR 364, Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015); BR 317, margem esquerda, área adjacente à Fazenda Sinuelo (Silva *et al.*, 2015).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana.

Distribuição Geográfica

Na América Central, do México ao Panamá, e no norte e sudeste da América do Sul, da Colômbia até a Argentina. No Brasil, ocorre na Amazônia e na Mata Atlântica (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Isler & Isler, 1999; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia


São reconhecidas 17 subespécies. A forma que ocorre no Acre é, de acordo com a distribuição geográfica, a *H. r. peruviana* (Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.



Macho



Robson Czaban

Registros

Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52685, 52686, 52687); Rio Juruá, margem esquerda, Localidade Sobral (Whittaker, A., MPEG 48466, 48467); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A., MPEG 48468, 48469, 48470); Rio Tejo, a aproximadamente 5 Km da foz, REAJ (Whittaker *et al.*, 2002, MPEG 52256, 52257); Flona Macaúã (Matuscelli, P., MZUSP 80252, 80253, 80254); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); BR-364, Seringal Sardinha (Guilherme, E., AC 0107); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Fazenda Experimental Catuaba – Ufac (Rasmussen *et al.*, 2005); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010, MPEG 58940, 58944, 59894); Reserva Humaitá – Ufac, entrada principal (Guilherme, E., MPEG 60057); Rio Liberdade, margem direita, próximo à Foz do Igarapé Novena (Guilherme, 2007, MPEG 60853, 60854); Estrada Transacreana (AC-090) Km 60, margem esquerda (Guilherme, E., MPEG 61469, 61470); Estrada Transacreana (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61377, 61378); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63606); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Rio Purus, Localidade Santa Cruz Velha (Guilherme & Santos, 2011, MPEG 63423); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63843, 63844); Município de Senador Guiomard, Localidade Bonal (Guilherme, E. & Souza, G. AC 534, 547); Município de Jordão, localidades Pará, Távora, Manaus e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013); BR-364, Ramal Novo Horizonte, Km 09 (Silva *et al.*, 2015).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus (preferencialmente em clareiras); FOA aluvial, campinarana.

Distribuição Geográfica

América Central, do México ao Panamá e norte da América do Sul, das Guianas até a Bolívia (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

Espécie Monotípica (ver Piacentini *et al.*, 2015).

Status

Residente.

Nome anterior

Cyanocompsa cyanoides, *Cyanoloxia cyanoides*.

Comentários


Este táxon é tratado por alguns autores como subespécie de *Cyanocompsa cyanoides* (Hoyo *et al.*, 2011).

fim-fim – *Euphonia chlorotica* (Linnaeus, 1766)
Purple-throated Euphonia



Casal

Celso B. Almeida



Registros

ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, 2001 - citado como *Euphonia xanthogaster*); Complexo de Florestas Públicas Estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório (Guilherme, 2007); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, área aberta com cultivares, ambientes urbanos.

Distribuição Geográfica

Das Guianas até a Argentina e em quase todo o Brasil (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Isler & Isler, 1999; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

São reconhecidas cinco subespécies. A forma que ocorre no Acre é, de acordo com a distribuição geográfica, *E. c. taczanowskii* (Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.

gaturamo-de-bico-grosso – *Euphonia lanirostris* d'Orbigny & Lafresnaye, 1837
Thick-billed Euphonia



Macho

Celso B. Almeida



Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 23914); Rio Juruá, margem direita, Localidade Porongaba (Whittaker, A., MPEG 48461); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); Rio Purus, Seringal Terra-Nova (Guilherme & Dantas, 2011); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 64582, 64583, 64584); Rio Envira, Localidade Novo Porto (Guilherme, E., MPEG 63850).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Na América Central, da Costa Rica ao Panamá e no noroeste da América do Sul, das Guianas até a Bolívia (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Isler & Isler, 1999; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

São reconhecidas cinco subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *E. l. melanura* (Novaes, 1957; Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.


Comentários

Em Novaes (1957), este táxon foi nominado como *Tangara lanirostris melanura*.

gaturamo-verde – *Euphonia chrysopasta* Sclater & Salvin, 1869
Golden-bellied Euphonia



Macho



Edson Guilherme

Registros

Rio Iquiri (Pinto & Camargo, 1954; MZUSP 35818); Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Rio Tejo, Base de Pesquisa Restauração (Oren, D. C., e equipe, MPEG 52248; Whittaker *et al.*, 2002); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004; ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Parque Zoobotânico da Ufac, Rio Branco (Guilherme, E., obs. pess.); Estrada Transacrea (AC-090), Ramal Jarinal (Guilherme & Santos, 2009, MPEG 61373); Estrada do Quixadá, Fazenda São Raimundo (Guilherme, E., MPEG 63604); BR-317, Km 164, Ramal da Gameleira, Km 04 (Guilherme, E., MPEG 64485); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, arredores da cidade de Jordão e localidades Pará, Manaus e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial, FOD, FOD submontana, campinarana.

Distribuição Geográfica

Norte da América do Sul (Amazônia), das Guianas até a Bolívia (Sick, 1997; Isler & Isler, 1999; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *E. c. chrysopasta* (Pinto & Camargo, 1954; Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.

Comentários

Em Pinto & Camargo (1954), este táxon foi nominado como *Tangara c. chrysopasta*.

gaturamo-de-barriga-branca – *Euphonia minuta* Cabanis, 1849
White-vented Euphonia



Marco Guedes



Macho

Registros

Arredores da cidade de Rio Branco, Seringal Nova Empresa (Hidasi, J., CPJH 1651, 1660); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whitney *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52677); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010).

Habitat

FOA com palmeiras, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

Na América Central, do México ao Panamá e no norte da América do Sul, das Guianas até a Bolívia (Sick, 1997; Isler & Isler, 1999; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

São reconhecidas duas subespécies. A forma que ocorre no Acre é a *E. m. minuta* (Hoyo *et al.*, 2011).


Status

Residente.

fim-fim-grande – *Euphonia xanthogaster* Sundevall, 1834
Orange-bellied Euphonia



Macho



Marco Guedes

gaturamo-do-norte – *Euphonia rufiventris* (Vieillot, 1819)
Rufous-bellied Euphonia



Macho



João Quental

Registros

Rio Juruá, Seringal Oriente (Novaes, 1957, MPEG 23903); Igarapé São Luiz, margem esquerda, PNSD (Whittaker *et al.*, n. p. - 1997, MPEG 52678); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Parque Nacional da Serra do Divisor, 106 Km a sudoeste de Cruzeiro do Sul (Aleixo, A. & Polleto, F., MPEG 58030); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Floresta Estadual do Antimary, Localidade Limoeiro (Guilherme, E., MPEG 60843); Reserva Humaitá – Ufac, setor leste (Guilherme, E., MPEG 63670); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e Localidade Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010.; MPEG 70047); Município de Jordão, localidades Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010); ARIE Japiim/Pentecoste (Guilherme *et al.*, n. p. - 2013).

Habitat

FOA com palmeiras/bambus, FOA aluvial.

Distribuição Geográfica

No sul da América Central (Panamá) e no norte da América do Sul, das Guianas até a Bolívia. No Brasil, além da Região Norte, ocorre, também, na Região Sudeste, da Bahia ao Rio de Janeiro (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Isler & Isler, 1999; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

São reconhecidas 11 subespécies. A forma que ocorre no Acre é, segundo a distribuição geográfica, a *E. x. cyanonota* (Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.

Comentários

Em Novaes (1957), este táxon foi nominado como *Tangara xanthogaster dilutior*. A presença desta espécie no Parque Zoobotânico da Ufac divulgada em Guilherme (2001) foi baseada em um espécime macho capturado em rede de neblina em 1999 que *a posteriori*, através de foto, mostrou tratar-se de *Euphonia chlorotica*.

Registros

Parque Nacional da Serra do Divisor (Whitney *et al.*, n. p. - 1997); Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002); Município de Mâncio Lima, campinarana (Aleixo, n. p. - 2003); Igarapé Velho Chico, margem oeste, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Baixo Rio Paratari, Comunidade Tabocal, PNSD (Aleixo & Poletto, n. p. - 2004); Parque Estadual Chandless (Buzzetti, 2008); Reserva Extrativista Chico Mendes (Mestre *et al.*, 2010); ESEC – Rio Acre (Aleixo & Guilherme, 2010); Rio Jurupari, Foz do Rio Jurupari e localidades Humaitá e Novo Oriente (Aleixo *et al.*, n. p. - 2010); Município de Jordão, localidades Pará e Veneza (Dantas, n. p. - 2010).

Habitat

FOA com palmeiras, FOA aluvial, campinarana.

Distribuição Geográfica

Norte da América do Sul (Amazônia), da Venezuela até a Bolívia (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Isler & Isler, 1999; Hoyo *et al.*, 2011).

Taxonomia

Espécie monotípica (Hoyo *et al.*, 2011).

Status

Residente.

gaturamo-bandeira – *Chlorophonia cyanea* (Thunberg, 1822)
Blue-naped Chlorophonia *



Marco Guedes



bico-de-lacre – *Estrilda astrild* (Linnaeus, 1758)
Common Waxbill



Edson Guilherme



Registros

Reserva Extrativista do Alto Juruá (Whittaker *et al.*, 2002, Suplemento).

Habitat

Borda de FOA com palmeiras (provável).

Distribuição Geográfica

Distribuição disjunta, das Guianas até a Bolívia e, no sudeste e sul do Brasil, até o Paraguai e Argentina (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Isler & Isler, 1999).

Taxonomia

São reconhecidas sete subespécies. A forma que ocorre no Acre deve ser, segundo a distribuição geográfica, a *C. c. longipennis* (Hoyo *et al.*, 2014).

Status

Ver Comentários.

Comentários

(*) Este registro precisa de confirmação (Guilherme, 2009; 2012).

Registros

Bairros da cidade de Rio Branco (Silva, 2004, AC 171, AC 785).

Habitat

Ambientes urbanos.

Distribuição Geográfica

Espécie nativa da África. Foi introduzida na América do Sul e em outros continentes. Ocorre, pontualmente, em quase todas as regiões do Brasil (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Hoyo *et al.* 2010).

Taxonomia

São reconhecidas 16 subespécies. Duas formas foram introduzidas em outros continentes, incluindo a América do Sul: *E. a. astrild* e *E. a. jagoensis* (Hoyo *et al.*, 2010).

Status

Residente (introduzida).

Comentários

Na cidade de Rio Branco, esta espécie deve ter sido solta por criadores de pássaros, ou então, ter escapado de alguns cativeiros (gaiolas). Atualmente, pode ser vista em diversos terrenos baldios, onde haja o capim conhecido como “colonião” (*Panicum maximum*), seu principal alimento. Já foi observada em vários bairros, muitas vezes, forrageando junto com *Sporophila castaneiventris*.

pardal – *Passer domesticus* (Linnaeus, 1758)

House Sparrow



Macho

**Registros**

Bairros da cidade de Rio Branco (Guilherme, 2000b); Município de Porto Acre, Vila do “V” (Guilherme, E., obs. pess.); Cidade de Manoel Urbano (Guilherme, E., obs. pess.); Cidade de Cruzeiro do Sul (Guilherme, E., obs. pess.); Cidade de Xapuri (Guilherme, E., obs. pess.).

Habitat

Ambientes urbanos.

Distribuição Geográfica

Espécie nativa da Europa e Ásia. Foi introduzida na América do Sul e em outros continentes. Ocorre em quase todo o Brasil (Ridgely & Tudor, 1994; Sick, 1997; Hoyo *et al.* 2009, Guilherme, 2000b).

Taxonomia

São reconhecidas 12 subespécies. A forma introduzida na América do Sul foi a *P. d. domesticus* (Hoyo *et al.*, 2009).

Status

Residente (introduzida).

Comentários

Esta espécie foi trazida para o Acre em 1998 (Guilherme, 2000b). Um membro aposentado do exército brasileiro disse-me que trouxe alguns exemplares de Uberlândia (MG) e os soltou em lugar próximo da antiga rodoviária de Rio Branco, no Bairro Cidade Nova. Desde então, a espécie começou a se espalhar pelas cidades do Estado, seguindo o trajeto das principais vias terrestres (BR-364 e 317).

**Referências bibliográficas**

- Acre. 2000.** Governo do Estado do Acre. Programa Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Acre – ZEE – Documento Final. Volume 1. SECTAMA. Rio Branco, Acre, Brasil.
- Aleixo, A. 2004.** Historical diversification of a terra-firme forest bird superspecies: a phylogeographic perspective on the role of different hypotheses of Amazonian diversification. *Evolution*, 58(6): 1303-1317.
- Aleixo, A. 2007.** Conceito de espécies e o eterno conflito entre continuidade e operacionalidade: uma proposta de normatização de critérios para o reconhecimento de espécies pelo comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos. *Revista Brasileira de Ornitologia*, 15(2): 297-310.
- Aleixo, A., Whitney, B. M., & Oren, D. C. 2000.** Range extensions of birds in southeastern Amazonia. *The Wilson Bulletin*, 112(1): 137-142.
- Aleixo, A.; Guilherme, E. & Zimmer, K. J. 2008.** First records of Yellow-cheeked Becard *Pachyrampus xanthogenys* for Brazil, with comments on the validity of *P. x. peruanus*. *Bulletin of the British Ornithological Club*, 128(4): 263-267.
- Aleixo, A. & Guilherme, E. 2008.** Avifauna da Estação Ecológica do Rio Acre, fronteira Brasil/Peru. *XVI Congresso Brasileiro de Ornitologia*, Palmas - TO.
- Aleixo A. & Guilherme, E. 2010.** Avifauna da Estação Ecológica do Rio Acre, estado do Acre, na fronteira Brasil/Peru: composição, distribuição ecológica e registros relevantes. *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Naturais*, 5(3):279-309.
- Alvarenga, H. M. F. & Guilherme, E. 2003.** The Aningas (Aves: Anhingidae) from the upper Tertiary (Miocene-Pliocene) of southwestern Amazonia. *Journal of Vertebrate Paleontology*, 23(3): 614-621.
- Alvarez-Alonso, J. & Whitney, B. M. 2003.** New distributional records of birds from white-sand forests of the northern Peruvian Amazon, with implications for biogeography of northern South America. *The Condor*, 105: 552-566.
- Anderson, A. B. 1981.** White-sand vegetation of Brazilian Amazônia. *Biotropica*, 13(3): 199-210.
- Ayres, J. M. & Clutton-Brock, T. H. 1992.** River boundaries and species range size in Amazonian Primates. *The American Naturalist*, 140(3): 531-537.
- Bates, J. M.; Hackett, S. J. & Goerck, J. M. 1999.** High levels of mitochondrial DNA differentiation in two lineages of Antbirds (*Drymophila* and *Hypocnemis*). *The Auk*, 116(4):1093-1106.
- Batista, R. S. S.; Aleixo, A.; Vallinoto, M.; Azevedo, L.; Rêgo, P. S.; Silveira, L. F.; Sampaio, I. ; Schneider, H. 2013.** Molecular systematics and taxonomic revision of the Amazonian Barred Woodcreeper complex (*Dendrocolaptes certhia*: *Dendrocolaptidae*), with description of a new species from the Xingu - Tocantins interfluvium. In: J. del Hoyo, A. Elliott e D. Christie. (Org.). *Handbook of the Birds of the World, Special Volume: New Species and Global Index*. 1ed. Barcelona: Lynx Edicions. p. 245-247.
- Belton, W. 1994.** *Aves do Rio Grande do Sul*. São Leopoldo: Editora Unisinos.
- Bencke, G. A. 2001.** *Lista de referência das aves do Rio Grande do Sul*. Porto Alegre: Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul (Publicações avulsas FZB, No. 10).
- Biancalana, R. N. & Magalhães, A. No Prelo.** First nesting record of the White-chinned Swift *Cypseloides cryptus* in the state of Acre, Brazil. *Revista Brasileira de Ornitologia*.
- Biancalana, R. N. 2015.** First documented record of the White-collared Swift *Streptoprocne zonaris* in the state of Acre with notes on its breeding biology. *Atualidades Ornitológicas*, 184: 21-21.
- Birdlife International, 2015.** *Data Zone Species*. Disponível em: <http://www.birdlife.org/datazone/species/search>. Acessado em 08 de julho de 2015.
- BirdLife International, 2016.** Species factsheet: *Primolius couloni*. Acessado a partir de <http://www.birdlife.org> em 26/06/2016.

- Borges, S. H.; Cohn-Haft, M.; Carvalhaes, A. M. P.; Henriques, L. M.; Pacheco, J. F. & Whittaker, A. 2001. Birds of Jaú National Park, Brazilian Amazon: Species Check-list, Biogeography and Conservation. *Ornitologia Neotropical*, 12:109-140.
- Borges, S. H. & Silva, J. M. C. 2012. A New Area of Endemism for Amazonian Birds in the Rio Negro Basin. *The Wilson Journal of Ornithology*, 124: 15-23.
- Buzzetti, D. 2008. Plano de Manejo do Parque Estadual Chandless. Avaliação Ecológica Rápida. Relatório do Grupo Aves. SOS Amazônia, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais do estado do Acre- SEMA-AC. Rio Branco, Acre.
- Brown, K. & Freitas, A. V. L. 2002. Diversidade Biológica no Alto Juruá: Avaliação, Causas e Manutenção. In: M. C. Cunha & M. B. Almeida (Eds.), *Enciclopédia da Floresta: O Alto Juruá: Práticas e Conhecimentos das Populações*. 33-42. São Paulo - SP: Companhia das Letras.
- Carlos, C. J., Straube, F. C. & Pacheco, J. F. 2010. Conceitos e definições sobre documentação de registros ornitológicos e critérios para elaboração de listas de aves para os estados brasileiros. *Revista Brasileira de Ornitologia*, 18(4): 355-361.
- Cavalcante, L. M. 2006. *Aspectos geológicos do Estado do Acre e implicações na evolução da paisagem*. Rio Branco - AC: Embrapa.
- Cavalcanti, F. C. S. 2002. *A Política Ambiental na Amazônia: um estudo sobre as reservas extrativistas*. Tese de Doutorado - Universidade Estadual de Campinas, Campinas - SP.
- CBRO. 2014. Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos. *Lista das aves do Brasil*, 11ª Edição. Disponível em: www.cbro.org.br/CBRO/listabr.htm. Acessado em 10 de novembro de 2014.
- Chaves, W., DeLuca, J. J., Silva, M. V. & Silva, D. P. 2010. Conservation of Threatened Wildlife in Southwestern Amazonia, Brazil. Conservation Leadership Programme, Final Report. Disponível em: <http://www.conservationleadershipprogramme.org>. Acesso em 08 de julho de 2015.
- Chesser, R. T. 1997. Patterns of seasonal and geographical distribution of austral migrant flycatchers (Tyrannidae) in Bolivia. *Ornithological Monographs*, 48:171-204.
- Clements, J. F. & Shany, N. 2001. *A field guide to the birds of Peru*. Temecula, California: Ibis Publishing Company.
- Cleary, D. 2001. Towards an environmental history of the Amazon - From Prehistory to the Nineteenth Century. *Latin American Research Review*, 36(2): 65-95.
- Cohn-Haft, M., Whittaker, A. & Stouffer, C. 1997. A new look at the "species-poor" central Amazon: the avifauna north of Manaus, Brazil. *Ornithological Monographs*, 48:205-235.
- Cracraft, J. 1985. Historical biogeography and patterns of differentiation within the South American avifauna: areas of endemism. *Ornithological Monographs*, 36:49-84.
- Cunha, R. M. & Duarte, A. F. 2005. Diferenças na climatologia das chuvas entre as regiões leste e oeste do Estado do Acre. *II Congresso de Estudantes e Bolsistas do Experimento LBA*, Manaus - AM.
- Cunha, M. C. & Almeida, M. B. (Orgs.) 2002. *Enciclopédia da Floresta: O Alto Juruá: Práticas e Conhecimentos das Populações*. São Paulo - SP: Companhia das Letras.
- Daly, D. C. & Silveira, M. 2002. Aspectos Florísticos da Bacia do Alto Juruá: História da Botânica, peculiaridades, afinidades e importância para a conservação. In: M. C. Cunha e M. B. Almeida (Orgs.), *Enciclopédia da Floresta: O Alto Juruá: Práticas e Conhecimentos das Populações*. 53-63. São Paulo - SP: Companhia das Letras.
- Davis, S. E. 1993. Seasonal status, relative abundance, and behavior of the birds of Concepción, Departamento Santa Cruz, Bolivia. *Fieldiana Zoology*, 71:1-33.
- Del Hoyo, J., Elliott, A. & Sargatal, J. (eds.). 1992. *Handbook of the birds of the world. Vol. 1. Ostrich to Ducks*. Barcelona, Spain: Lynx Edicions.
- Del Hoyo, J., Elliott, A. & Sargatal, J. (eds.). 1994. *Handbook of the birds of the world. Vol. 2. New world Vultures to Guinea-fowl*. Barcelona, Spain: Lynx Edicions.
- Del Hoyo, J., Elliott, A. & Sargatal, J. (eds.). 1996. *Handbook of the birds of the world. Vol. 3. Hoatzin to Auks*. Barcelona, Spain: Lynx Edicions.
- Del Hoyo, J., Elliott, A. & Sargatal, J. (eds.). 1997. *Handbook of the birds of the world. Vol. 4. Sandgrouse to Cuckoos*. Barcelona, Spain: Lynx Edicions.
- Del Hoyo, J., Elliott, A. & Sargatal, J. (eds.). 1999. *Handbook of the birds of the world. Vol. 5. Barn-owls to Hummingbirds*. Barcelona, Spain: Lynx Edicions.
- Del Hoyo, J., Elliott, A. & Sargatal, J. (eds.). 2001. *Handbook of the birds of the world. Vol. 6. Mousebirds to Hornbills*. Barcelona, Spain: Lynx Edicions.
- Del Hoyo, J., Elliott, A. & Sargatal, J. (eds.). 2002. *Handbook of the birds of the world. Vol. 7. Jacamars to Woodpeckers*. Barcelona, Spain: Lynx Edicions.
- Del Hoyo, J., Elliott, A. & Sargatal, J. (eds.). 2003. *Handbook of the birds of the world. Vol. 8. Broadbills to Tapaculos*. Barcelona, Spain: Lynx Edicions.
- Del Hoyo, J., Elliott, A. & Christie, D. A. (eds.). 2004. *Handbook of the birds of the world. Vol. 9. Cotingas to Pipits and Wagtails*. Barcelona, Spain: Lynx Edicions.
- Del Hoyo, J., Elliott, A. & Christie, D. A. (eds.). 2005. *Handbook of the birds of the world. Vol. 10. Cuckoo-Shrikes to Thrushes*. Barcelona, Spain: Lynx Edicions.
- Del Hoyo, J., Elliott, A. & Christie, D. A. (eds.). 2006. *Handbook of the birds of the world. Vol. 11. Old World Flycatchers to Old World Warblers*. Barcelona, Spain: Lynx Edicions.
- Del Hoyo, J., Elliott, A. & Christie, D. A. (eds.). 2009. *Handbook of the birds of the world. Vol. 14. Bush-shrikes to Old World Sparrows*. Barcelona, Spain: Lynx Edicions.
- Del Hoyo, J., Elliott, A. & Christie, D. A. (eds.). 2010. *Handbook of the birds of the world. Vol. 15. Weavers to New World Warblers*. Barcelona, Spain: Lynx Edicions.
- Del Hoyo, J., Elliott, A. & Christie, D. A. (eds.). 2011. *Handbook of the birds of the world. Vol. 16. Tanagers to New World Blackbirds*. Barcelona, Spain: Lynx Edicions.
- Del Hoyo, J., Elliott, A. & Christie, D. A. (eds.). 2013. *Handbook of the birds of the world. Special Volume: New Species and Global Index*. Barcelona, Spain: Lynx Edicions.
- DeLuca, J. J. 2012. Birds of conservation concern in eastern Acre, Brazil: distributional records, occupancy estimates, human-caused mortality, and opportunities for ecotourism. *Tropical Conservation Science*, 5(3): 301-319.
- Dornas, T. & Pinheiro, R. T. 2014. First record of Merlin *Falco columbarius* from Tocantins and a review of previous Brazilian records. *Revista Brasileira de Ornitologia*, 22(1), 49-52.
- DOU – Diário Oficial da União – Seção 1. 2014. Portaria Nº - 444, de 17 de dezembro de 2014. Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: <http://www.in.gov.br/autenticidade.htm>.
- Duarte, A. F. & Marcarenhas, M. D. M. 2007. Manifestações do bioclima do Acre sobre a saúde humana no contexto socioeconômico da Amazônia. *Amazônia: Ciência e Desenvolvimento*, 3(5): 149-162.
- Duarte, A. F. 2007. *Hidrometria no Acre: Clima medições e informações meteorológicas*. Vol. 1. EDUfac. Rio Branco, AC.
- Duarte, A. F. 2008. As chuvas, as queimadas e a fumaça da seca de 2008 no Acre. Universidade Federal do Acre - Grupo de Estudos e Serviços Ambientais. Disponível em: <http://www.acrebioclima.pro.br/>. Acessado in: 11/03/2012.
- Farias, G. B.; Pereira, G. A. e Silva, W. A. G. 2008. *Lista das aves de Pernambuco*. Recife: Observadores

de Aves de Pernambuco.

- Ferreira, E. 2013.** Florestas caducifólias e a ocorrência de bambu no Acre. *Jornal A GAZETA*, Rio Branco, Acre. Disponível em: <http://agazetadoacre.com/>. (Acesso em 04 de agosto de 2015).
- Ferreira, E. 2015.** Florestas estacionais no Acre. *Jornal A GAZETA*, Rio Branco, Acre, p. C1-2. Edição n. 8.731 de 21/07/2015.
- Forrester, B. C. 1993.** *Birding Brazil – A check-list and site guide*: 1-251. Irvane: John Geddes, Scotland.
- Frish, J. D. 1963.** Vozes da Amazônia com o lendário canto do Uirapuru. Long-Play 331/2 RPM. Gravadora Sabiá. Som Indústria e Comércio, São Paulo – SP.
- Frish, J. D. 2005.** *Aves Brasileiras, minha paixão: a vida e a obra de Johan Dalgas Frisch*. Dalgas Ecoltec. São Paulo – SP. 183p.
- Gagliardi, R. 2005.** *Lista das aves do Estado do Rio de Janeiro*. Versão 2011/01 http://www.ceo.org.br/listas_de_aves/RJ-Gagliardi.pdf (acesso em 14/07/2015).
- Gascon, C.; Lougheed, S. C. & Bogart, J. P. 1998.** Patterns of genetic population differentiation in four species of Amazonian frogs: A test of the riverine barrier hypothesis. *Biotropica*, 30(1):104-119.
- Gascon, C.; Malcolm, J. R.; Patton, J. L.; Silva, M. N. F.; Bogart, J. P.; Lougheed, S. C.; Peres, C. A.; Neckel, S. & Boag, P. T. 2000.** Riverine barriers and the geographic distribution of Amazonian species. *PNAS*, 97(25):13672-13677.
- Goeldi, E. A. 1894.** *As aves do Brasil*. Parte I. Rio de Janeiro: Livraria Clássica de Alves & Cia.
- Goeldi, E. A. 1900.** *As aves do Brasil*. Parte II. Rio de Janeiro: Livraria. Clássica de Alves & Cia.
- Governo do Acre 2015.** Portal de Informações do Estado do Acre. Site oficial do Governo do Estado do Acre. Disponível em: <http://www.ac.gov.br/>. Acessado em: 08/07/2015.
- Guilherme, E. 2000a.** Levantamento preliminar da avifauna do *Campus* e Parque Zoológico da Universidade Federal do Acre, Rio Branco, Acre. *VIII Congresso Brasileiro de Ornitologia*, Florianópolis - SC.
- Guilherme, E. 2000b.** On the arrival of the House sparrow (*Passer domesticus*) in Southwestern Amazon. *Melopsittacus*, 3(4): 171-172.
- Guilherme, E. 2001.** Comunidade de Aves do *Campus* e Parque Zoológico da Universidade Federal do Acre, Brasil. *Tangara*, 1(2):57-73.
- Guilherme, E. 2004.** Levantamento Ornitológico em Assis Brasil, Estado do Acre, na fronteira trinacional, Brasil, Peru e Bolívia. *XII Congresso Brasileiro de Ornitologia*, Blumenau - SC.
- Guilherme, E. 2007.** Levantamento preliminar da avifauna do complexo de florestas públicas estaduais do Mogno e dos rios Liberdade e Gregório, município de Tarauacá, estado do Acre, como subsídio para elaboração de seus planos de manejo. *Atualidades Ornitológicas*, 136:1-8.
- Guilherme, E. 2009.** *Avifauna do Estado do Acre: Composição, Distribuição Geográfica e Conservação*: 1-729. Tese de Doutorado. Universidade Federal do Pará/Museu Paraense Emílio Goeldi. Belém, Pará, Brasil.
- Guilherme, E. 2011.** Sobre a ocorrência do canário-da-terra-verdadeiro (*Sicalis flaveola*: Passeriformes, Emberizidae) na Amazônia Sul-Occidental. *Atualidades Ornitológicas*, 163: 22-23.
- Guilherme, E. 2012.** Birds of the Brazilian State of Acre: diversity, zoogeography, and conservation. *Revista Brasileira de Ornitologia*, 20: 393-442.
- Guilherme, E. 2013a.** A range extension for Várzea Thrush *Turdus sanchezorum* in south-west Amazonia. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, 133:249-251.
- Guilherme, E. 2013b.** A range extension of Striped Manakin *Machaeropterus striolatus* (Aves: Pipridae) based on records from southwestern Brazilian Amazon. *Check List*, 9:1530-1532.
- Guilherme, E.; Aleixo, A.; Guimarães, J. O.; Dias, P. R. F.; Amaral, P. P.; Zamora, L. M. & Souza, M. S. 2005.** Primeiro registro de *Phoenicoparrus jamesi* (Aves, Phoenicopteriformes) para o Brasil. *Revista Brasileira de Ornitologia*, 13(2): 212-214.
- Guilherme, E. & Aleixo, A. 2008.** Primeiros registros de *Xiphorhynchus chunchotambo* (Tschudi, 1884) (Dendrocolaptidae) no Brasil. *Revista Brasileira de Ornitologia*, 16(1):44-46.
- Guilherme, E. & Aleixo, A. 2011.** Estação Ecológica do Rio Acre. In: R. M. Valente, J. M. C. Silva, F. C. Straube, e J. L. X. Nascimento (Orgs.). *Conservação de Aves Migratórias Neárticas no Brasil*. 104-106. Conservação Internacional, Belém, Pará.
- Guilherme, E. & Borges, S. H. 2011.** Ornithological records from a campina/campinarana enclave on the upper Juruá river, Acre, Brazil. *The Wilson Journal of Ornithology*, 123(1):24-32.
- Guilherme, E. & Cintra, R. 2001.** Effects of intensity and age of selective logging and tree girdling on an understory bird community composition in central Amazonia, Brazil. *Ecotropica*, 7: 77-92.
- Guilherme, E. & Czaban, R. E. 2015.** First record of the Yellowish Pipit in Acre with notes on others grassland bird species in southwestern Amazonia. *Neotropical Biology and Conservation*, 10(3): 169-176.
- Guilherme, E. & Dantas, S. M. 2008a.** Resultados ornitológicos de uma pesquisa no Alto Rio Purus, Estado do Acre, Brasil. *XVI Congresso Brasileiro de Ornitologia*, Palmas -TO.
- Guilherme, E. & Dantas, S. M. 2008b.** First record of Ruby Topaz *Chrysolampis mosquitus* in Acre, Brazil. *Cotinga*, 30:84-85.
- Guilherme, E. & Dantas, S. M. 2011a.** Avifauna of the upper Purus river, State of Acre, Brazil. *Revista Brasileira de Ornitologia*, 19(2): 185-199.
- Guilherme, E. & Dantas, S. M. 2011b.** Alto Rio Purus, Foz do Rio Chandless. In: R. M. Valente, J. M. C. Silva, F. C. Straube, e J. L. X. Nascimento (Orgs.). *Conservação de Aves Migratórias Neárticas no Brasil*. 100-103. Conservação Internacional, Belém, Pará.
- Guilherme, E.; Nobre, H. R. & Gonzaga, L. P. 2003.** The first record of the avian near-obligate bamboo specialist dusky-tailed flatbill (*Ramphotrigon fuscicauda*) in the eastern Acre State, Brazil. *Lundiana*, 4(2): 157-159.
- Guilherme, E.; Pedroza, D.; Guimarães, D. P. & Lima, A. C. G. 2016.** First records of the Wing-barred Seedeater, *Sporophila Americana* (Thraupidae), for Acre and a revision of its distribution in the Brazilian Amazon. *Check List* 12(2): 1853. doi: <http://dx.doi.org/10.15560/12.2.1853>.
- Guilherme, E. & Santos, M. P. D. 2009.** Birds associated with bamboo forests in eastern Acre, Brazil. *Bulletin of the British Ornithological Club*, 129(4):229-240.
- Gyldenstolpe, N. 1945a.** A contribution to the ornithology of northern Bolivia. *Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar, Stockholm*, 23(1): 1-301.
- Gyldenstolpe, N. 1945b.** The bird fauna of Rio Juruá in western Brazil. *Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar, Stockholm*, 22: 1-338.
- Gyldenstolpe, N. 1951.** The Ornithology of the rio Purús region in western Brasil. *Arkiv För Zoologi, Ser.2. Stockholm*, 2: 1-320.
- Haffer, J. 1978.** Distribution of Amazon forest birds. *Bonner Zoologische Beiträge*, 29:38-78.
- Harvey, M.J.; Lane, D.F.; Hite, J.; Terrill, R.S.; Ramirez, S.F.; Smith, B.T.; Klicka, J.; Campos, W.V. 2014.** Notes on bird species in bamboo in northern Madre de Dios, Peru including the first Peruvian record of Acre Tody-Tyrant (*Hemitriccus cohnhafti*). *Occasional Papers*

of the Museum of Natural Science, 81:1-38.

- Hayes, F. E. 1995. Definitions for migrant birds: What is a Neotropical Migrant? *The Auk*, 112(2): 521-523.
- Heidrich, P., König, C., & Wink, M. 1995. Molecular phylogeny of South American screech owls of the *Otus atricapillus* complex (Aves: Strigidae) inferred from nucleotide sequences of the mitochondrial Cytochrome-b gene. *Zeitschrift für Naturforschung*, 50c: 294-302.
- Hellmayr, C. H. (1910). The birds of the rio Madeira. *Novitates Zool.*, 17: 257-428.
- Hidasi, J. 1983. Aves de Goiás: Goiânia, Fundação Museu Ornitológico de Goiânia.
- Hidasi, J. & Bankovics, A. 1997. The Family Pipridae (Aves) in the Ornithological Museum Goiania, Brasil. *Miscnea Zool. Hung.*, 11: 95-99.
- Hilty, S. L. & Brown, W. L. 1986. *A Guide To The Birds of Colombia*. New Jersey, EUA: Princeton University Press.
- Hinkelmann, C. 1996. Systematics and geographic variation in long-tailed hermit hummingbirds, the *Phaethornis superciliosus-malaris-longirostris* species group (Trochilidae), with notes on their biogeography. *Ornitologia Neotropical* 7: 119-148.
- Hu, D. S.; Joseph, L. & Agro, D. 2000. Distribution, variation, and taxonomy of *Topaza* Hummingbirds (Aves: Trochilidae). *Ornitologia Neotropical*, 11: 123-142.
- IBGE. 2005. *Potencial Florestal do Estado do Acre - Relatório Técnico*: 1-42. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
- IDEMA. 1999. *Lista atualizada das aves do estado do Rio Grande do Norte*. Natal, IDEMA Publicações.
- Ihering, H. V. 1904. Aves do Rio Juruá. *Revista do Museu Paulista*, 6: 426-452.
- ISA. 2015. Unidades de Conservação na Amazônia. Instituto Socioambiental. Disponível em: <http://www.socioambiental.org>. Acessado em: 07/08/2015.
- Isler, M. L. & Isler, P. R. 1999. *The Tanagers: natural history, distribution and identification*. Washington, D. C.: Smithsonian Institution Press.
- Isler, M. L.; Alvarez-Alonso, J.; Isler, P. R.; Valqui, T.; Begazo, A. & Whitney, B. M. 2002. Rediscovery of a cryptic species and description of a new subspecies in the *Myrmeciza hemimelaena* complex (Thamnophilidae) of the neotropics. *The Auk*, 119(2): 362
- Isler, M. L.; Isler, P. R. & Whitney, B. M. 2007. Species limits in Antbirds (Thamnophilidae): the Warbling Antbird (*Hypocnemis cantator*) complex. *The Auk*, 124(1): 11-28.
- Isler, M. L., Bravo, G. A. & Brumfield, R. T. 2013. Taxonomic revision of *Myrmeciza* (Aves: Passeriformes: Thamnophilidae) into 12 genera based on phylogenetic, morphological, behavioral, and ecological data. *Zootaxa* 3717 (4): 469-497.
- Jahn, A. E.; Davis, S. E. & Zankys, A. M. S. 2002. Patrones en la migración austral de aves entre temporadas y hábitats en el Chaco boliviano, con notas de observaciones y una lista de espécies. *Ecología en Bolivia*, 37(2): 31-50.
- Jirka, S.; McDonald, A. J.; Johnson, M. S.; Feldpausch, T. R.; Couto, E. G. & Riha, S. J. 2007. Relationships between soil hydrology and forest structure and composition in the southern Brazilian Amazon. *Journal of Vegetation Science*, 18: 183-194.
- Lane, D. F., Servat, G. P., Valqui H., T., & Lambert, F. 2007. A distinctive new species of Tyrant flycatcher (Passeriformes: Tyrannidae: *Cnipodectes*) from southwestern Peru. *The Auk*, 124(3): 762-772.
- Latrubesse, E., 2000. The Late Pleistocene in Amazonia: a Palaeoclimatic Approach. In: P. Smolka & W. Volkheimer (eds). *Southern Hemisphere Paleo and Neoclimates*. Springer-Verlag, 209-222.
- Latrubesse, E. M., Bocquentin, J., Santos, J. C. R., & Ramonell, C. G. 1997. Paleoenvironmental model for the late Cenozoic of Southwestern Amazonia: Paleontology and Geology. *Acta Amazonica*, 27(2): 103-118.
- Latrubesse, E. & Rancy, A. 1998. The Late Quaternary of the Upper Juruá River, southwestern Amazonia, Brazil: Geology and Vertebrate Paleontology. *Quaternary of South America and Antarctic Peninsula*, 11: 27-46.
- Latrubesse, E. & Rancy, A. 2000. Neotectonic influence on tropical rivers of southwestern Amazon during the late Quaternary: the Moa and Ipixuna river basins, Brazil. *Quaternary International*, 72: 67-72.
- Latrubesse, E. M., Villanueva, J. B., Negri, F. R., Rancy, A., & Brito, P. 1994. Novos dados sobre a estratigrafia do Cretáceo da Serra do Divisor, Acre, Brasil. 38º Congresso Brasileiro de Geologia, Balneário Camboriú - SC.
- Latrubesse, E. M.; Cozzuol, M.; Silva-Caminha, S. A. F.; Rigsby, C. A.; Absy, M. L. & Jaramillo, C. 2010. The late Miocene paleogeography of the Amazon Basin and the evolution of the Amazon River system. *Earth Sciences Reviews*, 99: 99-124.
- Lees, A. C.; Naka, L. N.; Aleixo, A.; Cohn-Haft, M.; Piacentini, V. Q.; Santos, M. P. D. & Silveira, L. F. 2014. Conducting rigorous avian inventories: Amazonian case studies and a roadmap for improvement. *Revista Brasileira de Ornitologia*, 22: 107-120.
- Lima, J. M., Portela, R. & Guilherme, E. 2014. Registro de predação do socó-boi (*Tigrisoma lineatum*) por jacaretinga (*Caiman crocodilus*) no Parque Zoológico da Universidade Federal do Acre, Rio Branco, Acre, Brasil. *Atualidades Ornitológicas*, 181: 25.
- Lorenzi, H.; Souza, H. M.; Costa, J. T. M.; Cerqueira, L. S. C. & Ferreira, E. J. L. 2004. *Palmeiras brasileiras e exóticas cultivadas*. São Paulo: Instituto Plantarum de Estudos da Flora.
- Machado, A. B. M.; Drummond, G. M. & Paglia, A. P. 2008. *Livro Vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção*. 1ª Ed. - Brasília, DF: MMA. Belo Horizonte, MG: Fundação Biodiversitas.
- Machado, C. G. & Borges, O. B. 2013. *Lista vermelha das aves do Estado da Bahia, Brasil*. Versão novembro 2013. <http://www.listavermelhabahia.org.br/pdf/Aves-lista-previa.pdf>. (acesso em 14/07/2015).
- Machado, T. L. S. 2014. *Efeito das queimadas não recorrentes sobre a avifauna de sub-bosque em fragmentos florestais de terra-firme no leste do estado do Acre*: 1-69. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Acre. Rio Branco, Acre, Brasil.
- Marin, M. 1997. Species limits and distribution of some New World Spine-tailed Swifts (*Chaetura spp.*). In: J. J. V. Remsen (Ed.), *Studies in Neotropical Ornithology honoring Ted Parker*. Washington, D. C.: American Ornithologists' Union: *Ornithological Monographs*, 48: 431-443.
- Marini, M. A. & Garcia, F. I. 2005. Conservação de Aves no Brasil. *Megadiversidade*, 1(1): 95-102.
- Marques, E. L. 2015. *O Papel das matas ripárias na manutenção das aves de sub-bosque no Leste do estado do Acre, Brasil*: 1-84. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Acre. Rio Branco, Acre, Brasil.
- Marques, E. L. & Guilherme, E. 2014. Primeiro registro de *Geothlypis agilis* (Passeriformes: Parulidae) no Estado do Acre, Brasil. *Atualidades Ornitológicas*, 178: 26-26.
- Mattos, G. T., Andrade, M. A., & Freitas, M. V. 1993. *Nova lista de aves do estado de Minas Gerais*: Fundação Acangá, Belo Horizonte.
- Melo, T. N. 2015a. *Estratégias de forrageio, preferência de habitat e coexistência de *Ramphotrigon fuscicauda* e *Ramphotrigon megacephalum* no leste do Acre*: 1-56. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Acre. Rio Branco, Acre, Brasil.

- Melo, T. N. 2015b. Uso de substratos antrópicos no forrageio do arapaçu-galinha *Dendrexetastes rufifigula* (Lesson, 1844) (Passeriformes: Dendrocolaptidae). *Atualidades Ornitológicas*, 188:23.
- Melo, T. N.; Araujo, R.; Lima, M. A.; Guilherme, E.; Xavier, R. S. 2015. First record of White-bellied Dacnis *Dacnis albiventris* (Passeriformes: Thraupidae) for the state of Acre with notes on its foraging behaviour. *Cotinga*, 37:59-60.
- Melo, T. N.; Borges, L. H. M.; Moura, A. L. B. No Prelo. Behaviour and plumage of juvenile Rufous-vented Ground Cuckoo *Neomorphus g. geoffroyi*, with new records for Acre state, Amazonian Brazil. *Cotinga*.
- Melo, T. N.; Olmos, F.; Quental, J. 2015. New records of *Picumnus subtilis* (Aves: Picidae), *Cnipodectes superrufus* and *Hemitriccus cobnhafti* (Aves: Rhynchocyclidae) in Acre, Brazil. *Check List*, 11:1-4.
- Mestre, L. A. M.; Barlow, J.; Thorn, G. & Cochrane, M. A. 2009. Burned forests as a novel habitat for the black-faced cotinga (*Conioptilon mcilhennyi*) in the western Brazilian Amazon: *Ornitologia Neotropical*, 20(3): 467-470.
- Mestre, L. A. M. & Bierregaard, R. O. Jr. 2009. The role of Amazonian rivers for wintering ospreys (*Pandion haliaetus*): clues from North American band recoveries in Brazil between 1937 and 2006. *Studies on Neotropical Fauna and Environment*, 44:1-7.
- Mestre, L. A. M., Roos, A. L. & Nunes, M. F. 2010b. Análise das recuperações no Brasil de aves anilhadas no exterior entre 1927 e 2006. *Ornitologia*, 4(1): 15-35.
- Mestre, L. A. M.; Thom, G.; Cochrane, M. A. & Barlow, J. 2010a. The birds of Reserva Extrativista Chico Mendes, South Acre, Brazil. *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Naturais*, 5(3):311-333.
- Milani, E. J. & Thomaz Filho, A. 2000. Sedimentary Basins of South America. In: Cordani, U. G., Milani, E. J., Thomaz Filho, A. Campos, D. A. (Eds.). *Tectonic Evolution of South America*. 389-449. Rio de Janeiro, 31st. IGC.
- Miranda, L.; Aleixo, A.; Whitney, B. M.; Silveira, L. F.; Guilherme, E.; Santos, M. P. D.; Schneider, M. P. C. 2013. Molecular systematics and taxonomic revision of the Ihering's Antwren complex (*Myrmotherula iheringi*: Thamnophilidae), with description of a new species from southwestern Amazonia. In: Josep del Hoyo, Andrew Elliott, Jordi Sargatal, David A. Christie. (Org.). *Handbook of the Birds of the World, Special Volume: New Species and Global Index*. Barcelona: Lynx Edicions. p. 268-271.
- Naka, L. N.; Cohn-Haft, M.; Mallet-Rodrigues, F.; Santos, M. P. D. & Torres, M. F. 2006. The avifauna of the Brazilian state of Roraima: bird distribution and biogeography in the Rio Branco basin. *Revista Brasileira de Ornitologia*, 14(3): 197-238.
- Naka, L. N. & Rodrigues, M. 2000. *As aves da Ilha de Santa Catarina*. Florianópolis, SC: Editora UFSC.
- Navarro, A. G.; Peterson, A. T.; López-Medrano, E.; Benítez-Díaz, H. 2001. Species limits in Mesoamerican *Aulacorhynchus* toucanets. *Wilson Bulletin*, 113: 363-494.
- Nicole, I. G. 2000. *Estudo de cerâmicas de sítios com estrutura de terra circulares do alto curso do Rio Purus, por meio de métodos geoquímicos: Datação e caracterização*. Universidade Federal Fluminense. Tese de Doutorado.
- Novaes, F. C. 1957. Contribuição à ornitologia do noroeste do Acre. *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, Nova Série Zoologia*, 9:1-29.
- Novaes, F. C. 1958. As aves e as comunidades bióticas no Alto Rio Juruá, Território do Acre. *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, Nova Série Zoologia*, 14: 1-13.
- Novaes, F. C. 1974. Ornitologia do Território do Amapá I. *Publicações Avulsas do Museu Paraense Emílio Goeldi*, 25: 1-121.
- Novaes, F. C. 1978. Sobre algumas aves pouco conhecidas da Amazônia brasileira II. *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, Nova Série Zoologia*, 90: 1-15.
- Olalla, A. M. 1937. Um viaje a pesquisas zoológicas hacia el Rio Juruá, Estado del Amazonas, Brasil - 1936. *Revista do Museu Paulista*, XXIII: 233-279.
- O'Neill, J. P. 1974. *The birds of Balta, a Peruvian dry tropical forest locality with an analysis of their origins and relationships*. PhD Thesis. Louisiana State University, Baton Rouge, USA.
- O'Neill, J. P. 2003. Avifauna de la región de Balta, un poblado cashinahua en el río Curanja. In: R. L. Pitman, N. Pitman e P. Álvarez (Eds.): *Alto Purús: Biodiversidad, Conservación y Manejo*: 97-107. Capítulo 11. Nicholas School of the Environment, Duke University.
- O'Neill, J. P.; Lane, D. F. & Naka, L. N. 2011. A Cryptic New Species of Thrush (Turdidae: *Turdus*) from Western Amazonia. *The Condor*, 113: 869-880.
- Oren, D. C. 1991. Aves do Estado do Maranhão, Brasil. *Goeldiana - Zoologia*: 1-55.
- Pacheco, J. F. & Parrini, R. 2002. Breve histórico do conhecimento da avifauna da região do Alto Juruá. In: M. C. Cunha & M. B. Almeida (Eds.), *Enciclopédia da Floresta: O Alto Juruá: Práticas e Conhecimentos das Populações*: 77-79. São Paulo - SP: Companhia das Letras.
- Parker, T. A. III. & Remsen, J. J. V. 1987. Fifty-two Amazonian birds species new to Bolivia. *Bulletin of the British Ornithological*, 107(3): 94-107.
- Patton, J. L. & Silva, M. N. F. 1998. Rivers, Refuges, and Ridges, The geography of speciation of Amazonian Mammals. In: D. J. Howard e S. H. Berlocher (Eds.), *Endless Forms: Species and Speciation*: 202-213. New York: Oxford University.
- Patton, J. L.; Silva, M. N. F. & Malcolm, J. R. 1994. Gene genealogy and differentiation among arboreal Spiny Rats (Rodentia: Echimyidae) of the Amazon basin: a test of the riverine barrier hypothesis. *Evolution*, 48(4): 1314-1323.
- Paynter, R.A. Jr. (Ed.). 1968. *Check-list of birds of the world*. Vol. 14. Museum of Comparative Zoology, Cambridge, Massachusetts. 443 pp.
- Paynter, R. A., Jr. & Traylor, J. M. A. J. 1991. *Ornithological Gazetteer of Brazil*. Cambridge, Massachusetts: Museum of Comparative Zoology, Harvard University.
- Peres, C. A. 1990. A Harpy Eagle successfully captures an adult male Red Howler Monkey. *The Wilson Bulletin*, 102(3): 560-561.
- Peres, C. A. 1993. Notes on the Primates of the Juruá River, Western Brazilian Amazonia. *Folia Primatol.*, 61: 97-103.
- Peres, C. A. 1996. Ungulate ectoparasite removal by Black Caracaras and Pale-winged Trumpeters in Amazonian forests. *The Wilson Bulletin*, 108(1): 170-175.
- Peres, C. A.; Patton, J. L. & Silva, M. N. F. 1996. Riverine barriers and gene flow in Amazonian saddle-back tamarins. *Folia Primatologica*, 67(3): 113-124.
- Perlo, v. B. 2009. *A Field Guide to the Birds of Brazil*. 1-465. Oxford University Press, New York.
- Piacentini, V. Q.; Aleixo, A.; Agne, C. E.; Maurício, G. N.; Pacheco, J. F.; Bravo, G. A.; Brito, G. R. R.; Naka, L. N.; Olmos, F.; Posso, S.; Silveira, L. F.; Betini, G. S.; Carrano, E.; Franz, I.; Lees, A. C.; Lima, L. M.; Pioli, D.; Schunck, F.; Amaral, F. R.; Bencke, G. A.; Cohn-Haft, M.; Figueiredo, L. F. A.; Straube F. C. & Cesari, E. 2015. Annotated checklist of the birds of Brazil by the Brazilian Ornithological Records Committee / Lista

- comentada das aves do Brasil pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos. *Revista Brasileira de Ornitologia*, 23(2): 91–298.
- Pierpont, N. & Fitzpatrick, J. W. 1983.** Specific status and behaviour of *Cymbilaimus sanctaemariae*, the bamboo antshrike, from southwestern Amazonia. *The Auk*, 100: 645-652.
- Pimenta, J. 2003.** História do Acre: Evolução da questão indígena: Dos primeiros contatos com os brancos até a criação e afirmação do movimento indígena contemporâneo. *Linguagens Amazônicas*, 2: 27-44.
- Pinheiro, B. F. & Turci, L. C. B. 2013.** Vertebrados Atropelados na Estrada da Variante (BR-307), Cruzeiro do Sul, Acre, Brasil. *Natureza On Line*, 11: 68-78.
- Pinto, O. M. O. & Camargo, E. A. 1954.** Resultados ornitológicos de uma expedição ao território do Acre pelo Departamento de Zoologia. *Papéis Avulsos do Departamento de Zoologia*, 23:371-418.
- Pinto, O. M. O. 1938.** Catálogo das aves do Brasil e lista dos exemplares que as representam no Museu Paulista. 1ª. Parte: Aves não Passeriformes e Passeriformes não Oscines, excluída a Família Tyrannidae e seguintes. *Revista do Museu Paulista*, 22 (1937): 1-556.
- Pinto, O. M. O. 1944.** *Catálogo das aves do Brasil e lista dos exemplares existentes na coleção do Departamento de Zoologia, 2.a Parte. Ordem Passeriformes (continuação): Superfamília Tyrannoidea e Subordem Passeres.* São Paulo: Departamento de Zoologia, Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio.
- Pinto, O. M. O. 1978.** *Novo Catálogo das Aves do Brasil. Primeira Parte. Aves não Passeriformes e Passeriformes não Oscines, com exclusão da Família Tyrannidae.* São Paulo: Empr. Gráf. Revista dos Tribunais.
- Poletto, F. & Aleixo, A. 2005.** Implicações biogeográficas de novos registros ornitológicos em um enclave de vegetação de campina no sudoeste da Amazônia brasileira. *Revista Brasileira de Zoologia*, 22(4): 1196-1200.
- Rancy, A. 1985.** Estudos de paleovertebrados na Amazônia Ocidental. MME/DNPM, Sér. *Geologia*, 27(2): 99-103. 1985.
- Rasmussen, D. T.; Rehg, J. & Guilherme, E. 2005.** Avifauna da Fazenda Experimental Catuaba: Uma pequena reserva florestal no leste do Estado do Acre, Brasil. In: P. M. Drumond (Org.): *Fauna do Acre*: 173-198. EDUFAC, Rio Branco.
- Rego, M. A.; Dantas, S. M.; Guilherme, E. & Martuscelli, P. 2009.** First records of the Fine-barred Piculet (*Picumnus subtilis*) for Brazil. *Bulletin of the British Ornithological Club*, 129(3):182-185.
- Remsen, J. J. V. & Parker, T. A. III. 1983.** Contribution of river-created habitats to bird species richness in Amazonia. *Biotropica*, 15(3): 223-231.
- Remsen, J. J. V. & Traylor, J. M. A. 1989.** *An annotated list of the birds of Bolivia.* 1-79. Buteo Books, Vermillion, South Dakota.
- Restall, R., Rodner, C., & Lentino, M. 2006.** *Birds of Northern South America: An Identification Guide.* New Haven and London: Yale University Press.
- Ridgely, R. S. & Tudor, G. 1994.** *The birds of South America*: 2:1-814. University of Texas Press, Austin.
- Ridgely, R. S. & Tudor, G. 2009.** *Field Guide to the Songbirds of South America. The Passerines.* Austin: University of Texas press.
- Roig, H. L. & Martini, A. 2002.** Geologia e Geomorfologia. In: M. C. Cunha e M. B. Almeida (Orgs.), *Enciclopédia da Floresta: O Alto Juruá: Práticas e Conhecimentos das Populações*: 43-50. São Paulo - SP: Companhia das Letras.
- Rodrigues, E. B.; Aleixo, A.; Whittaker, A.; Naka, L. N. 2013.** Molecular systematics and taxonomic revision of the Lineated Woodcreeper complex (*Lepidocolaptes albolineatus*: Dendrocolaptidae), with description of a new species from southwestern Amazonia. In: J. del Hoyo, A. Elliott e D. Christie. (Org.). *Handbook of the Birds of the World, Special Volume: New Species and Global Index.* 1ed. Barcelona: Lynx Edicions. p. 248-252.
- Ruiz-Pérez, M.; Almeida, M.; Dewi, S.; Costa, E. M. L.; Pantoja, M. C.; Puntodewo, A.; Postigo, A. A. & Andrade, A. G. 2005.** Conservation and development in Amazonian Extractive Reserves: The case of Alto Juruá. *AMBIO*, 34, 218-223.
- Ruschi, A. 1967.** Lista atual das aves do estado do Espírito Santo. *Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão*, 28A: 1-45.
- Santos, M. P. D. 2005.** *Avifauna do Estado de Roraima: Biogeografia e Conservação.* Tese de Doutorado. Universidade Federal do Pará/Museu Paraense Emílio Goeldi.
- Scarcello, M. C. G. (Ed.). 1999.** *Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra do Divisor (PNSD).* Rio Branco: SOS Amazônia/IBAMA/The Nature Conservancy/USAID.
- Scherer-Neto, P. & Straube, F. C. 1995.** *Aves do Paraná - História, Lista Anotada e Bibliografia.* Campo Largo: Logos.
- Scherer-Neto, P.; Straube, F.C.; Carrano, E. & Urben-Filho, A. 2011.** Lista das aves do Paraná. Curitiba, Hori Consultoria Ambiental. Hori Cadernos Técnicos nº 2. 130 pp.
- Schulenberg, T. S.; Stotz, D. F.; Lane, D. F.; O'Neill, J. P. & Parker III, T. A. 2007.** *Birds of Peru*: 1-656. Princeton University Press, New Jersey.
- Schulz-Neto, A. 1995.** *Lista das aves da Paraíba.* João Pessoa: IBAMA, Superintendência Regional na Paraíba.
- Sick, H. 1985.** *Ornitologia Brasileira, uma introdução.* Vols. 1 and 2. Brasília: Ed. Universidade de Brasília.
- Sick, H. 1997.** *Ornitologia Brasileira*: 1-862. Editora Nova Fronteira, Rio de Janeiro.
- Silva, E. G. 2004.** Ocorrência do passarinho africano *Estrilda astrild* (Passeriformes: Estrildidae) em Rio Branco, Estado do Acre - Brasil. In: R. Cintra (Ed.), *História natural, ecologia e conservação de algumas espécies de plantas e animais da Amazônia*: p. 255-256. Manaus - AM: EDUA/INPA.
- Silva, E. G. & Bocquentin, J. 1993.** Deformidades ósseas em Acciptrídeos: acidente ou matança indiscriminada? *III Congresso Brasileiro de Ornitologia*, Pelotas - RS.
- Silva, E. G. & Bocquentin, J. 1994.** Ocorrência da Garça-vaqueira *Bubulcus ibis* no Estado do Acre. *IV Congresso Brasileiro de Ornitologia*, Recife - PE.
- Silva, J. M. C.; Rylands, A. B.; Silva J. S. J.; Gascon, C. & Fonseca, G. A. B. 2005a.** Primate diversity patterns and their conservation in Amazonia. In: Purvis, A., Gittleman, J. L. e Brooks, T. (Eds.), *Phylogeny and Conservation*: 337-364: Cambridge, Cambridge University Press.
- Silva, J. M. C.; Rylands, A. B. & Fonseca, G. A. B. 2005b.** O destino das áreas de endemismo da Amazônia. *Megadiversidade*, 1(1): 124-131.
- Silva, T. L.; Marques, E. L. & Guilherme, E. 2015.** Recuperation of the Terra Firme Forest Understory Bird Fauna Eight Years after a Wildfire in Eastern Acre, Brazil. *International Journal of Ecology*, <http://dx.doi.org/10.1155/2015/324048>.
- Silva, W. A. G. & Albano, C. G. 2002.** *Lista remissiva da avifauna cearense.* www.oap.org.br/listaCE.htm (acesso em 14/07/2015).
- Silveira, M. 2003.** Vegetação e Flora das campinaranas do Sudoeste Amazônico (JU-008). *Relatório Técnico.* Disponível em: <http://www.nybg.org/bsci/acre/pdfs/VegetacaoFloraCampinaranas.pdf>. Acessado em 12 de março de 2012.
- Silveira, L. F.; Figueiredo, L. F.; Antunes, A. Z.; Benedicto, G.; Schunck, F.; Develey, P.; Alvarenga, H. M. F.; Sugieda, A. Z. e Schaalmann, C. T. 2010.** Aves do Estado de São Paulo, p. 607-623. In: P. M. Bressan, M. C. M. Kierulff e A. M. Sugieda (orgs.) *Fauna Ameaçada de*

- extinção no Estado de São Paulo – Vertebrados. São Paulo: Fundação Parque Zoológico de São Paulo e Secretaria do Meio Ambiente.
- Silveira, M., Torrezan, J. M. D. & Daly, D. C. 2002.** Vegetação e diversidade arbórea da região do Alto Juruá. In: M. C. Cunha e A. C. Almeida (Eds.), *Enciclopédia da Floresta: O Alto Juruá: Práticas e Conhecimentos das Populações*: 65-75. São Paulo - SP: Companhia das Letras.
- Silveira, M., Daly, D. C., Salimon, C. I., Wadt, P. G. S., Amaral, E. F., Pereira, M. G. & Passos, V. 2008.** Ambientes físicos e coberturas vegetais do Acre. In: Daly, D. C. & Silveira, M. (Org.). *Primeiro Catálogo da Flora do Acre, Brasil / First Catalogue of the flora of Acre, Brasil*. Rio Branco: EDUfac. p. 36-46.
- Sneathlge, E. 1908.** Sobre uma coleção de Aves do Rio Purus. *Boletim do Museu Goeldi*, 5: 43-75.
- Sneathlge, E. 1910.** Sobre a distribuição da avifauna campestre na Amazônia. *Boletim do Museu Goeldi*, 6: 226-235.
- Souza, C. J.; Veríssimo, A.; Costa, A. S.; Reis, R. S.; Balieiro, C. & Ribeiro, J. 2006.** *Dinâmica do desmatamento no Estado do Acre (1988-2004)*. Belém, PA. IMAZON.
- Souza, I. R. & Guilherme, E. 2013.** First record of nesting behavior in the Austral Screech-Owl (*Megascops usta*) in an urban forest fragment in eastern Acre, Brazil. *Atualidades Ornitológicas*, 173:24-24.
- Simon, J. E. 2009.** A lista de aves do Espírito Santo. In: Simon, J.E., Raposo, M. A., Stopiglia, R. & Peres, J. (orgs.). *Biogeografia das aves da Mata Atlântica: livro de resumos/XVII Congresso Brasileiro de Ornitologia*. São Paulo: Tec Art.
- Stotz, D. F. 1990.** Corrections and additions to the Brazilian avifauna. *The Condor*, 92: 1078-1079.
- Stotz, D. F.; Fitzpatrick, J. W.; Parker III, T. A. & Moskovits, D. K. 1996.** *Neotropical birds: ecology and conservation*: 1-481. The University of Chicago Press, Chicago.
- Tavares, E. & Guilherme, E. 2000.** Anilhamento de aves no Parque Zoobotânico da Universidade Federal do Acre para auxiliar estudos de monitoramento e conservação. *VIII Congresso Brasileiro de Ornitologia*, Florianópolis - SC.
- Teixeira, D. M., Nacinovic, J. B., & Marti, F. M. 1994.** Notes on the Black-throated Antwren *Myrmeciza atrothorax* and Spot-breasted Antwren *M. stictothorax* in Brazil. *Bulletin of the British Ornithological Club*, 114(1): 20-24.
- Thom, G. & Aleixo, A. 2015.** Cryptic speciation in the white-shouldered antshrike (*Thamnophilus aethiops*, Aves – Thamnophilidae): The tale of a transcontinental radiation across rivers in lowland Amazonia and the northeastern Atlantic Forest. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, 82: 95–110.
- Tobias, J. A. & Brightsmith, D. J. 2007.** Distribution, ecology and conservation status of the Blue-headed Macaw *Primolius couloni*. *Biological conservation*, 139(1-2): 126-138.
- Tobias, J. A. & Seddon, N. 2007.** Nine bird species new to Bolivia and notes on other significant records. *Bulletin of the British Ornithological Club*, 127(1):49-84.
- Tobias, J. A.; Lebbin, D. J.; Aleixo, A.; Andersen, M. J.; Guilherme, E.; Hosner, P. A. & Seddon, N. 2008.** Distribution, behavior, and conservation status of the Rufous Twistwing (*Cnipodectes superrufus*). *The Wilson Journal of Ornithology*, 120(1): 38-49.
- Toivonen, T.; Mäki, S., & Kalliola, R. 2007.** The riverscape of western Amazonia - a quantitative approach to the fluvial biogeography of the region. *Journal of Biogeography*, 34: 1374-1387.
- Tuomisto, H.; Ruokolainen, K. & Yli-Halla, M. 2003.** Dispersal, Environmental, and Floristic Variation of Western Amazonian. *Science*, 299(5604): 241-244.
- Tuomisto, H.; Ruokolainen, K.; Kalliola, R.; Linna, A.; Danjoy, W. & Rodriguez, Z. 1995.** Dissecting Amazonian biodiversity. *Science*, 269: 63-66.
- Vanzolini, P. E. 1952.** Relatório de uma expedição científica ao Território Federal do Acre no ano de 1951. *Papéis Avulsos do Departamento de Zoologia*, XI(1): 1-20.
- Whitney, B. M. & Oren, D. C. 2001a.** Primeiro registro de *Nannopsittaca dachilleae* no Brasil. *Nattereria*, 2: 26.
- Whitney, B. M. & Oren, D. C. 2001b.** Documentação da ocorrência de *Eubucco tucinkae* no Brasil. *Nattereria*, 2: 27.
- Whitney, B. M. & Pacheco, J. F. 2001.** Evidência material para a presença de *Vireo flavoviridis* no Brasil. *Nattereria*, 2:36-37.
- Whitney, B. M.; Oren, D. C. & Brumfield, R. T. 2004.** A new species of *Thamnophilus* antshrike (Aves: Thamnophilidae) from the Serra do Divisor, Acre, Brazil. *The Auk*, 121(4): 1031-1039.
- Whitney, B. M.; Piacentini, V. Q.; Schunck, F.; Aleixo, A.; Sousa, B. R. S.; Silveira, L. F.; Rêgo, M. A. 2013a.** A name for Striolated Puffbird west of the Rio Madeira with revision of the *Nystalus striolatus* (Aves: Bucconidae) complex. In: J. del Hoyo, A. Elliott e D. Christie. (Org.). *Handbook of the Birds of the World, Special Volume: New Species and Global Index*. 1ed. Barcelona: Lynx Edicions. v. 17, p. 240-244.
- Whitney, B. M.; Isler, Morton L.; Bravo, Gustavo A.; Aristizábal, N.; Schunck, F.; Silveira, L. F.; Piacentini, V. Q. 2013b.** A new species of *Epinecrophylla* antwren from the Aripuanã-Machado interfluvium in central Amazonian Brazil with revision of the stipple-throated antwren complex. In: del Hoyo, J., Elliott A., Sargatal J., Christie D. A. (Org.). *Handbook of the Birds of the World. Special Volume: New Species and Global Index*. 1ed. Barcelona: Lynx Edicions, v. 17, p. 263-267.
- Whittaker, A. 2004.** Noteworthy ornithological records from Rondônia, Brazil, including a first country record, comments on austral migration, life history, taxonomy and distribution, with relevant data from neighbouring states, and a first record for Bolivia. *Bulletin of the British Ornithological Club* 124(4):239-270.
- Whittaker, A. & Oren, D. C. 1999.** Important ornithological records from the Rio Juruá, western Amazonia, including twelve additions to the Brazilian avifauna. *Bulletin of the British Ornithological Club*, 119:235-260.
- Whittaker, A.; Oren, D. C.; Pacheco, J. F.; Parrini, R. & Minns, J. C. 2002.** Aves registradas na Reserva extrativista do Alto Juruá. In: M. C. Cunha e M. B. Almeida (Orgs.): *Enciclopédia da Floresta. O Alto Juruá: práticas e conhecimentos das populações*: 81-99. Companhia das Letras, São Paulo.
- Zimmer, K. J.; Whittaker, A.; Guilherme, E. & Martuscelli, P. 2010.** Documented records of white-cheeked Tody-Tyrant *Poecilatriccus albifacies* from Acre, Brazil. *Bulletin of the British Ornithological Club* 130(3):255-259.
- Zimmer, K. J.; Whittaker, A.; Sardelli, C. H.; Guilherme, E.; Aleixo, A. 2013.** A new species of *Hemitriccus* tody-tyrant from the state of Acre, Brazil. In: Josep del Hoyo, Andrew Elliott, Jordi Sargatal, David A. Christie. (Org.). *Handbook of the Birds of the World, Special Volume: New Species and Global Index*. Barcelona: Lynx Edicions. p. 292-296.

RELATÓRIOS TÉCNICOS (NÃO PUBLICADOS):

- Aleixo, A. 2003.** Caracterização da avifauna e mastofauna das campinaranas do polígono JU-008, localizado nos municípios de Mâncio Lima (AC) e Guajará (AM), na ecorregião do sudoeste da Amazônia. Governo do Acre, Rio Branco.

Aleixo, A. & Poletto, F. 2004. Característica ecológica, biogeográfica e conservação da avifauna do Parque Nacional da Serra do Divisor.

Aleixo, A.; Guilherme, E. & Brígida, J. N. S. 2010. Caracterização da avifauna das porções baixa e média do rio Jurupari, Município de Feijó, Acre. Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Acre – SEMA. Rio Branco, Acre.

Dantas, S. M. 2010. Caracterização da Avifauna do entorno da cidade de Jordão, oeste do Acre. Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Acre – SEMA. Rio Branco, Acre.

Guilherme, E. Melo, T. N. & Portela, R. 2013. Diagnóstico ambiental da área temática aves para área de relevante interesse ecológico (ARIE) japiim pentecoste, Mâncio Lima/Cruzeiro do Sul, Acre. TECMAN LTDA - Tecnologia e Manejo Florestal/Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Acre – SEMA. Rio Branco.

Whitney, B. M., Oren, D. C., & Pimentel Neto, D. C. 1997. Avaliação ecológica rápida da avifauna do Parque Nacional da Serra do Divisor, Acre, Brasil, com comentários sobre mamíferos, a conservação, o manejo e o potencial de ecoturismo no PNSD. Rio Branco: SOS Amazônia/IBAMA/The Nature Conservancy/USAID. Rio Branco, Acre.



Agradecimentos

Nos últimos dez anos (2005-2015), tenho dedicado grande parte do meu tempo à reunião de todas as informações sobre as aves que ocorrem no estado do Acre. Nenhum esforço, no entanto, seria suficiente se não tivesse contado com a ajuda inestimável de inúmeras instituições e pessoas, que, sem dúvida, foram os principais responsáveis por tornar possível a realização deste trabalho. Por isso, dedicarei este espaço para nomeá-las, no sentido de expressar a minha mais sincera gratidão e respeito.

À Universidade Federal do Acre (Ufac), representada pelo Magnífico Reitor, Prof. Dr. Minoru Martins Kinpara, agradeço por acreditar no projeto e pelo apoio institucional, crucial para que esta obra viesse a público.

À Editora da Universidade Federal do Acre (Edufac), em nome do Diretor, Prof. Dr. José Ivan da Silva Ramos, e a toda sua equipe, pelos esforços envidados durante os trâmites institucionais que levaram à publicação desta obra.

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), pela concessão de bolsa de doutorado no período 2005-2009.

À Conservação Internacional – Belém (CI-Belém), representada pelo Prof. Dr. José Maria Cardoso da Silva, pela concessão de apoio financeiro à pesquisa, através de projeto aprovado durante meu doutoramento. Este apoio nos permitiu realizar levantamentos ornitológicos em regiões remotas do Acre.

Aos colegas professores e funcionários do Centro de Ciências Biológicas e da Natureza (CCBN), da Universidade Federal do Acre, pela convivência harmoniosa e apoio logístico diário.

Aos amigos do Laboratório de Pesquisas Paleontológicas da Ufac, Prof. Dr. Jonas Pereira de Souza Filho, Prof. Dr. Alceu Ranzi, Prof. Dr. Jean Claude Yves Bocquentin (meu primeiro orientador), à bióloga Msc. Andréa Aparecida da Rocha Maciente e ao técnico e designer Sr. Wagner Lima Vasconcelos, pelo incentivo e pela boa convivência no dia a dia.

Aos atuais alunos do Laboratório de Ornitologia (Ornitolab), Rosiane Portela de Mesquita, Jônatas Machado Lima, Rafael Ruan Araújo Pinto, Drielle Delgado Floriano, Vanessa Lima de Souza, Ednaira Alencar dos Santos, Daiane Lima da Silva e Luana Alencar de Lima; aos que já passaram por lá e hoje trilham outros rumos, o meu agradecimento pela convivência e pela dedicação ao estudo das aves.

Ao Prof. Dr. José Maria Cardoso da Silva, meu orientador no doutorado, pelo incentivo e pelas importantes sugestões que me foram passadas nos primeiros quatro anos deste projeto.

Ao ornitólogo, Dr. Alexandre Aleixo, amigo e incentivador, que, com seu conhecimento e generosidade, esteve sempre próximo, nos dando o apoio necessário para que pudéssemos seguir com os estudos ornitológicos no Acre. Agradeço, também, pela paciência com que esse pesquisador sempre me recebeu e pelas calorosas e entusiasmadas trocas de informações sobre as

aves amazônicas.

Ao Dr. David C. Oren, por ter me dado a primeira oportunidade de participar de uma grande expedição ornitológica, em 1994. Sem dúvida, a conclusão deste trabalho é um reflexo do gesto de confiança creditado por este experiente ornitólogo a um aluno que queria muito descobrir o fascinante mundo das Aves.

Aos técnicos em taxidermia do Museu Paraense Emílio Goeldi, Sr. Manoel Santa Brígida e seu filho, José Nilton Santa Brígida, que, com muita paciência e dedicação, me auxiliaram durante os trabalhos de campo por diversas localidades do Acre.

Aos amigos ornitólogos, que, em uma manifestação de amizade e entusiasmo pela Amazônia, se dispuseram a participar comigo de importantes expedições pelo Acre: Dr. Sérgio Henrique Borges (campinas do Alto Juruá); Dr. Marcos Pérsio Dantas Santos (taboais do leste do Acre); Dr. Sidnei de Melo Dantas (Alto Purus). Agradeço também ao Dr. Alexandre Aleixo por ter me convidado para participar, como colaborador, de uma expedição à Estação Ecológica Rio Acre.

À assistente de curadoria do Laboratório de Ornitologia Dr. Fernando da Costa Novaes, do Museu Paraense Emílio Goeldi – Sra. Maria de Fátima Cunha Lima –, pela paciência a mim dedicada, seja in loco ou via correio eletrônico, sempre que necessitei de informações daquela coleção ornitológica.

Aos curadores de coleções ornitológicas e pesquisadores que contribuíram com meu trabalho, enviando material bibliográfico com informações sobre as aves ou ambientes amazônicos: Alexander C. Lees (Cornell Lab of Ornithology); Alexandre Aleixo (MPEG); Andrew Whittaker; Bret Whitney; Bennett Hennessey (BirdLife Bolivia); Dante Buzzetti; Göran Frisk (Department of Vertebrate Zoology – Swedish Museum of Natural History); Inês de Lima Serrano (Ibama/Cemave); José Hidasi (Museu de Ornitologia de Goiânia); José Fernando Pacheco (CBRO); Luis Fábio Silveira (MZUSP); Joseph Tobias (University of Oxford); Marcos Raposo (UFRJ); Marcos Pérsio Dantas Santos (UFPA); Marcos Silveira (Ufac); Mário Cohn-Haft (Inpa); Nate Rice (Academy of Natural Sciences of Philadelphia); Paul Sweet e Thomas J. Trombone (American Museum of Natural History); Steven W. Cardiff (Louisiana State University Museum of Natural Science) e Vitor Piacentini (USP).

Aos ajudantes de campo e aos proprietários das dezenas de localidades visitadas durante nossas coletas de dados em campo: Clemildo Alves da Silva (ajudante de campo na Reserva Humaitá e Fazenda Catuaba); ao Prof. Msc. Aroldo Alechandre, pela permissão de trabalho na colônia de sua propriedade, localizada no Ramal Novo Horizonte, e aos ajudantes de campo, nesta localidade, Francisco das Chagas, Juventino (Nêgo) e Dona Irene Silva; ao Sr. Manoel Vieira (Toco) e seu genro Paulo (proprietários de uma colônia no Km 60 da Estrada Transacreaana); ao Sr. Raimundo Alves, pela permissão de trabalho na colônia de sua propriedade, localizada no Ramal Jarinal, e ao então estudante de Biologia, hoje biólogo, Liondon Johnsons, pela assistência nos trabalhos de campo, tanto naquela localidade, quanto na anterior; ao Sr. Daminhão Gonçalves, pela permissão de trabalho na Colônia Dois Portos, e aos mateiros José Leôncio e Geilson “Tetinha”; aos proprietários da Fazenda São Raimundo, Sr. Gentil e seus filhos José Ivan e José Elias; ao Prof. Dr. Moisés Barbosa de Souza, pela permissão de trabalho na área e ao ajudante de campo na região – Cherdiney de Oliveira; ao Sr. Antônio Sabóia, proprietário de uma colônia na Localidade Santa Cruz Velha; ao Sr. Pedro Cavalcante e seus filhos Francisco de Assis e “Sorriso”, pela permissão de trabalho na colônia de sua propriedade, localizada no Ramal Oco do Mundo; ao Sr. Manoel José, proprietário de uma colônia no Ramal da Gameleira; ao ajudante de campo Alonso Cunha “Caróba” e, finalmente, ao Sr. Silmar, sua esposa, Dona Rosa, e seu filho Nélio, pela permissão de trabalho e pela hospitalidade com que nos recebeu, quando estivemos na colônia de sua propriedade, localizada na Foz do Igarapé Paraná do Ouro, afluente do Rio Envira, em Feijó.

Agradeço a todos os observadores de aves/fotógrafos, que cederam seus registros, sem nenhum custo, para ilustrar esta obra. Meus agradecimentos pela confiança e generosidade. É uma

honra ter suas belas imagens ilustrando o Aves do Acre.

Faço um agradecimento especial ao amigo Tancredo Maia Filho, passarineiro acreano, que se entusiasmou com a ideia de levarmos avante um “esboço de livro” que eu lhe apresentei em um arquivo do Word. O conteúdo estava pronto, mas faltava o incentivo final para “aquilo” se transformar em um livro de verdade. Designer gráfico competente, após olhar rapidamente o arquivo, ele disse: “Vou te ajudar!”. Neste dia, nasceu o projeto “Aves do Acre”. Desde então, foram quase nove meses de intenso trabalho: Tancredo, meu amigo, não há palavras suficientes para agradecer tamanha ajuda, paciência, tranquilidade e bom humor, neste tempo de convivência harmoniosa. Só posso lhe dizer: OBRIGADO.

E finalmente, quero agradecer à Rejane, minha companheira, que nos últimos anos esteve sempre presente, com palavras e gestos incentivadores, principalmente naqueles momentos onde as dúvidas reinavam mais do que as certezas.

A todos, o meu MUITO OBRIGADO!



7

Índices

Índice de nomes comuns

abre-asa	624
abre-asa-do-acre	623
acauã	394
acurana	270
água-pescadora	145
agulha-de-garganta-branca	333
alegrinho-do-chaco	649
alma-de-gato	233
amarelinho	650
anambé-azul	614
anambé-branco-de-bochecha-parda	600
anambé-branco-de-máscara-negra	602
anambé-branco-de-rabo-preto	601
anambé-de-cara-preta	612
anambé-de-coroa	599
anambé-pombo	611
anambé-preto	616
anambé-una	615
andorinha-azul	728
andorinha-de-bando	733
andorinha-do-barranco	732
andorinha-do-campo	727
andorinha-doméstica-grande	729
andorinha-do-rio	731
andorinha-do-sul	730
andorinhão-da-amazônia	280
andorinhão-de-rabo-curto	282
andorinhão-de-sobre-branco	276
andorinhão-de-sobre-cinzento	277
andorinhão-do-buriti	283
andorinhão-do-temporal	281
andorinhão-estofador	284
andorinhão-migrante	279
andorinha-pequena-de-casa	723
andorinha-serradora	726
anhuma	99
anu-coroa	239
anu-preto	240
apuim-de-asa-vermelha	422
apuim-de-costas-azuis	423
araçari-castanho	368
araçari-de-bico-marrom	367
araçari-miudinho-de-bico-riscado	366
araçari-mulato	370
aracuã-pintado	106
arapaçu-barrado-do-Juruá	541
arapaçu-beija-flor	536
arapaçu-bico-de-cunha	527
arapaçu-da-taoca	523
arapaçu-de-barriga-pintada	545
arapaçu-de-bico-branco	537
arapaçu-de-bico-comprido	539
arapaçu-de-garganta-amarela	534
arapaçu-de-garganta-pintada	526
arapaçu-de-tschudi	529
arapaçu-do-inambari	538
arapaçu-elegante	531
arapaçu-galinha	540
arapaçu-meio-barrado	543
arapaçu-ocelado	530
arapaçu-pardo	521
arapaçu-rabudo	524
arapaçu-riscado	533
arapaçu-verde	525
arapaçu-vermelho	544
arapapá	124
araracanga	405
arara-canindé	404
arara-vermelha-grande	406
ariramba-bronzeada	338
ariramba-da-capoeira	336
ariramba-da-mata	335
ariramba-de-bico-amarelo	334
ariramba-do-paraiso	339
arredio-do-rio	573
asa-branca	101
asa-de-sabre-cinza	295
assanhadinho	594
assanhadinho-de-cauda-preta	595
assobiador-do-castanhal	715
azulão-da-amazônia	842
azulona	86
bacurau	267
bacurau-chintã	268
bacurau-da-praia	273
bacurau-de-lajeado	266
bacurau-de-rabo-maculado	269
bacurau-ocelado	262
bacurau-rabo-de-seda	264
bacurau-tesoura	271
bagageiro	663
baiano	834
balança-rabo-de-bico-torto	285
balança-rabo-de-chapéu-preto	746
balança-rabo-de-garganta-preta	287
barbudo-de-coleira	348
bardudo-de-pescoço-ferrugem	349
barranqueiro-camurça	558
barranqueiro-de-coroa-castanha	555
barranqueiro-de-topete	561
barranqueiro-escuro	556
barranqueiro-ferrugem-do-acre	554
barranqueiro-pardo	560
bate-pára	667
batuíra-de-coleira	198
batuíra-de-esporão	195
batuiruçu	197
beija-flor-azul-de-rabo-branco	296
beija-flor-de-bochecha-azul	312
beija-flor-de-cauda-dourada	307
beija-flor-de-garganta-azul	302
beija-flor-de-garganta-verde	309
beija-flor-de-peito-azul	310
beija-flor-de-veste-preta	297
beija-flor-estrela	311
beija-flor-roxo	306
beija-flor-safira	305
beija-flor-tesoura-verde	304
beija-flor-verde	308
beija-flor-vermelho	299
bem-te-vi	680
bem-te-vi-barulhento	690
bem-te-vi-da-copa	698
bem-te-vi-de-barriga-sulfúrea	683
bem-te-vi-de-cabeça-cinza	689
bem-te-vi-pequeno	697
bem-te-vi-pirata	669
bem-te-vi-rajado	684
benedito-de-testa-vermelha	374
bentevizinho-de-asa-ferrugínea	687
bentevizinho-de-penacho-vermelho	688
bentevizinho-do-brejo	681
besourão-de-bico-grande	293
bico-assovelado	745
bico-chato-amarelo	633
bico-chato-da-copa	631
bico-chato-de-cabeça-cinza	632
bico-chato-de-orelha-preta	630
bico-chato-de-rabo-vermelho	671
bico-chato-grande	629
bico-de-lacre	851
bico-encarnado	784
bico-reto-azul	314
bico-reto-cinzento	313
bico-virado-carijó	549
bico-virado-da-copa	551
bico-virado-fino	546
bico-virado-miúdo	547
bicudo	838
bigodinho	832
biguá	120
biguatinga	121
borralhara-ondulada	472
cabeça-branca	589
cabeça-encarnada	581
cabeça-seca	119
cabeçudo	626
caboclinho-de-peito-castanho	836
caburé	253
caburé-da-amazônia	252
caçula	639
calcinha-branca	725
cambacica	781
caminheiro-zumbidor	755
canário-da-terra-verdadeiro	826
caneleiro	605
caneleiro-bordado	607
caneleiro-cinzento	604
caneleiro-de-cara-amarela	603
caneleiro-pequeno	608
caneleiro-preto	606
cantador-amarelo	495
cantador-galego	496
cantador-sinaleiro	497
capitão-de-bigode-limão	360
capitão-de-colar-amarelo	361
capitão-de-coroa	358
capitão-de-fronte-dourada	359
capitão-de-saíra-amarelo	668
caracará	392
caracoleiro	147
carão	179
caraxué-de-bico-amarelo	751
caraxué-de-bico-preto	753
cardeal-da-amazônia	812
carrapateiro	393
casaca-de-couro-amarelo; joão-de-barro	552
catatau	737
cauré	402
chincoã-de-bico-vermelho	234
chincoã-pequeno	231
choca-barrada	462
choca-canela	467
choca-cantadora	433
choca-de-olho-vermelho	463
choca-do-acre	468
choca-do-bambu	470
choca-lisa	465
choca-murina	464
choca-preta	435
choquinha-de-asa-comprida	449
choquinha-de-bico-curto	443
choquinha-de-cauda-ruiva	440
choquinha-de-flanco-branco	446
choquinha-de-garganta-amarela	444
choquinha-de-garganta-carijó	437
choquinha-de-garganta-cinza	452
choquinha-de-garganta-clara	454
choquinha-de-olho-branco	436
choquinha-do-bambu	450
choquinha-do-madeira	438
choquinha-do-oeste	448
choquinha-do-purus	451
choquinha-estriada-da-amazônia	445
choquinha-miúda	442
choquinha-ornada	439
chora-chuva-de-bico-amarelo	356
chora-chuva-de-cara-branca	355
chora-chuva-preto • bico-de-brasa	353
choró-boi	471
chorona-cinza	598
chororó-de-manu	493
chororó-negro	491
chororó-pocuá	490
chororó-preto	492
chorozinho-de-asa-vermelha	461
chupa-dente-de-cinta	507
chupa-dente-do-peru	508
cigana	230
cigarrinha-do-campo • corre-campo	756
cigarrinha-do-norte	828
coleirinho	835
coleiro-do-norte	829
colhereiro	138
condor-dos-andes	144

corneteiro-da-mata	512	freirinha-amarelada	351	guaracava-grande	654	limpa-folha-vermelho	566
coroa-de-fogo	586	freirinha-de-coroa-castanha	352	guaracava-modesta	701	maçarico-acanelado	211
coró-coró	136	fruxu-de-barriga-amarela	576	guaracavuçu	707	maçarico-de-bico-fino	208
corrúira	736	furriel-de-encontro	785	guarda-floresta	474	maçarico-de-colete	209
corução	272	gaivota-alegre	214	guarda-várzea	475	maçarico-de-perna-amarela	205
coruja-buraqueira	254	galinha-do-mato	513	guaxe	768	maçarico-de-sobre-branco	207
coruja-da-igreja	245	garça-azul	134	inhambu-anhangá	95	maçarico-do-campo	201
coruja-de-crista	248	garça-branca-grande	131	inhambu-anhangá	97	maçarico-grande-de-perna-amarela	204
coruja-do-mato	250	garça-branca-pequena	133	inhambu-carijó	96	maçarico-pernilongo	210
coruja-orelhuda	255	garça-da-mata	123	inhambu-chintã	98	maçarico-pintado	202
coruja-preta	251	garça-moura • socó	130	inhambu-de-cabeça-vermelha	87	maçarico-solitário	203
corujinha-do-mato	246	garça-real	132	inhambu-de-coroa-preta	94	maçariquinho	206
corujinha-relógio	247	garça-vaqueira	129	inhambu-galinha	88	macuru	350
cotinga-azul	613	garrincha-cinza	741	inhambuguaçu	91	macuru-de-peito-marrom	342
cotinga-de-garganta-encarnada	610	garrinção-de-barriga-vermelha	740	inhambu-preto	89	macuru-de-testa-branca	341
crició • capitão da mata	609	garrinção-pai-avô	738	inhambu-relógio	93	macuru-pintado	343
curica	429	gaturamo-bandeira	850	inhapim	773	mãe-da-lua	259
curica-de-bochecha-laranja	425	gaturamo-de-barriga-branca	847	iratauí-pequeno	776	mãe-da-lua-gigante	257
curió	837	gaturamo-de-bico-grosso	845	iraúna-de-bico-branco	767	mãe-da-lua-parda	258
dançador-de-cauda-graduada	582	gaturamo-do-norte	849	iraúna-grande	777	mãe-de-taoca	501
enferrujadinho	618	gaturamo-verde	846	iraúna-velada	775	mãe-de-taoca-avermelhada	503
enferrujado	708	gaúcha-d'água	713	irerê	100	mãe-de-taoca-cabeçuda	506
esmeralda-de-cauda-azul	303	gavião-azul	160	irré	674	mãe-de-taoca-de-cauda-barrada	504
esmerilhão	401	gavião-belo	156	jacamarazu	340	maguari	117
estalador-do-norte	628	gavião-bombachinha-grande	154	jacamim-de-costas-brancas	180	maitaca-de-cabeça-azul	426
estrela-do-norte	831	gavião-branco	166	jaçanã	213	maracanã-de-cabeça-azul	409
estrelinha-ametista	315	gavião-caboclo	161	jacu-de-spix	107	maracanã-do-buriti	408
falcão-caburé	395	gavião-caramujeiro	157	jacu-estalo	244	maracanã-guaçu	407
falcão-de-buckley	399	gavião-carijó	163	jacutinga-de-garganta-azul	108	maria-cabeçuda	670
falcão-de-coleira	403	gavião-de-anta	390	jaó • macucau	92	maria-cavaleira	675
falcão-mateiro	396	gavião-de-asa-larga	169	japacanim	744	maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado	676
falcão-relógio	398	gavião-de-cabeça-cinza	146	japiim-da-selva	772	maria-cavaleira-pequena	673
ferreirinho-de-cara-branca	636	gavião-de-cauda-curta	170	japu	765	maria-da-praia	706
ferreirinho-de-cara-parda	638	gavião-de-penacho	177	japuaçu	766	maria-de-barriga-branca	643
ferreirinho-de-sobrancelha	635	gavião-de-rabo-barrado	172	japu-de-capacete	769	maria-de-cauda-escura	672
ferreirinho-estriado	634	gavião-de-rabo-branco	165	japu-de-rabo-verde	770	maria-de-peito-machetado	642
figuinha-de-rabo-castanho	825	gavião-de-sobre-branco	164	japu-pardo	763	maria-ferrugem	679
filipe	700	gavião-de-sobre-branco	164	japu-verde	764	maria-fiteira	646
fim-fim	844	gavião-do-igapó	158	joão-corta-pau	263	maria-lcque	592
fim-fim-grande	848	gavião-miudinho	152	joão-de-peito-escuro	568	maria-mirim	645
flamingo-da-puna	116	gavião-papa-gafanhoto	171	joão-folheiro	572	marianinha-amarela	662
flautim-da-amazônia	597	gavião-pato	176	joão-liso	575	marianinha-de-cabeça-amarela	424
flautim-pardo	621	gavião-pedrés	168	joão-pintado	574	maria-pechim	657
flautim-rufo	622	gavião-pega-macaco	175	joão-pinto; corrução	774	maria-peruviana	644
flautim-ruivo	596	gavião-pernilongo	159	joão-teneném-becua	571	maria-picaça	637
formigueiro-chumbo	478	gavião-preto	162	joão-teneném-castanho	569	maria-sebinha	641
formigueiro-cinza	477	gavião-real	174	juriti-gemeleira	227	maria-sebinha-do-acre	640
formigueiro-da-taoca	487	gavião-real	174	juriti-pupu	226	maria-te-viu	661
formigueiro-de-asa-pintada	480	gavião-ripina	150	juruvia	329	maria-topetuda	647
formigueiro-de-cara-preta	482	gavião-tesoura	148	juruvia-ruiva	329	mariquita-de-connecticut	758
formigueiro-de-cara-preta	482	gavião-vaqueiro	167	juruvia-verde-amarelada	717	mariquita-do-canadá	760
formigueiro-de-cauda-castanha	488	gavião-vaqueiro	167	lavadeira-de-cara-branca	704	marreca-de-asa-azul	104
formigueiro-de-cauda-curta	479	gralhão	391	limpa-folha-de-cara-branca	704	marreca-de-bico-roxo	105
formigueiro-de-goeldi	486	gralha-violácea	722	limpa-folha-de-asa-castanha	564	martim-pescador-da-mata	327
formigueiro-de-peito-preto	441	gritador	677	limpa-folha-de-bico-virado	567	martim-pescador-grande	323
formigueiro-do-bambu	481	guaracava-cinzenta	658	limpa-folha-de-cauda-ruiva	562	martim-pescador-pequeno	326
formigueiro-grande	485	guaracava-de-barriga-amarela	653	limpa-folha-de-sobre-ruivo	563	martim-pescador-verde	324
frango-d'água-azul	192	guaracava-de-bico-curto	656	limpa-folha-de-testa-baia	565	martinho	325
frango-d'água-comum	191	guaracava-de-crista-alaranjada	660	limpa-folha-do-buriti	550	mergulhão-caçador	115
frango-d'água-pequeno	193	guaracava-de-crista-branca	655	limpa-folha-do-buriti	550	mergulhão-pequeno	114
freirinha	705	guaracava-de-crista-branca	655	limpa-folha-picanço	553		
		guaracava-de-penacho-amarelo	659	limpa-folha-riscado	557		

mocho-diabo	256	picapauzinho-anão	377	saíra-beija-flor	821	tempera-viola • trinca-ferro	782
murucututu	249	picapauzinho-avermelhado	376	saíra-de-bando	801	tem-tem-de-crista-amarela	795
mutum-cavalo	111	picapauzinho-chocolate	382	saíra-de-barriga-amarela	805	tem-tem-de-dragona-branca	793
mutum-de-fava	110	pinto-do-mato-de-cara-preta	514	saíra-de-cabeça-azul	809	tem-tem-de-dragona-vermelha	789
narceja	200	pinto-do-mato-de-fronte-ruiva	515	saíra-de-cabeça-castanha	799	tem-tem-de-topete-ferrugíneo	797
neinci	686	pipira-da-taoca	798	saíra-de-chapéu-preto	787	tesourinha	693
papa-capim-de-caquetá	830	pipira-de-asa-branca	796	saíra-de-papo-preto	823	tico-tico-de-bico-preto	757
papa-capim-preto-e-branco	833	pipira-de-bico-vermelho	780	saíra-diamante	803	tiê-do-mato-grosso	841
papa-formiga-barrado	469	pipira-de-máscara • pipira-do-flamengo	790	saíra-galega	824	tiê-galo	794
papa-formiga-de-bando	434	pipira-vermelha	791	saíra-mascarada	808	tiê-preto-e-branco	786
papa-formiga-de-sobrancelha	484	pisa-n'água	212	saíra-opala	804	tietinga	810
papa-formiga-do-igarapé	476	pitiguari	714	saíra-ouro	800	tinguaçu-de-barriga-amarela	666
papa-formiga-pardo	453	piui-boreal	710	saíra-viúva	813	tinguaçu-ferrugem	665
papagaio-campeiro	430	piui-verdadeiro	711	saí-verde	822	tiriba-de-cabeça-vermelha	414
papagaio-da-várzea	427	poiairo-de-pata-fina	648	sanã-castanha	185	tiriba-rupestre	415
papagaio-moleiro	428	poiairo-de-sobrancelha	651	sanã-de-cabeça-castanha	184	tiziu	827
papa-lagarta-acanelado	235	polícia-inglesa-do-norte	779	sanã-do-capim	188	topázio-de-fogo	298
papa-lagarta-cinzento	232	pomba-amargosa	224	sanã-parda	187	topetinho-verde	300
papa-lagarta-de-asa-vermelha	236	pomba-botafogo	225	sanã-zebrada	186	torom-torom	510
papa-lagarta-de-bico-preto	238	pomba-galega	223	sanhaçu-da-amazônia	806	tovaca-estriada	516
papa-lagarta-de-euler	237	pomba-trocal	222	sanhaçu-de-coleira	811	tovaca-patinho	511
papa-moscas-cinzento	712	pretinho	590	sanhaçu-do-coqueiro	807	tovacuçu-xodó	509
papa-moscas-de-alder	709	príncipe	703	sanhaçu-escarlata	840	tovaquinha	460
papa-moscas-uirapuru	593	pula-pula	761	sanhaçu-vermelho	839	tricolino-oliváceo	664
papinho-amarelo	617	pula-pula-de-cauda-avermelhada	762	saracura-de-asa-vermelha	182	trinta-réis-anão	215
pararu-azul	221	puruchém	570	saracura-lisa	183	trinta-réis-grande	216
pardal	852	quero-quero	196	saracura-sanã	190	trombeteiro	135
pariri	229	quiriquiri	400	saracura-três-potes	181	trovoada-listrada	494
patinho-de-coroa-branca	620	rabo-branco-amarelo	291	saripoca-de-coleira	365	tucaninho-de-nariz-amarelo	364
patinho-de-coroa-dourada	619	rabo-branco-cinza	289	savacu	127	tucano-de-bico-preto	363
pato-do-mato	102	rabo-branco-de-bico-reto	292	sertanejo-escuro	702	tucano-grande-de-papo-branco	362
pavãozinho-do-pará	178	rabo-branco-rubro	288	sete-cores-da-amazônia	802	tuim	416
peitica	696	rabo-de-aramé	578	socó-boi	122	tuim-de-bico-escuro	417
peitica-de-chapéu-preto	695	rabo-de-espinho	301	socoí-vermelho	126	tuiuí	118
peitoril	724	rapazinho-carijó	345	socoí-zigue-zague	125	tuju	265
peixe-frito-pavonino	243	rapazinho-de-boné-vermelho	344	socozinho	128	tururim • sururina	90
peixe-frito-verdadeiro	242	rapazinho-de-colar	346	solta-asa	473	turu-turu	189
periquitão-maracanã	411	rapazinho-estriado-do-oeste	347	sovela-vermelha	332	udu-de-bico-largo	328
periquito-da-amazônia	421	rendadinho	499	sovi	155	udu-de-coroa-azul	330
periquito-de-asa-azul	418	rendeira	585	suiriri	692	uiracu-falso	173
periquito-de-cabeça-suja	412	risadinha	652	suiriri-cavaleiro	682	uirapuru-azul	458
periquito-testinha	420	rolinha-de-asa-canela	218	suiriri-de-garganta-branca	691	uirapuru-cigarra	588
pernilongo-de-costas-negras	199	rolinha-picuí	220	suiriri-de-garganta-rajada	685	uirapuru-de-asa-branca	735
pé-vermelho	103	rolinha-roxa	219	suiriri-valente	694	uirapuru-de-chapéu-azul	583
pia-cobra	759	sabiá-bicolor	749	surucuá-de-barriga-amarela	320	uirapuru-de-garganta-preta	456
picaparra	194	sabiá-coleira	754	surucuá-de-barriga-vermelha	319	uirapuru-de-peito-branco	742
pica-pau-amarelo	384	sabiá-da-várzea	750	surucuá-de-cauda-preta	316	uirapuru-laranja	579
pica-pau-anão-de-barras-sutis	373	sabiá-de-cara-cinza	747	surucuá-de-coleira	321	uirapuru-selado	457
pica-pau-anão-dourado	371	sabiá-de-óculos	748	surucuá-grande-de-barriga-amarela	317	uirapuru-veado	734
pica-pau-anão-vermelho	372	sabiá-gongá-da-amazônia	783	surucuá-pavão	322	uirapuru-verdadeiro	743
pica-pau-bufador	379	sabiá-poca	752	surucuá-pequeno	318	uirapuruzinho	577
pica-pau-chocolate	383	saci	241	talha-mar	217	urubu-da-mata	141
pica-pau-de-banda-branca	387	saí-amarela	817	tanatau	397	urubu-de-cabeça-amarela	140
pica-pau-de-barriga-vermelha	388	saí-andorinha	814	tangará-falso	591	urubu-de-cabeça-preta	142
pica-pau-de-coleira	386	saí-azul	818	tangará-riscado	587	urubu-de-cabeça-vermelha	139
pica-pau-de-garganta-branca	378	saí-canário	788	taperá-de-garganta-branca	278	urubu-rei	143
pica-pau-de-peito-pontilhado	381	saí-de-barriga-branca	815	taperuçu-de-coleira-branca	275	urubuzinho	357
pica-pau-de-topete-vermelho	389	saí-de-bico-curto	819	taperuçu-de-mento-branco	274	uru-corcovado	112
pica-pau-dourado-escuro	380	saí-de-máscara-preta	816	tapicuru-de-cara-pelada	137	uru-de-topete	113
pica-pau-lindo	385	saí-de-perna-amarela	820	tauató-pintado	151	urumutum	109

urutau-ferrugem	261
urutau-de-asa-branca	260
verdinho-da-várzea	719
vira-bosta	778
vira-folha-de-bico-curto	518
vira-folha-de-garganta-cinza	520
vira-folha-de-peito-vermelho	517
vira-folha-pardo	519
vissíá	678
vite-vite	718
vite-vite-de-barriga-amarela	720
vite-vite-uirapuru	721
viuvinha	699
xexéu • japiim.....	771
zidedê-de-encontro	432

Índice de nomes científicos

<i>Aburria cumanensis</i>	108
<i>Accipiter bicolor</i>	154
<i>Accipiter poliogaster</i>	151
<i>Accipiter striatus</i>	153
<i>Accipiter superciliosus</i>	152
<i>Actitis macularius</i>	202
<i>Agamia agami</i>	123
<i>Akileto goeldii</i>	486
<i>Akileto melanoceps</i>	485
<i>Amaurolimnas concolor</i>	183
<i>Amazilia fimbriata</i>	309
<i>Amazilia lactea</i>	310
<i>Amazona amazonica</i>	429
<i>Amazona farinosa</i>	428
<i>Amazona festiva</i>	427
<i>Amazona ocbrocephala</i>	430
<i>Amazonetta brasiliensis</i>	103
<i>Ammodramus aurifrons</i>	756
<i>Anabacerthia ruficaudata</i>	562
<i>Anabazenops dorsalis</i>	561
<i>Anas discors</i>	104
<i>Ancistrops strigilatus</i>	553
<i>Anhima cornuta</i>	99
<i>Anhinga anhinga</i>	121
<i>Anthracoceros nigricollis</i>	297
<i>Antbus lutescens</i>	755
<i>Antrostomus rufus</i>	263
<i>Antrostomus sericocaudatus</i>	264
<i>Anurolimnas castaneiceps</i>	184
<i>Ara ararauna</i>	404
<i>Ara macao</i>	405
<i>Aramides cajaneus</i>	181
<i>Aramides calopterus</i>	182
<i>Aramus guarauna</i>	179
<i>Ara chloropterus</i>	406
<i>Ara severus</i>	407
<i>Aratinga weddellii</i>	412
<i>Ardea alba</i>	131
<i>Ardea cocoi</i>	130
<i>Arremon taciturnus</i>	757
<i>Arundinicola leucocephala</i>	705
<i>Asio clamator</i>	255
<i>Asio stygius</i>	256
<i>Athene cunicularia</i>	254
<i>Atticora fasciata</i>	724
<i>Atticora tibialis</i>	725
<i>Attila bolivianus</i>	667
<i>Attila cinnamomeus</i>	665
<i>Attila citriniventris</i>	666
<i>Attila spadiceus</i>	668
<i>Aulacorhynchus atrogularis</i>	364
<i>Automolus infuscatus</i>	560
<i>Automolus melanopezus</i>	556
<i>Automolus ocbrolaemus</i>	558
<i>Automolus rufipileatus</i>	555
<i>Automolus subulatus</i>	557
<i>Bartramia longicauda</i>	201
<i>Baryphthengus martii</i>	329
<i>Basileuterus culicivorus</i>	761
<i>Berlepschia rikeri</i>	550
<i>Brachygalba albogularis</i>	333
<i>Brotogeris cyanoptera</i>	418
<i>Brotogeris sanctithomae</i>	420
<i>Bubulcus ibis</i>	129
<i>Bucco capensis</i>	346
<i>Bucco macrodactylus</i>	344
<i>Bucco tamatia</i>	345
<i>Busarellus nigricollis</i>	156
<i>Buteo albonotatus</i>	172
<i>Buteo brachyurus</i>	170
<i>Buteogallus schistaceus</i>	160
<i>Buteo nitidus</i>	168
<i>Buteo platypterus</i>	169
<i>Buteo swainsoni</i>	171
<i>Butorides striata</i>	128
<i>Cacicus cela</i>	771
<i>Cacicus haemorrhous</i>	768
<i>Cacicus koepckeae</i>	772
<i>Cacicus latirostris</i>	770
<i>Cacicus oseryi</i>	769
<i>Cairina moschata</i>	102
<i>Calidris bairdii</i>	208
<i>Calidris fuscicollis</i>	207
<i>Calidris himantopus</i>	210
<i>Calidris melanotos</i>	209
<i>Calidris minutilla</i>	206
<i>Calidris subruficollis</i>	211
<i>Callipepla amethystina</i>	315
<i>Campephilus melanoleucos</i>	389
<i>Campephilus rubricollis</i>	388
<i>Camptostoma obsoletum</i>	652
<i>Campylopterus largipennis</i>	295
<i>Campylorhynchus trochilirostris</i>	536
<i>Campylorhynchus turdinus</i>	737
<i>Cantorchilus griseus</i>	741
<i>Cantorchilus leucotis</i>	740
<i>Capito auratus</i>	359
<i>Capito aurovirens</i>	358
<i>Capsiempis flaveola</i>	662
<i>Caracara plancus</i>	392
<i>Cardellina canadensis</i>	760
<i>Casiornis rufus</i>	679
<i>Cathartes aura</i>	139
<i>Cathartes burrovianus</i>	140
<i>Cathartes melambrotus</i>	141
<i>Cathartes minimus</i>	747
<i>Cathartes swainsoni</i>	748
<i>Celeus elegans</i>	383
<i>Celeus flavus</i>	384
<i>Celeus grammicus</i>	382
<i>Celeus spectabilis</i>	385
<i>Celeus torquatus</i>	386
<i>Cephalopterus ornatus</i>	616
<i>Ceratopipra chloromeros</i>	582
<i>Ceratopipra rubrocapilla</i>	581
<i>Ceribis ocyzerca</i>	135

<i>Cercomacra cinerascens</i>	490	<i>Corythopsis torquatus</i>	628	<i>Epinecrophylla amazonica</i>	438	<i>Heliornis fulica</i>	194
<i>Cercomacra manu</i>	493	<i>Cotinga cayana</i>	614	<i>Epinecrophylla erythrura</i>	440	<i>Heliothryx auritus</i>	312
<i>Cercomacra nigrescens</i>	491	<i>Cotinga maynana</i>	613	<i>Epinecrophylla baematonota</i>	437	<i>Hemithraupis flavicollis</i>	824
<i>Cercomacra serva</i>	492	<i>Cranioleuca gutturata</i>	574	<i>Epinecrophylla leucophthalma</i>	436	<i>Hemithraupis guira</i>	823
<i>Certhiasomus stictolaemus</i>	526	<i>Cranioleuca vulpina</i>	573	<i>Epinecrophylla ornata</i>	439	<i>Hemitriccus cobnhafti</i>	640
<i>Chaetura brachyura</i>	282	<i>Crax globulosa</i>	110	<i>Estrilda astrild</i>	851	<i>Hemitriccus flammulatus</i>	642
<i>Chaetura cinereiventris</i>	277	<i>Crotophaga ani</i>	240	<i>Eubucco richardsoni</i>	360	<i>Hemitriccus griseipectus</i>	643
<i>Chaetura egregia</i>	278	<i>Crotophaga major</i>	239	<i>Eubucco tucinkeae</i>	361	<i>Hemitriccus iohannis</i>	644
<i>Chaetura meridionalis</i>	281	<i>Crypturellus atrocapillus</i>	94	<i>Euchrepomis humeralis</i>	432	<i>Hemitriccus minimus</i>	645
<i>Chaetura pelagica</i>	279	<i>Crypturellus bartletti</i>	97	<i>Euphonia chlorotica</i>	844	<i>Hemitriccus aff. minor</i>	641
<i>Chaetura spinicaudus</i>	276	<i>Crypturellus cf. brevirostris</i>	96	<i>Euphonia chrysopasta</i>	846	<i>Henicorbina leucosticta</i>	742
<i>Chaetura viridipennis</i>	280	<i>Crypturellus cinereus</i>	89	<i>Euphonia laniirostris</i>	845	<i>Herpetoberes cachinnans</i>	394
<i>Chamaeza nobilis</i>	516	<i>Crypturellus obsoletus</i>	91	<i>Euphonia minuta</i>	847	<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i>	461
<i>Charadrius collaris</i>	198	<i>Crypturellus soui</i>	90	<i>Euphonia rufiventris</i>	849	<i>Heterocercus lineatus</i>	586
<i>Chelidoptera tenebrosa</i>	357	<i>Crypturellus strigulosus</i>	93	<i>Euphonia xanthogaster</i>	848	<i>Heterospizias meridionalis</i>	161
<i>Chiroxiphia pareola</i>	591	<i>Crypturellus tataupa</i>	98	<i>Eurypyga belias</i>	178	<i>Himantopus mexicanus</i>	199
<i>Chloroceryle aenea</i>	325	<i>Crypturellus undulatus</i>	92	<i>Falco columbarius</i>	401	<i>Hirundo rustica</i>	733
<i>Chloroceryle amazona</i>	324	<i>Crypturellus variegatus</i>	95	<i>Falco femoralis</i>	403	<i>Hydropsalis albicollis</i>	267
<i>Chloroceryle americana</i>	326	<i>Cyanerpes caeruleus</i>	820	<i>Falco rufigularis</i>	402	<i>Hydropsalis climacocerca</i>	270
<i>Chloroceryle inda</i>	327	<i>Cyanerpes cyaneus</i>	821	<i>Falco sparverius</i>	400	<i>Hydropsalis maculicauda</i>	269
<i>Chlorophanes spiza</i>	822	<i>Cyanerpes nitidus</i>	819	<i>Florisuga mellivora</i>	296	<i>Hydropsalis nigrescens</i>	266
<i>Chlorophonia cyanea</i>	850	<i>Cyanocorax violaceus</i>	722	<i>Fluvicola albiventer</i>	704	<i>Hydropsalis parvula</i>	268
<i>Chlorostilbon mellisugus</i>	303	<i>Cyanoloxia rothschildii</i>	842	<i>Formicarius analis</i>	514	<i>Hydropsalis torquata</i>	271
<i>Chlorostilbon notatus</i>	302	<i>Cyralbis gujanensis</i>	714	<i>Formicarius colma</i>	513	<i>Hylexetastes stresemanni</i>	545
<i>Chondrobiax uncinatus</i>	147	<i>Cymbilaimus lineatus</i>	469	<i>Formicarius rufifrons</i>	515	<i>Hylocharis cyanus</i>	306
<i>Chordeiles nacunda</i>	272	<i>Cymbilaimus sanctaemariae</i>	470	<i>Formicivora grisea</i>	453	<i>Hylocharis sapphirina</i>	305
<i>Chordeiles rupestris</i>	273	<i>Cyborhinus arada</i>	743	<i>Forpus sclateri</i>	417	<i>Hylopezus berlepschi</i>	510
<i>Chrysolampis mosquitus</i>	299	<i>Cypseloides cryptus</i>	274	<i>Forpus xanthopterygius</i>	416	<i>Hylophilus hypoxanthus</i>	720
<i>Chrysomus icterocephalus</i>	776	<i>Dacnis albiventris</i>	815	<i>Frederickena unduliger</i>	472	<i>Hylophilus ochraceiceps</i>	721
<i>Chrysornis oenone</i>	307	<i>Dacnis cayana</i>	818	<i>Furnarius leucopus</i>	552	<i>Hylophilus semicinctus</i>	719
<i>Ciconia maguari</i>	117	<i>Dacnis flaviventer</i>	817	<i>Galbalyphynchus purusianus</i>	332	<i>Hylophilus thoracicus</i>	718
<i>Cissopis leverianus</i>	810	<i>Dacnis lineata</i>	816	<i>Galbula albirostris</i>	334	<i>Hylophylax naevius</i>	474
<i>Claravis pretiosa</i>	221	<i>Daptrius ater</i>	390	<i>Galbula cyanescens</i>	336	<i>Hylophylax punctulatus</i>	475
<i>Clibanornis watkinsi</i>	554	<i>Deconychura longicauda</i>	524	<i>Galbula cyanicollis</i>	335	<i>Hypocnemis hypoxantha</i>	495
<i>Cnemotriccus fuscatus</i>	707	<i>Dendrexetastes rufigula</i>	540	<i>Galbula dea</i>	339	<i>Hypocnemis peruviana</i>	497
<i>Cnipodectes subbrunneus</i>	621	<i>Dendrocincla fuliginosa</i>	521	<i>Galbula leucogastra</i>	338	<i>Hypocnemis subflava</i>	496
<i>Cnipodectes superrufus</i>	622	<i>Dendrocincla merula</i>	523	<i>Gallinago paraguayiae</i>	200	<i>Hypocnemoides maculicauda</i>	473
<i>Coccyzna minuta</i>	231	<i>Dendrocolaptes juruanus</i>	541	<i>Gallinula galeata</i>	191	<i>Ibycter americanus</i>	391
<i>Coccyzus americanus</i>	236	<i>Dendrocolaptes picumnus</i>	543	<i>Gampsonyx swainsonii</i>	149	<i>Icterus cayanensis</i>	773
<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>	238	<i>Dendrocoryna autumnalis</i>	101	<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	759	<i>Icterus croconotus</i>	774
<i>Coccyzus euleryi</i>	237	<i>Dendrocoryna viduata</i>	100	<i>Geothlypis agilis</i>	758	<i>Ictinia plumbea</i>	155
<i>Coccyzus melacoryphus</i>	235	<i>Dendroplex picus</i>	537	<i>Geotrygon montana</i>	229	<i>Inezia inornata</i>	649
<i>Cochlearius cochlearius</i>	124	<i>Dichrozona cincta</i>	460	<i>Geranoaetus albicaudatus</i>	165	<i>Inezia subflava</i>	650
<i>Coereba flaveola</i>	781	<i>Discosura langsdorffi</i>	301	<i>Geranoospiza caerulescens</i>	159	<i>Iodopleura isabellae</i>	599
<i>Colaptes punctigula</i>	381	<i>Dixiphia pipra</i>	589	<i>Glaucidium brasilianum</i>	253	<i>Isteria hauxwelli</i>	454
<i>Colonia colonus</i>	699	<i>Donacobius atricapilla</i>	744	<i>Glaucidium hardyi</i>	252	<i>Ixobrychus exilis</i>	126
<i>Columbina minuta</i>	218	<i>Dromococcyx pavoninus</i>	243	<i>Glaucis birsutus</i>	285	<i>Jabiru mycteria</i>	118
<i>Columbina picui</i>	220	<i>Dromococcyx phasianellus</i>	242	<i>Glyptorhynchus spirurus</i>	527	<i>Jacamerops aureus</i>	340
<i>Columbina talpacoti</i>	219	<i>Dryophila devillei</i>	494	<i>Grallaria eludens</i>	509	<i>Jacana jacana</i>	213
<i>Conioptilon mcilhennyi</i>	612	<i>Dryocopus lineatus</i>	387	<i>Griseotyrannus aurantioatrocristatus</i>	695	<i>Lampropsar tanagrinus</i>	775
<i>Conirostrum speciosum</i>	825	<i>Egretta thula</i>	133	<i>Gymnoderus foetidus</i>	611	<i>Lamprospiza melanoleuca</i>	780
<i>Conopias parvus</i>	698	<i>Egretta caerulea</i>	134	<i>Gymnopithys salvini</i>	504	<i>Laniocera hypopyrra</i>	598
<i>Conopias trivirgatus</i>	697	<i>Elaenia chilensis</i>	655	<i>Habia rubica</i>	841	<i>Lanio cristatus</i>	794
<i>Conopophaga aurita</i>	507	<i>Elaenia flavogaster</i>	653	<i>Hafferia fortis 1868</i>)	487	<i>Lanio luctuosus</i>	793
<i>Conopophaga peruviana</i>	508	<i>Elaenia parvirostris</i>	656	<i>Harpagus bidentatus</i>	150	<i>Lanio penicillatus</i>	798
<i>Conothraupis speculigera</i>	786	<i>Elaenia spectabilis</i>	654	<i>Harpia harpyja</i>	174	<i>Lanio rufiventer</i>	795
<i>Contopus cinereus</i>	712	<i>Elanoides forficatus</i>	148	<i>Helicolestes hamatus</i>	158	<i>Lanio surinamus</i>	797
<i>Contopus cooperi</i>	710	<i>Electron platyrhynchum</i>	328	<i>Heliodoxa aurescens</i>	311	<i>Lanio versicolor</i>	796
<i>Contopus virens</i>	711	<i>Empidonax alborum</i>	709	<i>Heliomaster furcifer</i>	314	<i>Laterallus exilis</i>	188
<i>Coragyps atratus</i>	142	<i>Empidonomus varius</i>	696	<i>Heliomaster longirostris</i>	313	<i>Laterallus fasciatus</i>	186

<i>Laterallus melanophaius</i>	187	<i>Myiodynastes luteiventris</i>	683	<i>Opisthocomus boazini</i>	230	<i>Pitangus sulphuratus</i>	680
<i>Laterallus viridis</i>	185	<i>Myiodynastes maculatus</i>	684	<i>Ornithion inerme</i>	651	<i>Platalea ajaja</i>	138
<i>Lathrotriccus eulerei</i>	708	<i>Myiopagis caniceps</i>	658	<i>Ortalis guttata</i>	106	<i>Platyrrinchus coronatus</i>	619
<i>Legatus leucophaius</i>	669	<i>Myiopagis flavivertex</i>	659	<i>Orthopsittaca manilatus</i>	408	<i>Platyrrinchus platyrhynchos</i>	620
<i>Lepidocolaptes fatimalimae</i>	538	<i>Myiopagis gaimardii</i>	657	<i>Pachyrampus castaneus</i>	605	<i>Pluvialis dominica</i>	197
<i>Lepidothrix coronata</i>	583	<i>Myiopagis viridicata</i>	660	<i>Pachyrampus marginatus</i>	607	<i>Podilymbus podiceps</i>	115
<i>Leptodon cayanensis</i>	146	<i>Myiophobus fasciatus</i>	700	<i>Pachyrampus minor</i>	608	<i>Poecilotriccus albifacies</i>	636
<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	626	<i>Myiornis ecaudatus</i>	639	<i>Pachyrampus polychopterus</i>	606	<i>Poecilotriccus capitalis</i>	637
<i>Leptotila rufaxilla</i>	227	<i>Myiothlypis fulvicauda</i>	762	<i>Pachyrampus rufus</i>	604	<i>Poecilotriccus latirostris</i>	638
<i>Leptotila verreauxi</i>	226	<i>Myiozetetes cayanensis</i>	687	<i>Pachyrampus xanthogenys</i>	603	<i>Polioptila plumbea</i>	746
<i>Leucophaeus atricilla</i>	214	<i>Myiozetetes granadensis</i>	689	<i>Pandion haliaetus</i>	145	<i>Polytmus theresiae</i>	308
<i>Leucopternis kuhli</i>	167	<i>Myiozetetes luteiventris</i>	690	<i>Panyptila cayennensis</i>	284	<i>Porphyrio flavirostris</i>	193
<i>Liosceles thoracicus</i>	512	<i>Myiozetetes similis</i>	688	<i>Parabuteo leucorrhous</i>	164	<i>Porphyrio martinicus</i>	192
<i>Lipaugus vociferans</i>	609	<i>Myrmelastes humaythae</i>	479	<i>Pardirallus nigricans</i>	190	<i>Porphyrolaema porphyrolaema</i>	610
<i>Lophornis chalybeus</i>	300	<i>Myrmelastes hypertychus</i>	478	<i>Parkertbraustes humeralis</i>	785	<i>Primolius coloni</i>	409
<i>Lophotrix cristata</i>	248	<i>Myrmelastes leucostigma</i>	480	<i>Paroaria gularis</i>	812	<i>Procacicus solitarius</i>	767
<i>Lophotriccus eulophotes</i>	647	<i>Myrmelastes schistaceus</i>	477	<i>Passer domesticus</i>	852	<i>Progne chalybea</i>	729
<i>Lophotriccus vittosus</i>	646	<i>Myrmoborus leucophrys</i>	484	<i>Patagioenas cayennensis</i>	223	<i>Progne elegans</i>	730
<i>Lurocalis semitorquatus</i>	265	<i>Myrmoborus lophotes</i>	481	<i>Patagioenas plumbea</i>	224	<i>Progne subis</i>	728
<i>Machaeropterus pyrocephalus</i>	588	<i>Myrmoborus myotherinus</i>	482	<i>Patagioenas speciosa</i>	222	<i>Progne tapera</i>	727
<i>Machaeropterus striolatus</i>	587	<i>Myrmophylax atroborax</i>	441	<i>Patagioenas subvinacea</i>	225	<i>Psarocolius angustifrons</i>	763
<i>Machetornis rixosa</i>	682	<i>Myrmothera campanisona</i>	511	<i>Pauxi tuberosa</i>	111	<i>Psarocolius bifasciatus</i>	766
<i>Malacoptila rufa</i>	349	<i>Myrmotherula axillaris</i>	446	<i>Penelope jacquacu</i>	107	<i>Psarocolius decumanus</i>	765
<i>Malacoptila semicincta</i>	348	<i>Myrmotherula brachyura</i>	442	<i>Phaeomyias murina</i>	663	<i>Psarocolius viridis</i>	764
<i>Manacus manacus</i>	585	<i>Myrmotherula heteroptera</i>	451	<i>Phaethornis bourcieri</i>	292	<i>Pseudastur albicollis</i>	166
<i>Megaceryle torquata</i>	323	<i>Myrmotherula ignota</i>	443	<i>Phaethornis hispidus</i>	289	<i>Pseudocolopteryx acutipennis</i>	664
<i>Megarynchus pitangua</i>	686	<i>Myrmotherula longipennis</i>	449	<i>Phaethornis malaris</i>	293	<i>Psittacara leucophthalmus</i>	411
<i>Megascops choliba</i>	246	<i>Myrmotherula menetriesii</i>	452	<i>Phaethornis philippii</i>	291	<i>Psophia leucoptera</i>	180
<i>Megascops usta</i>	247	<i>Myrmotherula multostriata</i>	445	<i>Phaethornis ruber</i>	288	<i>Pteroglossus beanbarnaesii</i>	370
<i>Melanerpes cruentatus</i>	374	<i>Myrmotherula oreni</i>	450	<i>Phaetusa simplex</i>	216	<i>Pteroglossus castanotis</i>	368
<i>Mesembrinibis cayennensis</i>	136	<i>Myrmotherula sclateri</i>	444	<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	120	<i>Pteroglossus inscriptus</i>	366
<i>Metopothrix aurantiaca</i>	572	<i>Myrmotherula sunensis</i>	448	<i>Phalaropus tricolor</i>	212	<i>Pteroglossus mariae</i>	367
<i>Micrastur buckleyi</i>	399	<i>Nannopsittaca dachilleae</i>	421	<i>Pharomachrus pavoninus</i>	322	<i>Pulsatrix perspicillata</i>	249
<i>Micrastur gilvicollis</i>	396	<i>Nasica longirostris</i>	539	<i>Phengopedius genibarbis</i>	738	<i>Pygoptila stellaris</i>	433
<i>Micrastur mirandollei</i>	397	<i>Nemosia pileata</i>	787	<i>Philohydor lictor</i>	681	<i>Pygohelidon cyanoleuca</i>	723
<i>Micrastur ruficollis</i>	395	<i>Neocrex erythrops</i>	189	<i>Philydor erythrocerum</i>	563	<i>Pyrrilia barrabandi</i>	425
<i>Micrastur semitorquatus</i>	398	<i>Neotantes niger</i>	435	<i>Philydor erythropterus</i>	564	<i>Pyrocephalus rubinus</i>	703
<i>Microcerculus bambla</i>	735	<i>Neomorphus geoffroyi</i>	244	<i>Philydor pyrrhodes</i>	566	<i>Pyrrhura roseifrons</i>	414
<i>Microcerculus marginatus</i>	734	<i>Neopelma sulphureiventer</i>	576	<i>Philydor rufum</i>	565	<i>Pyrrhura rupicola</i>	415
<i>Micrococcyx cinereus</i>	232	<i>Neopipo cinnamomea</i>	618	<i>Phimosus infuscatus</i>	137	<i>Querula purpurata</i>	615
<i>Microrhopias quixensis</i>	434	<i>Nomonyx dominica</i>	105	<i>Phegopsis erythroptera</i>	503	<i>Ramphastos tucanus</i>	362
<i>Microxenops milleri</i>	551	<i>Nonnula rubecula</i>	350	<i>Phegopsis nigromaculata</i>	501	<i>Ramphastos vitellinus</i>	363
<i>Mionectes amazonus</i>	623	<i>Nonnula ruficapilla</i>	352	<i>Phoenicoparrus jamesi</i>	116	<i>Ramphocaenus melanurus</i>	745
<i>Mionectes oleagineus</i>	624	<i>Nonnula sclateri</i>	351	<i>Piaya cayana</i>	233	<i>Ramphocelus carbo</i>	791
<i>Milvago chimachima</i>	393	<i>Notharchus hyperrhynchus</i>	341	<i>Piaya melanogaster</i>	234	<i>Ramphocelus nigrogularis</i>	790
<i>Molothrus bonariensis</i>	778	<i>Notharchus ordii</i>	342	<i>Picus chrysocloros</i>	380	<i>Ramphotrigon fuscicauda</i>	672
<i>Molothrus oryzivorus</i>	777	<i>Notharchus tectus</i>	343	<i>Picus flavigula</i>	379	<i>Ramphotrigon megacephalum</i>	670
<i>Momotus momota</i>	330	<i>Nothocrax urumutum</i>	109	<i>Picus leucolaemus</i>	378	<i>Ramphotrigon ruficauda</i>	671
<i>Monasa flavirostris</i>	356	<i>Nyctibius aethereus</i>	258	<i>Picumnus aurifrons</i>	371	<i>Rhagmatorhina melanosticta</i>	506
<i>Monasa morphoeus</i>	355	<i>Nyctibius bracteatus</i>	261	<i>Picumnus rufiventris</i>	372	<i>Rhynchocyclus olivaceus</i>	629
<i>Monasa nigrifrons</i>	353	<i>Nyctibius grandis</i>	257	<i>Picumnus subtilis</i>	373	<i>Rhytipterna simplex</i>	678
<i>Morphnus guianensis</i>	173	<i>Nyctibius griseus</i>	259	<i>Pilherodius pileatus</i>	132	<i>Riparia riparia</i>	732
<i>Muscisaxicola fluviatilis</i>	713	<i>Nyctibius leucopterus</i>	260	<i>Pionites leucogaster</i>	424	<i>Rostrhamus sociabilis</i>	157
<i>Mycteria americana</i>	119	<i>Nycticorax nycticorax</i>	127	<i>Pionus menstruus</i>	426	<i>Rupornis magnirostris</i>	163
<i>Myiarchus ferox</i>	675	<i>Nyctiphrynus ocellatus</i>	262	<i>Pipraeidea melanonota</i>	813	<i>Rynchops niger</i>	217
<i>Myiarchus swainsoni</i>	674	<i>Nystalus obamai</i>	347	<i>Pipra fasciicauda</i>	579	<i>Saltator azarae</i>	783
<i>Myiarchus tuberculifer</i>	673	<i>Ochthornis littoralis</i>	706	<i>Pipra filicauda</i>	578	<i>Saltator grossus</i>	784
<i>Myiarchus tyrannulus</i>	676	<i>Odontoborus gujanensis</i>	112	<i>Piprites chloris</i>	617	<i>Saltator macrimus</i>	782
<i>Myiobius atricaudus</i>	595	<i>Odontoborus stellatus</i>	113	<i>Piranga olivacea</i>	840	<i>Sarcoramphus papa</i>	143
<i>Myiobius barbatus</i>	594	<i>Onychorhynchus coronatus</i>	592	<i>Piranga rubra</i>	839	<i>Schiffornis amazonum</i>	597

<i>Schiffornis major</i>	596	<i>Thamnomanes saturninus</i>	457	<i>Vultur gryphus</i>	144
<i>Schistochlamys melanopis</i>	811	<i>Thamnomanes schistogynus</i>	458	<i>Willisornis poecilinotus</i>	499
<i>Sciapophylax hemimelaena</i>	488	<i>Thamnophilus aethiops</i>	465	<i>Xenopipo atronitens</i>	590
<i>Sclateria naevia</i>	476	<i>Thamnophilus amazonicus</i>	467	<i>Xenops minutus</i>	547
<i>Sclerurus albigularis</i>	520	<i>Thamnophilus divisorius</i>	468	<i>Xenops rutilans</i>	549
<i>Sclerurus caudacutus</i>	519	<i>Thamnophilus doliiatus</i>	462	<i>Xenops tenuirostris</i>	546
<i>Sclerurus macconnelli</i>	517	<i>Thamnophilus murinus</i>	464	<i>Xiphocolaptes promeropirhynchus</i>	544
<i>Sclerurus rufigularis</i>	518	<i>Thamnophilus schistaceus</i>	463	<i>Xipborhynchus chunchotambo</i>	529
<i>Selenidera reinwardtii</i>	365	<i>Thlypopsis sordida</i>	788	<i>Xipborhynchus elegans</i>	531
<i>Sicalis flaveola</i>	826	<i>Threnetes leucurus</i>	287	<i>Xipborhynchus guttatus</i>	534
<i>Sirystes sibilator</i>	677	<i>Thripophaga fusciceps</i>	575	<i>Xipborhynchus obsoletus</i>	533
<i>Sittasomus griseicapillus</i>	525	<i>Tigrisoma lineatum</i>	122	<i>Xipborhynchus ocellatus</i>	530
<i>Spizaetus melanoleucus</i>	176	<i>Tinamus guttatus</i>	88	<i>Zebrilus undulatus</i>	125
<i>Spizaetus ornatus</i>	177	<i>Tinamus major</i>	87	<i>Zimmerius gracilipes</i>	648
<i>Spizaetus tyrannus</i>	175	<i>Tinamus tao</i>	86		
<i>Sporophila americana</i>	829	<i>Tityra cayana</i>	601		
<i>Sporophila angolensis</i>	837	<i>Tityra inquisitor</i>	600		
<i>Sporophila bouvronides</i>	831	<i>Tityra semifasciata</i>	602		
<i>Sporophila caeruleescens</i>	835	<i>Todirostrum chrysocrotaphum</i>	635		
<i>Sporophila castaneiventris</i>	836	<i>Todirostrum maculatum</i>	634		
<i>Sporophila lineola</i>	832	<i>Tolmomyias assimilis</i>	631		
<i>Sporophila luctuosa</i>	833	<i>Tolmomyias flaviventris</i>	633		
<i>Sporophila maximiliani</i>	838	<i>Tolmomyias poliocephalus</i>	632		
<i>Sporophila murallae</i>	830	<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	630		
<i>Sporophila nigricollis</i>	834	<i>Topaza pyra</i>	298		
<i>Sporophila schistacea</i>	828	<i>Touit buetii</i>	422		
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	726	<i>Touit purpuratus</i>	423		
<i>Sternula superciliiaris</i>	215	<i>Tringa flavipes</i>	205		
<i>Streptoprocne zonaris</i>	275	<i>Tringa melanolenca</i>	204		
<i>Strix hubula</i>	251	<i>Tringa solitaria</i>	203		
<i>Strix virgata</i>	250	<i>Troglodytes musculus</i>	736		
<i>Sturnella militaris</i>	779	<i>Trogon collaris</i>	321		
<i>Sublegatus modestus</i>	701	<i>Trogon curucui</i>	319		
<i>Sublegatus obscurior</i>	702	<i>Trogon melanurus</i>	316		
<i>Synallaxis albigularis</i>	568	<i>Trogon ramonianus</i>	318		
<i>Synallaxis cherriei</i>	570	<i>Trogon rufus</i>	320		
<i>Synallaxis gujanensis</i>	571	<i>Trogon viridis</i>	317		
<i>Synallaxis rutilans</i>	569	<i>Turdus albicollis</i>	754		
<i>Syndactyla ucayalae</i>	567	<i>Turdus amaurochalinus</i>	752		
<i>Tachornis squamata</i>	283	<i>Turdus harrisi</i>	749		
<i>Tachybaptus dominicus</i>	114	<i>Turdus ignobilis</i>	753		
<i>Tachycineta albiventer</i>	731	<i>Turdus lawrencii</i>	751		
<i>Tachyphonus phoenicius</i>	789	<i>Turdus sanchezorum</i>	750		
<i>Tangara callophrys</i>	804	<i>Tyrannetes stolzmanni</i>	577		
<i>Tangara chilenses</i>	802	<i>Tyrannopsis sulphurea</i>	685		
<i>Tangara cyanicollis</i>	809	<i>Tyrannulus elatus</i>	661		
<i>Tangara episcopus</i>	806	<i>Tyrannus albigularis</i>	691		
<i>Tangara gyrola</i>	799	<i>Tyrannus melancholicus</i>	692		
<i>Tangara mexicana</i>	801	<i>Tyrannus savana</i>	693		
<i>Tangara nigrocincta</i>	808	<i>Tyrannus tyrannus</i>	694		
<i>Tangara palmarum</i>	807	<i>Tyto furcata</i>	245		
<i>Tangara scharnckii</i>	800	<i>Urubitinga urubitinga</i>	162		
<i>Tangara velia</i>	803	<i>Vanellus cayanus</i>	195		
<i>Tangara xanthogastra</i>	805	<i>Vanellus chilensis</i>	196		
<i>Tapera naevia</i>	241	<i>Veniliornis affinis</i>	376		
<i>Taraba major</i>	471	<i>Veniliornis passerinus</i>	377		
<i>Terentriacus erythrorus</i>	593	<i>Vireo chivi</i>	716		
<i>Tersina viridis</i>	814	<i>Vireo flavoviridis</i>	717		
<i>Thalurania furcata</i>	304	<i>Vireolanus leucotis</i>	715		
<i>Thamnomanes ardesiacus</i>	456	<i>Volatinia jacarina</i>	827		

Índice de nomes em inglês

Acre Antshrike.....	468
Agami Heron	123
Alder Flycatcher	709
Amazonian Antpitta	510
Amazonian Antshrike.....	467
Amazonian Grayish Saltator.....	783
Amazonian Motmot	330
Amazonian Parrotlet.....	421
Amazonian Pygmy-Owl.....	252
Amazonian Schiffornis.....	597
Amazonian Scrub-Flycatcher.....	702
Amazonian Streaked-Antwren.....	445
Amazonian Swift.....	280
Amazonian Trogon.....	318
Amazonian Tyrannulet.....	650
Amazonian Umbrellabird	616
Amazon Kingfisher.....	324
American Barn Owl.....	245
American Golden-Plover.....	197
American Kestrel.....	400
American Pygmy Kingfisher	325
Amethyst Woodstar	315
Andean condor.....	144
Anhinga	121
Aplomado Falcon.....	403
Ash-colored Cucko.....	232
Ash-throated Gnatcatcher	508
Austral Screech-Owl.....	247
Azure Gallinule.....	193
Baird's Sandpiper.....	208
Bamboo Antshrike.....	470
Bamboo Antwren.....	450
Bananaquit.....	781
Banded Antbird.....	460
Band-rumped Swift.....	276
Band-tailed Antbird	473
Band-tailed Manakin.....	579
Band-tailed Oropendola.....	770
Bank Swallow.....	732
Bar-bellied Woodcreeper.....	545
Bar-breasted Piculet.....	371
Bare-faced Ibis.....	137
Bare-necked Fruiterow.....	611
Barn Swallow	733
Barred Antshrike	462
Barred Forest-Falcon.....	395
Bartlett's Tinamou.....	97
Bat Falcon	402
Bay-headed Tanager.....	799
Bicolored Hawk.....	154
Black-and-white Hawk-Eagle.....	176
Black-and-white Seedeater.....	833
Black-and-white Tanager.....	786
Black-and-white Tody-Tyrant.....	637
Black Antbird.....	492
Black-backed Water-Tyrant.....	704
Black-banded Crake.....	186
Black-banded Owl.....	251
Black-banded Woodcreeper.....	543
Black-bellied Cucko.....	234
Black-bellied Thorntail.....	301
Black-bellied Whistling-Duck.....	101
Black-billed Cuckoo.....	238
Black-billed Thrush	753
Black Bushbird	435
Black-capped Becard	607
Black-capped Donacobius.....	744
Black-capped Parakeet.....	415
Black-capped Tinamou.....	94
Black Caracara	390
Black-collared Hawk.....	156
Black-crowned-Night-Heron	127
Black-crowned Tityra.....	600
Black-eared Fairy.....	312
Black-faced Antbird.....	482
Black-faced Antthrush.....	514
Black-faced Cotinga.....	612
Black-faced Dacnis.....	816
Black-faced Tanager.....	811
Black-fronted Nunbird.....	353
Black Hawk-Eagle.....	175
Blackish Antbird.....	491
Blackish Nightjar.....	266
Blackish Rail.....	190
Black Manakin	590
Black-necked Stilt.....	199
Black Skimmer.....	217
Black-spotted Bare-eye	501
Black-tailed Flycatcher.....	595
Black-tailed Leaf-tosser.....	519
Black-tailed Tityra	601
Black-tailed Trogon.....	316
Black-throated.....	297
Black-throated Antbird	441
Black-throated Trogon.....	320
Black Vulture.....	142
Blue-and-white Swallow.....	723
Blue-and-yellow Macaw	404
Blue-backed Manakin	591
Blue-black Grassquit.....	827
Blue-cheeked Jacamar.....	335
Blue-chinned Sapphire	302
Blue-crowned Manakin	583
Blue-crowned Trogon	319
Blue Dacnis.....	818
Blue-gray Tanager	806
Blue Ground-Dove.....	221
Blue-headed Macaw	409
Blue-headed Parrot	426
Blue-naped Chlorophonia.....	850
Blue-necked Tanager	809
Blue-tailed Emerald	303
Blue-throated Piping-Guan	108
Blue-tufted Startroa.....	314
Blue-winged Parrotlet.....	416
Blue-winged Teal.....	104
Bluish-fronted Jacamar.....	336
Bluish-slate Antshrike.....	458
Boat-billed Flycatcher.....	686
Boat-billet Heron	124
Bran-colored Flycatcher.....	700
Brazilian Teal.....	103
Brazilian Tinamou.....	93
Bright-rumped Attila	668
Broad-billed Motmot.....	328
Broad-winged Hawk.....	169
Bronzy Jacamar.....	338
Brown-banded Puffbird.....	342
Brown-chested Martin.....	727
Brown-crested Flycatcher.....	676
Brownish Twistwing.....	621
Brown-mandibled Aracari.....	367
Brown-rumped Foliage-gleaner.....	556
Brown Tinamou.....	91
Buckley's Forest-Falcon.....	399
Buff-breasted Sandpiper	211
Buff-breasted Wren.....	740
Buff-fronted Foliage-gleaner.....	565
Buff-rumped Warbler.....	762
Buff-throated Foliage-gleaner	558
Buff-throated Saltator.....	782
Buff-throated Woodcreeper	534
Burrowing Owl.....	254
Canada Warbler	760
Capped Heron	132
Caqueta Seedeater	830
Casqued Oropendola.....	769
Cattle Egret.....	129
Cattle Tyrant.....	682
Channel-billed Toucan	363
Chestnut-bellied Seedeater	836
Chestnut-bellied Seed-Finch.....	837
Chestnut-belted Gnatcatcher.....	507
Chestnut-capped Puffbird	344
Chestnut-crowned Becard	605
Chestnut-crowned Foliage-gleaner.....	555
Chestnut-eared Aracari.....	368
Chestnut-fronted Macaw	407
Chestnut-headed Crake	184
Chestnut-shouldered Antwren.....	432
Chestnut-tailed Antbird.....	488
Chestnut-throated Spinetail.....	570
Chestnut-vented Conebill.....	825
Chestnut-winged Foliage-gleaner.....	564
Chestnut-winged Hookbill.....	553
Chestnut Woodpecker.....	383
Chilean Elaenia.....	655
Chimney Swift	279
Chivi Vireo	716
Cinereous Becard	604
Cinereous Mourner.....	598
Cinereous Tinamou	89
Cinnamon Attila.....	665
Cinnamon Manakin-Tyrant	618
Cinnamon-rumped Foliage-gleaner.....	566
Cinnamon-throated Woodcreeper.....	540
Citron-bellied Attila	666
Clack-throated Toucanet.....	364
Cobalt-winged Parakeet.....	418
Cocoi Heron	130
Collared Forest-Falcon.....	398
Collared Plover.....	198
Collared Puffbird.....	346
Collared Trogon.....	321
Common Gallinule	191
Common Potoo.....	259
Common Scale-backed Antbird	499
Common Waxbill	851
Connecticut Warbler.....	758
Crane Hawk	159
Cream-colored Woodpecker.....	384
Creamy-bellied.....	752
Crested Eagle.....	173
Crested Oropendola	765
Crested Owl.....	248
Crimson-crested Woodpecker.....	389
Crowned Slaty Flycatcher	695
Curl-crested Aracari.....	370
Dark-biller Cucko.....	235
Dark-breasted Spinetail	568
Dot-backed Antbird.....	475
Dot-winged Antwren	434
Double-banded Pygmy-Tyrant.....	646
Double-collared Seedeater.....	835
Double-toothed Kite.....	150
Drab Water-Tyrant.....	706
Dull-capped Attila.....	667
Dusky-billed Parrotlet	417
Dusky-capped Flycatcher.....	673
Dusky-capped Greenlet	720
Dusky-cheeked Foliage-gleaner	561
Dusky-chested Flycatcher.....	690
Dusky-headed Parakeet.....	412
Dusky-tailed Flatbill.....	672
Dusky-throated Antshrike	456
Dwarf Tyrant-Manakin	577
Eastern Kingbird.....	694
Eastern Wood-Pewee.....	711
Elegant Woodcreeper	531
Elusive Antpitta.....	509
Epaulet Oriole	773
Euler's Flycatcher.....	708
Fasciated Antshrike.....	469
Fawn-breasted Tanager	813
Ferruginous Pygmy-Owl.....	253
Festive Coquette.....	300
Festive Parrot.....	427
Fiery-capped Manakin.....	588
Fiery Topaz	298
Fine-barred Piculet.....	373
Flame-crested Tanager	794
Flame-crowned	586
Flammulated Pygmy-Tyrant.....	642
Forest Elaenia.....	657
Fork-tailed Flycatcher.....	693

Fork-tailed Palm-Swift.....	283	Hauxwell's Thrush.....	749	Merlin.....	401	Plain Softtail.....	575
Fork-tailed Woodnymph.....	304	Hoatzin.....	230	Mottled Owl.....	250	Plain-throated Antwren.....	454
Fulvous-chinned Nunlet.....	351	Hooded Tanager.....	787	Mouse-colored Antshrike.....	464	Plain Tyrannulet.....	649
Fulvous-crested Tanager.....	797	Hooch-billed Kite.....	147	Mouse-colored Tyrannulet.....	663	Plain-winged Antshrike.....	463
Fuscous Flycatcher.....	707	Horned Screamer.....	99	Moustached Antwren.....	443	Plain Xenops.....	547
Giant Cowbird.....	777	House Sparrow.....	852	Moustached Wren.....	738	Plumbeous Antbird.....	478
Gilded Barbet.....	359	Humaita Antbird.....	479	Muscovy Duck.....	102	Plumbeous Kite.....	155
Glittering-throated Emerald.....	309	Inambari Woodcreeper.....	538	Musician Wren.....	743	Plumbeous Pigeon.....	224
Goeldi's Antbird.....	486	Jabiru.....	118	Nacunda Nighthawk.....	272	Plum-throated Cotinga.....	613
Golden-bellied Euphonia.....	846	James's Flamingo.....	116	Napo Stipple-throated Antwren.....	437	Point-tailed Palmcreeper.....	550
Golden-collared Toucanet.....	365	Johannes's Tody-Tyrant.....	644	Needle-billed Hermit.....	291	Purple Gallinule.....	192
Golden-crowned Spadebill.....	619	Juruá Woodcreeper.....	541	Neotropic Cormorant.....	120	Purple Honeycreeper.....	820
Golden-crowned Warbler.....	761	King Vulture.....	143	Nocturnal Curassow.....	109	Purple Martin.....	728
Golden-green Woodpecker.....	380	Ladder-tailed Nightjar.....	270	Ocellated Poorwill.....	262	Purple-throated Cotinga.....	610
Golden-tailed Sapphire.....	307	Larg-billed Tern.....	216	Ocellated Woodcreeper.....	530	Purple-throated Euphonia.....	844
Gould's Jewelfront.....	311	Large Elaenia.....	654	Ochre-bellied Flycatcher.....	624	Purple-throated Fruitcrow.....	615
Gray Antbird.....	490	Large-headed Flatbill.....	670	Olivaceous Flatbill.....	629	Purus Antwren.....	451
Gray Antwren.....	452	Laughing Falcon.....	394	Olivaceous Woodcreeper.....	525	Purus Jacamar.....	332
Gray-bellied Hawk.....	151	Laughing Gull.....	214	Olive-backed Foliage-gleaner.....	560	Pygmy Antwren.....	442
Gray-breasted Crake.....	188	Lawrence's Thrush.....	751	Olive Oropendola.....	766	Razor-billed Curassow.....	111
Gray-breasted Martin.....	729	Least Bittern.....	126	Olive-sided Flycatcher.....	710	Red-and-green Macaw.....	406
Gray-breasted Sabrewing.....	295	Least Grebe.....	114	Opal-crowned Tanager.....	804	Red-billed Pied Tanager.....	780
Gray-capped Flycatcher.....	689	Least Sandpiper.....	206	Opal-rumped Tanager.....	803	Red-billed Scythebill.....	536
Gray-cheeked Thrush.....	747	Lemon-chested Greenlet.....	718	Orange-backed Troupial.....	774	Red-billed Macaw.....	408
Gray-chested Greenlet.....	719	Lemon-throated Barbet.....	360	Orange-bellied Euphonia.....	848	Red-breasted Blackbird.....	779
Gray-crowned Flycatcher.....	632	Leneated Woodpecker.....	387	Orange-cheeked Parrot.....	425	Red-capped Cardinal.....	812
Gray Elaenia.....	658	Lesser Kiskadee.....	681	Orange-fronted Plushcrown.....	572	Red-crowned Ant-Tanager.....	841
Gray-frontal Dove.....	227	Lesser Swallow-tailed Swift.....	284	Orange-headed Tanager.....	788	Reddish Hermit.....	288
Gray Hawk.....	168	Lesser Yellow-headed Vulture.....	140	Orange-winged Parrot.....	429	Reddish-winged Bare-eye.....	503
Gray-headed Kite.....	146	Lesser Yellowlegs.....	205	Ornate Antwren.....	439	Red-headed Manakin.....	581
Gray-headed Tanager.....	798	Lesson's Seedeater.....	831	Ornate Hawk-Eagle.....	177	Red-legged Honeycreeper.....	821
Grayish Mourner.....	678	Lettered Aracari.....	366	Osprey.....	145	Red-necked Woodpecker.....	388
Gray-necked Wood-Rail.....	181	Limpkin.....	179	Paint-billed Crake.....	189	Red-rumped Cacique.....	768
Gray-rumped Swift.....	277	Lined Forest-Falcon.....	396	Pale-legged Hornero.....	552	Red-shouldered Tanager.....	789
Gray-throated Leaf-tosser.....	520	Lined Seedeater.....	832	Pale-rumped Swift.....	278	Red-stained Woodpecker.....	376
Gray Tinamou.....	86	Little Blue Heron.....	134	Pale-tailed Barbthroat.....	287	Red-throated Caracara.....	391
Gray Wren.....	741	Little Cuckoo.....	231	Pale-vented Pigeon.....	223	Red-winged Wood-Rail.....	182
Great Antshrike.....	471	Little Ground-Tyrant.....	713	Pale-winged Trumpeter.....	180	Ringed Antpipit.....	628
Great-billed Hermit.....	293	Little Nightjar.....	268	Palm Tanager.....	807	Ringed Kinkfisher.....	323
Great-billed Seed-Finch.....	838	Little Tinamou.....	90	Paradise Jacamar.....	339	Ringed Woodpecker.....	386
Great Black-Hawk.....	162	Little Woodpecker.....	377	Paradise Tanager.....	802	Rio Suno Antwren.....	448
Great Egret.....	131	Long-billed Gnatwren.....	745	Parl Kite.....	149	Roadside Hawk.....	163
Greater Ani.....	239	Long-billed Starthroat.....	313	Pauraque.....	267	Roseate Spoonbill.....	138
Greater Yellowlegs.....	204	Long-billed Woodcreeper.....	539	Pavonine Cuckoo.....	243	Rose-fronted Parakeet.....	414
Greater Yellow-headed Vulture.....	141	Long-crested Pygmy-Tyrant.....	647	Pavonine Quetzal.....	322	Rothschild's Blue Grosbeak.....	842
Great Jacamar.....	340	Long-tailed Potoo.....	258	Pearly-breasted Cuckoo.....	237	Round-tailed Manakin.....	582
Great Kiskadee.....	680	Long-tailed Tyrant.....	699	Pectoral Sandpiper.....	209	Royal Flycatcher.....	592
Great Potoo.....	257	Long-tailed Woodcreeper.....	524	Pectoral Sparrow.....	757	Ruby-topaz Hummingbird.....	299
Great Tinamou.....	87	Long-winged Antwren.....	449	Peruvian Recurvebill.....	567	Ruddy Ground-Dove.....	219
Green-and-gold Tanager.....	800	Madeira Stipple-throated Antwren.....	438	Peruvian Warbling-Antbird.....	497	Ruddy Pegeon.....	225
Green-and-rufous Kingfisher.....	327	Magpie Tanager.....	810	Pheasant Cuckoo.....	242	Ruddy Quail-Dove.....	229
Green Honeycreeper.....	822	Maguari Stork.....	117	Picui Ground-Dove.....	220	Ruddy Spinetail.....	569
Green Ibis.....	136	Manu Antbird.....	493	Pied-billed Grebe.....	115	Ruddy-tailed Flycatcher.....	593
Greenish Elaenia.....	660	Marbled Wood-Quail.....	112	Pied Lapwing.....	195	Rufescent Tiger-Heron.....	122
Green Kingfisher.....	326	Masked Crimson Tanager.....	790	Pied Puffbird.....	343	Rufous-bellied Euphonia.....	849
Green Oropendola.....	764	Masked Tanager.....	808	Pink-throated Becard.....	608	Rufous-breasted Hermit.....	285
Green-tailed Goldenthrout.....	308	Masked Tityra.....	602	Piratic Flycatcher.....	669	Rufous-breasted Piculet.....	372
Guira Tanager.....	823	Masked Yellowthroat.....	759	Plain-breasted Ground-Dove.....	218	Rufous-browed Peppershrike.....	714
Hairy-crested Antbird.....	506	Masked Duck.....	105	Plain-brown Woodcreeper.....	521	Rufous-capped Anthrush.....	513
Harpy Eagle.....	174	Mealy Parrot.....	428	Plain-crowned Spinetail.....	571	Rufous-capped Nunlet.....	352

Rufous Casiornis	679	Slate-colored Antbird	477	Summer Tanager	839	White-crested Spadebill.....	620
Rufous-fronted Antthrush.....	515	Slate-colored Grosbeak	784	Sunbittern.....	178	White-crowned Manakin.....	589
Rufous-headed Woodpecker	385	Slate-colored Hawk.....	160	Sungrebe	194	White-eyed Antwren.....	436
Rufous Motmot.....	329	Slate-colored Seedeater.....	828	Swainsoni Hawk	171	White-eyed Parakeet	411
Rufous-necked Puffbird.....	349	Slaty-backed Forest-Falcon.....	397	Swainson's Flycatcher	674	White-faced Whistling-Duck.....	100
Rufous Nightjar.....	263	Slaty-capped Shrike-Vireo.....	715	Swainson's Thrush	748	White-flanked Antwren.....	446
Rufous Potoo.....	261	Slender-billed Kite.....	158	Swallow-tailed Kite	148	White-fringed Antwren.....	453
Rufous-rumped Foliage-gleaner.....	563	Slender-billed Xenops	546	Swallow Tanager.....	814	White-fronted Nunbird.....	355
Rufous-sided Crake.....	187	Slender-footed Tyrannulet	648	Swallow-winged Puffbird.....	357	White Hawk	166
Rufous-tailed Antwren.....	440	Small-billed Elaenia.....	656	Tataupa Tinamou	98	White-headed Marsh Tyrant.....	705
Rufous-tailed Flatbill.....	671	Smooth-billed Ani.....	240	Tawny-crowned Greenlet.....	721	White-lined Antbird.....	481
Rufous-tailed Foliage-gleaner	562	Snail Kite	157	Tawny-throated Leaf-tosser	517	White-lored Tyrannulet	651
Rufous-tailed Xenops	551	Snethlage's Tody-Tyrant	641	Thick-billed Euphonia.....	845	White-necked Jacobin	296
Rufous-throated Sapphire.....	305	Snowy Egret.....	133	Three-striped Flycatcher	697	White-necked Puffbird.....	341
Rufous Twistwing.....	622	Social Flycatcher.....	688	Thrush-like Antpitta	511	White-necked Thrush.....	754
Rufous-vented Ground-Cuckoo	244	Solitary Black Caciue	767	Thrush-like Wren	737	White-rumped Sandpiper.....	207
Rufous-winged Antwren	461	Solitary Sandpiper	203	Tiny Hawk	152	White-rumped Hawk.....	164
Russet-backed Oropendola.....	763	Sooty Antbird	487	Tody-Tyrant.....	640	White-shouldered Antbird.....	485
Russet-crowned Crake.....	185	South American Snipe.....	200	Tropical Gnatcatcher.....	746	White-shouldered Antshrike	465
Rusty-backed Spinetail.....	573	Southern Beardless-Tyrannulet	652	Tropical Kingbird.....	692	White-shouldered Tanager.....	793
Rusty-belted Tapaculo	512	Southern Caracara.....	392	Tropical Pewee.....	712	White-tailed Hawk	165
Rusty-breasted Nunlet.....	350	Southern House Wren.....	736	Tropical Screech-Owl.....	246	White-tailed Trogon.....	317
Rusty-fronted Tody-Flycatcher	638	Southern Lapwing.....	196	Tschudi's Woodcreeper	529	White-thighed Swallow.....	725
Rusty-margined Flycatcher	687	Southern Martin	730	Tui Parakeet.....	420	White-throated Antbird	504
Rusty Tinamou	96	Southern Rough-winged Swallow.....	726	Turkey Vulture.....	139	White-throated Jacamar	333
Saffron Finch	826	Southern Scrub-Flycatcher	701	Turquoise Tanager	801	White-throated Kingbird	691
Sand-colored Nightawk.....	273	Spangled Cotinga	614	Undulated Antshrike.....	472	White-throated Tinamou	88
Sapphire-rumped Parrotlet.....	423	Speckled Chachalaca.....	106	Undulated Tinamou.....	92	White-throated Toucan	362
Sapphire-spangled Emerald.....	310	Speckled Spinetail.....	574	Uniform Crake	183	White-throated Woodpecker	378
Saturnine Antshrike	457	Spectacled Owl.....	249	Upland Sandpiper.....	201	White-tipped Dove	226
Savanna Hawk.....	161	Spix's Guan	107	Variagated Tinamou.....	95	White-vented Euphonia.....	847
Scaled Pigeon.....	222	Spot-backed Antbird.....	474	Variagated Flycatcher.....	696	White-winged Becard	606
Scaly-breasted Woodpecker	382	Spot-breasted Woodpecker.....	381	Varzea Schifformis	596	White-winged Potoo.....	260
Scaly-breasted Wren.....	734	Spot-tailed Nightjar.....	269	Varzea Thrush	750	White-winged Shrike-Tanager.....	796
Scarlet-crowned Barbet.....	358	Spotted Puffbird.....	345	Velvet-fronted Grackle.....	775	White-winged Swallow	731
Scarlet-hooded Barbet.....	361	Spotted Sandpiper.....	202	Vermilion Flycatcher.....	703	Wilson's Phalarope.....	212
Scarlet Macaw	405	Spotted Tody-Flycatcher	634	Violaceous Jay.....	722	Wing-banded Wren	735
Scarlet-shouldered Parrotlet	422	Spot-throated Woodcreeper	526	Watkins's Foliage-gleaner	554	Wing-barred Piprites.....	617
Scarlet Tanager	840	Spot-winged Antbird	480	Wattal Jacana	213	Wing-barred Seedeater.....	829
Scissor-tailed Nightjar.....	271	Spot-winged Antshrike.....	433	Wedge-billed Curassow.....	110	Wire-tailed Manakin.....	578
Sclater's Antwren.....	444	Squirrel Cuckoo.....	233	Wedge-billed Woodcreeper.....	527	Wood Stork	119
Screaming Piha	609	Starred Wood-Quail.....	113	Western MacConnell's Flycatcher.....	623	Yellow-backed Tanager	824
Selva Caciue	772	Stilt Sandpiper.....	210	Western Striolated-Puffbird.....	347	Yellow-bellied Dacnis	817
Semicollared Puffbird.....	348	Straight-billed Hermit.....	292	Western Striped Manakin.....	587	Yellow-bellied Elaenia	653
Sepia-capped Flycatcher.....	626	Straight-billed Woodcreeper	537	Whiskered Flycatcher	594	Yellow-bellied Seedeater.....	834
Sharp-shinned Hawk	153	Streaked Flycatcher	684	White-banded Swallow.....	724	Yellow-bellied Tanager	805
Sharp-tailed Ibis	135	Streaked Xenops.....	549	White-bearded Hermit	289	Yellow-billed Cucko	236
Shiny Cowbird	778	Striated Antbird	494	White-bearded Manakin.....	585	Yellow-billed Jacamar	334
Short-billed Honeycreeper.....	819	Striated Antthrush.....	516	White-bellied Dacnis	815	Yellow-billed Nunbird.....	356
Short-billed Leaf-tosser.....	518	Striated Heron	128	White-bellied Parrot.....	424	Yellow-billed Tern.....	215
Short-crested Flycatcher	675	Striped Cuckoo	241	White-bellied Tody-Tyrant.....	643	Yellow-breasted Flycatcher.....	633
Short-tailed Hawk	170	Striped Owl.....	255	White-breasted Wood-Wren.....	742	Yellow-breasted Warbling-Antbird.....	496
Short-tailed Nighthawk	265	Striped Woodcreeper.....	533	White-browed Antbird.....	484	Yellow-browed Antbird.....	495
Short-tailed Pygmy-Tyrant.....	639	Striped Woodhaunter.....	557	White-browed Hawk.....	167	Yellow-browed Sparrow	756
Short-tailed Swift.....	282	Strong-billed Woodcreeper	544	White-browed Purple-tuft.....	599	Yellow-browed Tody-Flycatcher	635
Sick's Swift.....	281	Stygian Owl.....	256	White-cheeked Tody-Tyrant	636	Yellow-cheeked Becard	603
Silky-tailed Nightjar	264	Subtropical Doradito.....	664	White-chinned Sapphire.....	306	Yellow-crested Tanager	795
Silver-beaked Tanager.....	791	Sulphur-bellied	576	White-chinned Swift	274	Yellow-crowned Elaenia.....	659
Silvered Antbird	476	Sulphur-bellied Flycatcher	683	White-chinned Woodcreeper.....	523	Yellow-crowned Parrot.....	430
Sirystes	677	Sulphury Flycatcher	685	White-collared Swift	275	Yellow-crowned Tyrannulet.....	661

Yellow-green Vireo	717
Yellow-headed Caracara	393
Yellow-hooded Blackbird.....	776
Yellowish Pipit.....	755
Yellow-margined Flycatcher	631
Yellow-olive Flycatcher	630
Yellow-rumped Cacique.....	771
Yellow-shouldered Grosbeak	785
Yellow-throated Flycatcher.....	698
Yellow-throated Woodpecker.....	379
Yellow-tufted Woodpecker.....	374
Yellow Tyrannulet.....	662
Zigzag Heron.....	125
Zimmer's Tody-Tyrant	645
Zone-tailed Hawk	172

Índice de fotógrafos

Adilson Constantini	280
Adriano Oliveira Maciel.....	575
Alexander Lees	279, 515, 720
Anselmo D'Affonseca.....	278, 291, 321
334, 338, 339, 340, 367, 384, 386, 388, 389, 393, 406,	
427, 442, 454, 461, 464, 482, 495, 507, 521, 540, 545,	
551, 574, 578, 579, 583, 585, 588, 594, 608, 609, 628,	
631, 639, 651, 654, 656, 658, 666, 673, 676, 677, 697,	
698, 704, 719, 722, 740, 765, 776, 787, 789, 822, 839,	
841	
Arthur de Magalhães Goulart	771
Bertrando Campos.....	126, 136,
149, 156, 157, 161, 162, 169, 187, 190, 218, 220, 231,	
245, 262, 267, 283, 304, 323, 336, 368, 412, 429, 430,	
450, 462, 471, 497, 510, 549, 550, 562, 600, 612	
Bruno Rennó	435, 438, 439,
494, 610	
Cárin Duarte	301, 415
Celso B. Almeida.....	85, 115, 137, 178
191, 208, 234, 239, 285, 327, 370, 379, 380, 400, 404,	
405, 408, 445, 473, 474, 563, 655, 665, 675, 682, 691,	
708, 716, 733, 738, 743, 746, 755, 761, 763, 766, 774,	
778, 790, 797, 801, 802, 809, 814, 818, 823, 825, 836,	
844, 845	
Ciro Albano.....	114, 125, 147,
158, 164, 189, 193, 236, 243, 250, 263, 299, 329, 352,	
398, 426, 433, 493, 517, 519, 546, 615, 637, 645, 718,	
819	
Claudia Komesu	713
Danilo Mota.....	833
Douglas Fernando.....	260
Edilaine Marques.....	758
Edson Guilherme.....	97, 100, 101,
103, 106, 119, 120, 121, 122, 131, 132, 133, 138, 139,	
141, 142, 160, 163, 165, 179, 192, 195, 196, 203, 213,	
219, 227, 233, 240, 247, 257, 258, 310, 316, 317, 319,	
324, 330, 333, 341, 348, 353, 356, 361, 374, 377, 394,	
409, 417, 420, 424, 437, 441, 457, 465, 469, 472, 475,	
476, 477, 485, 486, 487, 499, 503, 504, 506, 529, 530,	
538, 554, 555, 556, 558, 560, 566, 567, 569, 586, 587,	
589, 590, 591, 592, 618, 621, 624, 629, 641, 661, 667,	
681, 684, 685, 687, 692, 694, 703, 714, 724, 726, 727,	
748, 749, 750, 753, 756, 777, 779, 791, 793, 806, 827,	
832, 835, 846, 851	
Eduardo Fernandes.....	153, 760
Eduardo Maciel.....	109
Emerson Kaseker.....	117, 123, 127,
145, 148, 151, 155, 170, 172, 185, 201, 207, 210, 212,	
223, 226, 242, 270, 273, 281, 282, 305, 325, 326, 350,	
392, 423, 490, 496, 547, 552, 577, 604, 626, 633, 634,	
648, 657, 690, 699, 707, 712, 725, 736, 767, 800, 831	
Emerson T. Rodrigues.....	414, 717
Fabrice Schmitt.....	186
Felipe Arantes.....	479, 541
Fernando Pacheco.....	135, 561
Gabriel Mello.....	177
Geiser Trivelato	664
Geovane Gomes.....	709
Guillermo Knell	431, 468
Hector Bottai	570
Henrique Moreira.....	99, 105, 118
124, 159, 181, 199, 224, 332, 852	
Herbert Schubart.....	402
Hugo Viana	411, 537, 838
Isabela Epifani.....	173
João Batista Cardozo	116
João Quental	95, 143, 144,
256, 292, 295, 296, 297, 300, 322, 381, 421, 458, 484,	
553, 582, 784,	849
Jonatas Rocha.....	183, 251
Jorge Macêdo.....	422
Justiniano Magnago	176
Laura Erickson	238
Lawrence Thompson.....	683, 751
Leandro Espino.....	175
Leandro Moraes	512
Leila Esteves	90
Leninha Caldas	686, 729
Luiz Borges	94, 184
Maickel Sand	520
Marco Guedes	107, 150, 217,
360, 364, 376, 669, 679, 773, 799, 837, 847, 848, 850	
Marcos Melo	603
Margi Moss.....	102, 108, 129,
140, 168, 194, 221, 230, 265, 298, 302, 307, 311, 313,	
342, 711, 730, 732, 762, 769	
Mathias Singer	89, 349
Nick Athanas	440
Oscar Abener Fenalti	749
Pablo Grilli	772, 786
Paul van Giersbergen.....	775
Ricardo Gentil	111
Ricardo Plácido.....	167, 264, 365
383, 444, 481, 689, 810, 829	
Richard C. Hoyer.....	399
Robson Czaban	86, 128, 130, 134
146, 152, 166, 180, 197, 198, 202, 204, 205, 206, 209,	
211, 214, 215, 216, 222, 235, 237, 241, 246, 248, 249,	
252, 253, 254, 261, 266, 271, 274, 275, 276, 284, 287,	
288, 293, 306, 308, 312, 315, 318, 320, 328, 335, 343,	
344, 345, 355, 358, 359, 363, 366, 371, 373, 382, 385,	
391, 397, 418, 425, 428, 434, 436, 443, 446, 449, 452,	
453, 456, 463, 467, 470, 480, 488, 491, 492, 501, 513,	
518, 523, 524, 525, 526, 527, 531, 534, 536, 539, 543,	
544, 557, 564, 565, 568, 571, 572, 573, 576, 581, 597,	
598, 601, 602, 605, 606, 607, 611, 613, 614, 616, 620,	
630, 635, 638, 644, 646, 650, 652, 653, 659, 660, 671,	
678, 695, 710, 721, 728, 731, 735, 742, 745, 754, 764,	
780, 782, 783, 788, 794, 796, 798, 803, 808, 816, 817,	
820, 830, 842	
Rodrigo D'Alessandro.....	92, 268, 807
Roseanne Almeida.....	314, 416, 693,
759, 824	
Sandra Beatriz Zarur	752
Silvia Faustino Linhares	91, 98, 104
171, 174, 188, 225, 229, 232, 255, 277, 303, 346, 362,	

460, 478, 533, 599, 668, 674, 702, 705, 715, 785, 813, 821	
Steve Kelling	795
Tancredo Maia Filho.....	154, 200, 259, 269, 272, 309, 347, 357, 390, 403, 407, 663, 680, 696, 700, 701, 706, 723, 744, 757, 781, 811, 812, 826, 834
Tomaz Melo	87, 112, 244, 289, 351, 372, 378, 387, 395, 396, 508, 511, 514, 593, 595, 596, 617, 622, 632, 636, 640, 642, 643, 647, 662, 670, 672, 688, 734, 737, 768, 804, 805, 815, 828, 840
Túlio Dornas	401
Vincent Rufroy.....	96
Whaldener Endo	88, 93, 110, 113, 516
Wilfred Rogers.....	619, 747



Edson Guilherme da Silva é paulista, nascido em Taquaritinga no dia 29 de setembro de 1970. Graduiu-se em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Acre em 1994. Tornou-se Mestre em Ciências Biológicas (Ecologia) pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA)/Universidade Federal do Amazonas (UFAM) em 1997 e Doutor em Zoologia pelo Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG)/Universidade Federal do Pará (UFPA) em 2009. É professor efetivo da Universidade Federal do Acre (Ufac) desde 2002. Criou o laboratório de Ornitologia (Ornitolab) da Ufac em 2010 e, desde então, é o curador responsável pela coleção ornitológica da Instituição. É membro do Laboratório de Pesquisas Paleontológicas (LPP) da Ufac, desde 1991, onde foi o pesquisador responsável por sua coordenação nos períodos 2002-2005 e 2010-2013. Atualmente leciona as disciplinas de Zoologia, Evolução e Introdução à Ornitologia para os cursos de graduação em Ciências Biológicas, Engenharia Florestal e Agronomia da Ufac. É também professor/orientador credenciado no Curso de Mestrado em Ecologia e Manejo de Recursos Naturais da Universidade Federal do Acre.

Edson Guilherme sempre gostou de animais e de plantas. Apaixonou-se pela Amazônia ainda na adolescência, ao assistir, pela TV, as expedições de Jacques Cousteau pelo Rio Solimões/ Amazonas em meados da década de 1980. Saiu de Brasília para o Acre, em 1990, onde prestou vestibular para o Curso de Ciências Biológicas. Desde então, nunca mais se ausentou do Estado, a não ser para se qualificar profissionalmente. Edson Guilherme escolheu viver no Acre. É paulista de nascimento e acreano de coração.

A tipologia usada nos textos deste livro foi a garamond, 10,5/13, desenhada por Claude Garamond em 1530, aproximadamente.



A competente compilação da avifauna, apresentada nesta obra, coloca, merecidamente, o estado do Acre em destaque no mapa planetário da megadiversidade. Porquanto há um consenso de que o oeste da Amazônia, sobretudo o sudoeste, é a região com mais expressiva riqueza de espécies da fauna. Este recorde, explicado pela heterogeneidade ambiental traduzida em múltiplos *habitats* florestais, em áreas relativamente pequenas, parece ser consequência dos distúrbios de grande magnitude, causados pelo soerguimento da Cordilheira dos Andes. O livro *Aves do Acre* é, desde já, um marco na Ornitologia da Amazônia Ocidental e, também, um diligente guia para a identificação das lacunas do conhecimento dessa ciência na região.

Fernando Pacheco

Conselho-Diretor do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos

O estado do Acre é uma das regiões mais promissoras para o turismo de observação de aves e o registro de novas espécies para o Brasil. *Aves do Acre* traz uma compilação da história da Ornitologia do Acre e descreve, de forma objetiva, todas as espécies já catalogadas no Estado, contando, ainda, com mapas de registros e fotos cedidas cordialmente por vários colaboradores que tiveram o privilégio de fotografar a avifauna deste importante pedaço do Brasil.

Reinaldo César Guedes

Administrador do site *WikiAves.com.br*

avesgráficas
editora



Prêmio ABEU 2017
Projeto gráfico
3° LUGAR

